

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

مديرية التعليم الزراعي دائرة الإرشاد الزراعي

الزراعة في لبنان
الأبجار الممرّة

أتمت إدارة التعاون الفني الأميركية (البنس الرابع)

نفقات طبع هذا الكتاب

الجمهورية اللبنانية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

فيما يخص

الزراعة

سفال

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

توزيع

٢٥٦١

الاشجار المثمرة

شجرة التفاح

بيئتها. غرسها. تعهدّها. اصنافها. تكثيرها

شجرة التفاح

تكوينها. قطفها. توضيبها. تعبئتها. تبريدها

مقدمة

اتسعت زراعة الأشجار المثمرة وخاصة التفاح اتساعاً كبيراً رافقه ازدهار سريع فاعطى لبنان برهاناً جديداً على انه بستان الشرق .
وجدير بالذكر ان المزارع اللبناني قد تبنى صنفين جديدين (الكولدن والستاركن) اعتقاداً منه انها يجتذبان المستهلك في الأسواق الخارجية لما هما عليه من حسن المنظر ولذة الطعم الى امكان حفظها في البراد وتحملها النقل الى مسافات بعيدة .

فهل يفضل هذان الصنفان على غيرهما من الاصناف ويكتفي لبنان بنشر زراعتها ؟ ام ان هنالك مجالاً لادخال اصناف اخرى لها من ميزاتنا الخاصة الفنية والاقتصادية ما يساعد على نشرها وتعزيزها الى جانب هذين الصنفين ؟
بحث فني دقيق يقوم به الاستاذ تيموتي معلوف الخبير في وزارة الزراعة في كتاب يسرّني ان اقدمه الى المزارعين اللبنانيين آملين ان يجدوا فيه الفائدة المرغوب فيها فيعملوا على اختيار افضل الاصناف وتعميمها تعزيزاً لزراعة اثبتت الوقائع انها ركن اساسي من اركان الاقتصاد اللبناني .

ولا يسعني لهذه المناسبة إلا ان اشكر ادارة التعاون الفني الأميركية (البند الرابع) التي أمنت نفقات اخراج هذا الكتاب فكان عملها خطوة عملية في طريق التعاون الزراعي المثمر الذي رسمه البلدان الصديقان الولايات المتحدة الأميركية ولبنان .

بيروت في ٢٥ آب سنة ١٩٥٢

موريس زوين
المدير العام لوزارة الزراعة

مطبعة الناهل / ١٩٥٢
الصور الملونة حفر وطبع نيتو

يتناول هذا الكتاب الذي يجمع بين العلم والعمل ناحية عملية هامة من نواحي الحياة الزراعية في لبنان، وقد وضعه اختصاصي وخبير في الحقلين .
فيسرني جداً ان اقدمه الى المزارع اللبناني العامل النشط الذي برهن في السنوات الاخيرة عن مقدرة فائقة في زراعة التفاح فنال نجاحاً باهراً .
واني أرى في هذا المؤلف الخطوة الاولى في حملة إرشاد زراعي اخذنا نقوم بها بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية وذلك ضمن مشروع زراعي انشائي واسع النطاق يعود بالخير على البلدين الصديقين المتعاونين - لبنان والولايات المتحدة الأمريكية .

بيروت في ٢٥ آب سنة ١٩٥٢

هوليس بيتر

مدير مصلحة التعاون الفني الاميركية
في لبنان

تمهيد

حرصت وزارة الزراعة في السنوات الاربع الاخيرة على نشر فكرة التخصص وتعزيزها كما حرصت على تعميم ما وصل اليه الفن الحديث والاختبار العالمي في الحقل الزراعي العملي فعمدت الى ارساد اعتماد خاص في موازنتها للنشورات الفنية الزراعية ، وهو تدبير ان لم يكن بدعة في البلدان الزراعية فهو باب جديد في لبنان وخطوة حبيدة تخطوها الوزارة في سبيل ايصال الدواء الشافي الى المريض حيث يقيم .

ان هذه السلسلة سلسلة الابحاث العملية التي نفتتحها اليوم ستكون للزراع اللبناني دليلًا ومرشدًا وموجهًا . فهو يجد فيها المعلومات الفنية التي تساعده على حل المشكلات التي تعترض عمله كما تساعده على تحسين استثمار التربة التي تحتضن آماله كما احتضنت آمال آباءه واجداده ، تلك التربة التي منحها الطبيعة ميزات خاصة فجعلت من لبنان بلداً زراعياً وأهّلته لان يقنع مركزاً مرموقاً بين البلدان الزراعية المصدرة .

وستتناول هذه السلسلة شؤون الحياة الزراعية على اختلاف وجوها فتعمل على توجيه النصح للخروج من الاساليب القديمة في الحث مثلاً الى اساليب اخرى حددها العلم الميكانيكي الحديث الى اساليب علمية فنية مقرونة بالتجربة والاختبار .

ولن تقتصر هذه السلسلة على توجيه النصح والارشاد بل تتجاوزه الى الحقل العملي فتقوم بتعميم اساليب المكافحة وطرق وقاية المزروعات من الحشرات التي تفتك بها والامراض التي تقف بينها وبين نموها الطبيعي .

هذه هي اهداف سلسلة المنشورات الفنية الزراعية .

غير ان المجهود الرسمي لا يكفي مهما كان كبيراً اذا لم يرافقه تعاون مخلص واستعداد دائم للتقيد بالمعلومات الفنية وتنفيذها عند الاقتضاء .

وتأمل مديرية التعليم الزراعي والارشاد ان المزارع اللبناني الذي جعل من جبال لبنان العالية وارضه الوعرة غابات وارفة وبساتين زاهرة ، ان هذا المزارع الذي قامت على ساعديه حركة زراعية مثمرة جعلت من هذه البقعة المباركة حقلاً فريداً لزراعة الاشجار المثمرة في الشرق ، ان هذا المزارع سيعمل دون شك على تفهيم الاساليب الزراعية الحديثة فيطبق البعض منها ويكيف القسم الآخر بحسب تنوع المناخ واختلاف حيوية التربة .

وبدهي ان نفتتح هذه السلسلة ببحث عن الاشجار المثمرة بصورة عامة وعن التفاح بصورة خاصة لما نعلقه على هذه الزراعة من آمال ان تحققت تمكن لبنان من تركيز ميزانه الاقتصادي .

بيروت في ٢٣ تموز سنة ١٩٥٢

الفرد شمعون

مدير التعليم الزراعي والارشاد

مقدمة المؤلف

بعد ان حقق الشعب اللبناني استقلاله السياسي اخذ يدعمه بتقوية اقتصادياته شأنه في ذلك شأن الشعوب العربية الشقيقة . فكان لزاماً عليه ان يستغل بيئته الطبيعية الى اقصى حد لما عُرف عنه من نشاط وذكاء ومثابرة على العمل . وبدهي ان الارض هي الكنز الطبيعي للمواطن اللبناني ، والزراعة هي الميدان الاول لانتاج قوته وكسائه لاقتدار البلاد الى الموارد الطبيعية المعدنية . فاصح من الطبيعي ان ينزل الى الحقل الزراعي بقواه العقلية والجسدية وقد افلح ايما فلاح ، ومع ان الزراعة لم توفر له الكفاف فلقد سار شوطاً غير يسير نحو هدفه المنشود .

ومن بوادر نجاح النهضة الزراعية في لبنان اهتداء المزارع الى اصناف النباتات التي تفوق سواها غلة في مناخ لبنان وتربته . ولو سئلت ما هو ابرز عمل صائب قام به المزارع اللبناني بعد الحرب الكونية الثانية لأجبت على الفور : زراعة اشجار التفاح . ولكن من الاسف ان فقر الابحاث العلمية ونقص الارشاد الزراعي السليم في السنوات الماضية حملا المزارع على ارتكاب اخطاء اساسية عديدة في انشاء بساتين التفاح وتعهدها كزراع اصناف غير مطلوبة في الاسواق التجارية ، او زرع اصناف في مواقع غير ملائمة لنسوها ، او غرس الاشجار بابعاد واعماق مغلوطة ، او عدم الامام بوقايتها من الآفات الزراعية ، وكلها امور تكلف المزارع نفقات هو في غنى عنها كما انها تؤثر تأثيراً سيئاً في انتاج اشجاره . وان كثيراً من هذه الاغلاط لم يكن بالامكان تداركها لقصر المدة التي نشأت فيها هذه الزراعة وسرعة انتشارها بل لحدائثة عهد المزارع بزراعة اشجار التفاح وعدم وجود النشرات الارشادية والكتب الزراعية باللغة العربية ليطلع عليها المزارع

محتويات الكتاب

i	مقدمة مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية
iii	مقدمة مدير مصلحة التعاون الفني الاميركية في لبنان
v	تمهيد لمدير التعليم الزراعي والارشاد
vii	مقدمة المؤلف
١	اشجار التفاح في العالم

الباب الاول

٥	تأثير العوامل الطبيعية والجنسية في زراعة اشجار التفاح
٦	الفصل الاول - المناخ وزراعة اشجار التفاح
١٣	الفصل الثاني - تكوين البواعم الزهرية
١٨	الفصل الثالث - انتهاء دور استراحة البواعم
٢٣	الفصل الرابع - الاثمار
٣٧	الفصل الخامس - اثر الاصول البرية في احجام اشجار التفاح
٤٠	مراجع الباب الاول

الباب الثاني

٤١	انشاء بساتين التفاح
٤٢	الفصل السادس - انتخاب الاقليم والموقع
٤٧	الفصل السابع - انتخاب التربة
٥٥	الفصل الثامن - رسم خطة الزرع
٦٢	الفصل التاسع - تهيئة موقع البستان وغرس الاشجار
٧٢	مراجع الباب الثاني

الباب الثالث

٧٣	تعهد اشجار التفاح
٧٤	الفصل العاشر - العناية باغراس التفاح الحديثة
٧٩	الفصل الحادي عشر - غذاء اشجار التفاح ومصادره
٨٧	الفصل الثاني عشر - تعهد التربة
٩٢	الفصل الثالث عشر - الماء وطرق الري
١٠٠	الفصل الرابع عشر - تربية اشجار التفاح وتقليمها
١١٧	الفصل الخامس عشر - تخفيف الثمار
١٢٣	مراجع الباب الثالث

الباب الرابع

١٢٥	تعهد ثمار التفاح
١٢٦	الفصل السادس عشر - تكوين ثمار التفاح
١٣٠	الفصل السابع عشر - تركيب ثمار التفاح
١٣٧	الفصل الثامن عشر - قطف ثمار التفاح
١٤٤	الفصل التاسع عشر - توضيب ثمار التفاح وتقليمها
١٦١	الفصل العشرون - تبريد ثمار التفاح
١٧٨	مراجع الباب الرابع

الباب الخامس

١٧٩	اصناف التفاح
١٨٠	الفصل الحادي والعشرون - منشأ اصناف التفاح

١٨٦ . . . الفصل الثاني والعشرون - وصف بعض اصناف التفاح

٢٢٢ . . . مراجع الباب الخامس

الباب السادس

٢٢٣	تكاثر اشجار التفاح
٢٢٤	الفصل الثالث والعشرون - انواع اشجار اصول التفاح (النصوب البرية)
٢٣٩	الفصل الرابع والعشرون - اساليب تكاثر اصول التفاح واعدادها للتطعيم
٢٤٨	الفصل الخامس والعشرون - تطعيم اصول التفاح وتعهد المطاعيم
٢٥٧	مراجع الباب السادس

الباب السابع

٢٥٩	وقاية اشجار التفاح
٢٦٠	الفصل السادس والعشرون - الحشرات الضارة باشجار التفاح وثمارها
٢٧٤	الفصل السابع والعشرون - امراض اشجار التفاح وثمارها
٢٨٣	الفصل الثامن والعشرون - اساليب الوقاية
	الفصل التاسع والعشرون - المواد الكيماوية المستعملة في وقاية اشجار
٢٩١	التفاح وثمارها
٢٩٨	الفصل الثلاثون - اعداد المجاليل الواقية ومنهارج الرش الجماعي
٣٠٩	الفصل الحادي والثلاثون - الاعراض الغذائية في اشجار التفاح وثمارها
٣١٧	الفصل الثاني والثلاثون - الاعراض الطبيعية في اشجار التفاح وثمارها
٣٢٩	مراجع الباب السابع
٣٣١	فهرس الاشكال والصور الملونة

اشجار التفاح في العالم

عرف الانسان شجرة التفاح منذ القدم في آسيا واوروبا اذ وجد علماء طبقات الارض أقار تفاح متفحمة في سويسرا مما يدل على علم الانسان القديم بها . وقد أتى المؤرخون القدماء على ذكرها في الصين والهند واليونان منذ سنة ٦٠٠ قبل المسيح .

ويعتقد الكثيرون ان أشجار التفاح نشأت في بيئة طبيعية على جبال حملايا الشمالية الغربية نامية على حالتها الطبيعية في أحراج واسعة منتشرة على سفوح تلك الجبال الشاهقة الباردة على ارتفاع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر . ثم انحدرت من هنالك الى بلاد القفقاس والتوركستان حيث تحوي الأحراج مئات الأصناف البرية . وقد تغلغلت شجرة التفاح على ما يظهر عن طريق هذين البلدين الى اوروبا فلازمت الأقاليم الباردة ونجحت فيها حتى عظم شأن زراعتها في اواسط تلك القارة وشمالها ومنها انتقلت بواسطة المهاجرين الى أميركا الشمالية وغرست بذورها في أحراج مترامية الأطراف فنجحت وأنتجت كثيراً من الأصناف التجارية المعروفة .

قلما تجد بلدآ ، خلا بعض الأقاليم الاستوائية والأصقاع الشمالية ، لم تُزرع فيه أشجار التفاح ، فهي أكثر الأشجار المثمرة انتشاراً في المناطق المعتدلة والباردة ويأتي إنتاجها في الدرجة الثانية بعد العنب في الأسواق التجارية العالمية . فيقدر ما ينتج من ثمار التفاح في العام الواحد في العالم بمئتين عشر مليون طن، نصيب الولايات المتحدة الأميركية منها ما يقرب من خمسة ملايين طن، وفرنسا ثلاثة ملايين ، والمانيا مليون ونصف المليون ، وانكلترا مليون واحد ، واطاليا

وبليجكا والنمسا وبولندا وكندا مجتمعة ثلاثة ملايين ، وما تبقى تنتجه البلاد المعتدلة المناخ . وللدلالة على اهتمام الغربيين بزراعة أشجار التفاح اعتمد أكثر من مئة مختبر زراعي اتفاق مبالغ كبيرة لاستخلاص الأسرار المكنونة في تلك الشجرة لمعرفة أفضل أساليب تعبيدها والاتجار بثمارها .

ولم يُمنَ بغرس أشجار التفاح على نطاق واسع في الشرق الأدنى الا بعد الحرب العالمية الاولى اذ بدأت الولايات المتحدة الاميركية تصدر ثمارها الى مصر ولبنان وسوريا وفلسطين وتبيعها بأسعار مرتفعة مما لفت أنظار أولياء الشأن المهتمين بالزراعة ، فعمد بعض اللبنانيين الى ادخال هذه الأشجار الى البلاد على سبيل التجربة وحالف بعضهم النجاح في انتاجهم الأصناف التجارية الجيدة الملائمة لمناخ لبنان وتربته . وما انتهت الحرب العالمية الثانية حتى أثبتت أشجار التفاح صلاحها للنمو والانتاج الوافر في أكثر المناطق اللبنانية وأخذت تدر ثمارها الارباع المغربية . وسرعان ما تسابق المزارعون في غرسها في كل المواقع سقياً وعذياً الى ان بلغت زراعتها أوجها في شتاء ١٩٥٠ - ١٩٥١ ، وكان ذلك على حساب الأشجار الأخرى كالتوت والتين والزيتون والصنوبر التي اقتلعت لاستبدال اشجار التفاح بها صاحبة الامتياز الاول في البلاد لأجيال لاحقة .

وأخذ المزارع السوري في منطقة الزبداني يقلع عن زراعة الأصناف البلدية منذ الحرب العالمية الثانية تمثلاً بأعمال شقيقه اللبناني بزراعة الأصناف الحديثة وهو يجاريه في تجديد أساليبه الزراعية ليحفظ للزبداني شهرتها التقليدية في انتاج ثمار التفاح . كما ان المسؤولين في المملكة الاردنية الهاشمية أخذوا يبحثون امكانية انتشار أشجار التفاح بعد درسها في المختبرات العلمية .

تقدر الأراضي المغروسة بأشجار التفاح في لبنان بثلاثين الف دونم او ثلاثة آلاف هكتار تحتوي على مليون وربع المليون من الاشجار (١٩٥١) مشكلة

ما لا يحصى من الأصناف الاوروبية والاميركية والبلدية . غير انه في الآونة الأخيرة أخذ الصنفان كولدن ديليشس واستاركن ديليشس يتفوقان على سائر الأصناف وسيصبحان بحكم صلاحهما للاسواق التجارية وملاءمتها للمناخ اللبناني الصنفين الرئيسيين باتساع المساحة المغروسة والانتاج وعدد الصاديق المصدرة . ورغم اننا نفضل تجديد زراعة التفاح ببضعة أصناف نرى ان من الضروري توسيع زراعة بعض الأصناف لانتاج تفاح صالح للمصايف مثل الصنف كرافنشتين ، وكذلك توسيع الأقاليم الصالحة لزراعة أشجار التفاح كالمواقع الكثيرة الارتفاع (ما فوق ١٥٠٠ متر عن سطح البحر) حيث يجود الصنفان ماكتوش ونورثون اسباي ، والمواقع المنخفضة حيث يجود الصنفان يلونبوتن وونتربنانا .

ويقدر ان المساحة المغروسة أشجار تفاح في لبنان ستصبح في العام ١٩٦٥ مئة ألف دونم او عشرة آلاف هكتار تستوعب ثلاثة ملايين وخمسمائة الف شجرة باعتبار ان هذا أقصى ما يمكن غرسه في لبنان . وقد لا يقل انتاجها السنوي عن مئتي ألف طن يصلح ٦٠٪ منها للتصدير أو ما يعادل سبعة ملايين ونصف مليون صندوق من التفاح . فاذا قُدر سعر الكيلوغرام الواحد بعشرين غرساً لبنانياً فقط يمكن بيع الصندوق الواحد في الاسواق الخارجية بعشرين ليرات لبنانية ، فيكون دخل لبنان من النقد النادر ما يساوي خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية . وان ما يفيض من الثمار عن حاجة المستهلكين المحليين يمكن بيعه عصيراً .

ولا مجال للشك في نجاح زراعة أشجار التفاح في لبنان اذا أحسن المزارعون والمصدرون استعمال أحدث الطرق العلمية في أعمالهم اليومية . ويعود هذا التفاؤل الى خمسة أسباب رئيسية : أولاً ملاءمة هذه الشجرة لمناخ لبنان وتربته مما يجعلها غزيرة الانتاج بالنسبة للبلاد الاخرى . ثانياً ان الأقاليم التي تنمو فيها

الباب الاول

تأثير العوامل الطبيعية والجنسية

في زراعة اشجار التفاح

يترتب على كل مزارع ينبغي انشاء بستان من اشجار التفاح ان يتعرف الى طبائع نمو تلك الأشجار وخاصة الى تكوين براعمها وكيفية اخصاب أزهارها، وتأثير المناخ في تلك الأعضاء، وأثر الاصول البوية في احجامها، لما لهذه العوامل من رتيق الصلة في انتخاب الأصناف الملائمة وكيفية تنظيم زراعتها في البستان، ذلك لان نجاح النمو ونجاح انتاج الاصناف المتنوعة من التفاح مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمقادير الحرارة والضوء والأحوال الجوية الاخرى . وهذه لا يمكن السيطرة عليها لتلائم زراعة اشجار التفاح، كما انه يصعب تغيير طبائع النمو الموروثة في الأصناف لتوافق البيئة، ومن هذا يُستدل ان سر نجاح زراعة اشجار التفاح يتوقف على اكتشاف الأصناف الملائمة للزراعة في كل من الأقاليم الصالحة لنموها .

ولتلافي الحسارة الناجمة عن ارتكاب الأخطاء الزراعية لدى انشاء البستان لجبل المزارع مدى تأثير البيئة الطبيعية في طبائع نمو الأصناف ينبغي بحث بعض هذه العوامل كالمناخ، وكيفية تكوين البراعم الزهرية، ومقادير البرد اللازم لانهاؤ فترة استراحتها في الشتاء، واختلاف طبيعة الإخصاب والإثمار في الاصناف المتنوعة، وتأثير الاصول في حجم الأشجار، قبل البحث في انشاء البستان وذلك ليتسنى للمزارع رسم الخطة الدقيقة والتفاصيل التي تضمن ملافاة الاخطاء التي يصعب اصلاحها فيما بعد، والتي تكبد المزارع خسائر مادية وزمنية لا مبرر لها.

هذه الأشجار وتنتج ثماراً قد تضاهي مجودتها التفاح اللبناني بمحدودة بالنسبة للشرق الأدنى والأوسط . ثالثاً امكان حفظ ثمار التفاح في البراد مدة طويلة وتسويقها بعد قطفها بأشهر عديدة . رابعاً بازدياد الانتاج تنخفض أسعار ثمار التفاح فتصبح في متناول ملايين من المستهلكين . خامساً امكان استغلال الثمار التي لا يمكن تسويقها في انتاج العصير الحلو، والنيذ، والحل، والبيكتين، والتفاح المجفف، والمربيات، ولجميعها أسواق تجارية عالمية .

فلهذه الأسباب بات من الضروري الاكثار من زراعة اشجار التفاح لتعم الفائدة أكبر عدد من المزارعين والمستهلكين على السواء . فاذا انخفض سعر كيلوغرام التفاح الى عشرين غرساً لبنانياً وكان معدل ما تنتجه الشجرة الواحدة ستين كيلوغراماً فقط يكون انتاج الشجرة الواحدة اثنتي عشرة ليرة لبنانية او ما يعادل ٤٢٠ ليرة لبنانية للدونم الواحد وهذا المبلغ يضاوي أفضل انتاج زراعي . يُستدل من هذا البحث ان شجرة التفاح ستمثل دوراً خطيراً في اقتصاديات لبنان ولذلك يترتب على المسؤولين المبادرة الى اجراء الابحاث العلمية بصدها، واعداد التشريع الضروري لصيانتها وتصريف ثمارها، كما يترتب على المزارعين ان يظطلعوا بانشاء بساتين التفاح وتعهدتها بأحدث الأساليب العلمية اذا ما رغبوا في مجارة المزارعين في العالم ومنافستهم في الأسواق التجارية العالمية . وبما ان اسعار ثمار التفاح ستستقر عاجلاً او آجلاً فتصبح الأرباح رهن قدرة الأشجار على الانتاج المتزايد، وهذا أمر شديد الارتباط بمقدرة المزارع وبراعته في تعهد أشجاره، لذلك ننصح المزارع ان يطلع على اصول غرس اشجار التفاح وتعهدتها وان يتتبع تطور الأساليب الحديثة في المختبرات العالمية من سنة الى اخرى . وقد وضع هذا الكتاب كخطوة اولى لارشاد المزارع واطلاعه على أحدث الأسس لغرس التفاح وتعهدتها شجراً وثماراً كما عرفها مزارعوها الناجحون وخبراء الشرق الأدنى وعلماء العالم الزراعيون .

الفصل الاول

المناخ وزراعة اشجار التفاح

ان اهم عامل طبيعي يؤثر في زراعة اشجار التفاح هو المناخ. ولقد ذكرنا ان البيئة الأصلية التي نمت شجرة التفاح فيها على طبيعتها هي سفوح جبال حملايا الشمالية الغربية ذات المناخ البارد القارس المتوسط الرطوبة والغزير المطر . وكان من الطبيعي ان يشابه مناخ الأقاليم المنتشرة فيها أشجار التفاح مناخ الاقليم الاصلي؛ والعوامل التي تحدد المناخ الملائم لزراعة أشجار التفاح هي مقادير الحرارة، والمطر، والضوء، والرطوبة المتوفرة في الاقليم، ووقوع الصقيع، والبرد، واحتمال هبوب الرياح الشديدة .

تأثير الحرارة

تأثير درجة الحرارة في الاصناف - ان العامل الجوهرى الذي يسوّغ تحديد الأقاليم الصالحة لزراعة اصناف التفاح المتنوعة هو الحرارة . والمعروف ان افضل مكان لنمو أشجار التفاح هو حيث يكون فصل الصيف بارداً وطويلاً، كما أن من شأنه ان يفضل الرقاد والاستراحة في غضون فصل الشتاء الكثير البرودة . ولهذا السبب لا تنجح أشجار التفاح في اقاليم يرتفع فيها متوسط معدل الحرارة صيفاً عن ٢٦ درجة مئوية (١). كما انها لا تزرع في الأقاليم التي يهبط فيها متوسط معدل الحرارة الى ١٠ درجات مئوية تحت الصفر شتاءً. ويتراوح اختلاف

الأصناف من حيث مقدرتها على مقاومة البرد أو الحر أو طلبها له بين هذه الحدود القصوى. ولا تقل سيطرة درجة الحرارة على نمو أشجار التفاح وثمارها في الصيف عنها في الشتاء، وبالأحرى فهي اكثر اهمية في الصيف لما لها من التأثير البالغ في طبيعة النمو وجودة الثمار. وافضل معدل صيفي لنضج ثمار التفاح المتنوعة يتراوح بين ١٥ - ٢٠ درجة مئوية (المعدل بين أول آذار وأول أيلول) .

تأثير درجة الحرارة في الجذور والسوق والأغصان - تختلف جذور الاصول في تحملها البرد بعضها عن بعض ، فالصنف البري فرجينيا كراب يظهر مناعة قوية ضد البرد ، أما النوع مالس كومبونس (الفرنسي) فهو أشد تأثراً بالبرد وخاصة اذا تدنت الحرارة الى ١٠ درجات مئوية تحت الصفر لفترة طويلة . أما الأصناف البلدية فلا تقاوم الصقيع كثيراً . ولا تتحمل جذور التفاح الحرارة المتدنية كالأغصان والفروع والسوق ، فجذور أكثر الأصناف تموت اذا هبطت الحرارة عن ١٥ درجة مئوية تحت الصفر فترة طويلة من الزمن . وكما لا يخفى إن البرد القارس يؤدي الجذور النامية في تربة ثقيلة رديئة الانصراف او رملية قليلة الغور .

تتأثر السوق والأغصان بالحرارة المتدنية بنسبة نضج خشبها . واكثر ما تتضرر شجرة التفاح من البرد القارس ليس في منتصف فصل الشتاء او في آخره بل في الأسابيع الأولى منه في الحريف ، وذلك اذا هبطت الحرارة فجأة قبل ان يتم نضج خشب الأغصان بسبب استمرار النمو الحضري المتأخر . والمعروف انه اذا تم نضج خشب الشجرة التي لا تتحمل طبيعتها البرد الشديد يصبح اكثر مناعة من خشب الشجرة غير الناضج المعروفة بمناعتها الطبيعية ضد البرد (١٧) .

كما أن أجزاء الشجرة الأكثر بعداً عن الأوراق هي أكثر تعرضاً لخطر البرد. وهكذا كانت ساق الشجرة القريبة من سطح الأرض اكثر تعرضاً للضرر من

الأغصان . وبالتالي فان السوق الطويلة التي تتفرع منها الاغصان على ارتفاع اعلى عن سطح الأرض تكون اكثر تعرضاً للبرد من السوق القصيرة (١٧) . وهبوط درجة الحرارة المفاجيء في الشتاء وتحت ظروف معينة يسبب موت الخلايا في الجزء الجنوبي الغربي من ساق الشجرة المعرض لأشعة الشمس ويعرف هذا العَرَض بلفحة الشمس الشتوية (راجع الفصل الثاني والثلاثين) .

تأثير درجة الحرارة في البراعم - ان البراعم تتحمل البرد القارس اكثر مما تتحملة سائر اجزاء الشجرة . كما ان البراعم الزهرية هي اكثر مناعة ضد البرد من البراعم الخضرية وخاصة في اوائل فصل الشتاء حين بدء حلول الصقيع المبكر المتلف للبراعم الخضرية التي لم يكتمل نضجها . والبراعم كالسوق تتضرر كثيراً من هبوط الحرارة المفاجيء ، وقد تموت اذا استمر البرد الشديد اكثر من ٢٥ درجة مئوية تحت الصفر فترة طويلة .

اما في اواخر الشتاء فتحفظ البراعم بمناعتها ضد الحرارة المتدنية الى ما بعد انتهاء دور الاستراحة . وحينئذ نخسر البراعم من مناعتها ضد البرد بتقدم نموها حتى لا يسعها أن تتحمل اكثر من خمس درجات مئوية تحت الصفر في ميعاد الازهار والثمار . وقد افردنا الفصل الثالث لشرح صلة الحرارة بدور استراحة البراعم لاهيتها بالنسبة لانتخاب الاصناف الملائمة لمختلف انواع المناخ .

تأثير درجة الحرارة في التلقيح والاختصاص - اذا تدنت الحرارة عن ٤ درجات مئوية في اواخر فصل الشتاء او ارتفعت عن ٢٧ درجة مئوية في موعد تفتح الازهار فلا يكتمل نمو حبيبات اللقاح او قد يتأخر نضجها وتتأخر عملية التلقيح والاختصاص اذ قد تعتل بعض الاعضاء التناسلية او تعدم او تشل حركة الحشرات الناقلة لحبيبات اللقاح او تجف المياسم او يتوقف الاختصاص .

تأثير درجة الحرارة في الثمار - للحرارة تأثير بالغ في تكوين حجم ثمار

التفاح وشكلها وطعمها ولونها وهي التي تحدد جودتها . وتنتج ثمار التفاح الفاخرة في مناخ لا يتجاوز متوسط معدل حرارته ١٩ درجة مئوية ولا ينقص عن ١٥ درجة مئوية صيفاً (المعدل بين اول نيسان واول ايلول) فاذا ارتفع أو تدنى عن ذلك اتى بثمار رديئة الطعم واللون وعرضها للاصابة باعراض طبيعية لا تلبث ان تبدو للعيان بعد حفظ الثمار في البراد ، وسيأتي شرحها في الباب السابع .

زد على ذلك ان لكل صنف درجة حرارة صيفية معينة يجود فيها . فالاصناف ما كنتوش ونورثون اسباي تفضل ان يكون معدل الحرارة الصيفية ١٥ درجة مئوية أو صيفاً كثير البرودة قصير الامد . والاصناف جوناثان وروم بيوتي واستيمن واينساب ورد ديليشس وبيزكورد تفضل معدل ١٨ درجة مئوية او صيفاً طويلاً بارداً . والاصناف واينساب ويلونيوتن وكولدن ديليشس وكرافنشتين وونتربانانا ويلو بلفلور وكنج ديفيد تفضل معدل ٢٠ درجة مئوية او صيفاً طويلاً متوسط البرودة او دافئاً .

تأثير الضوء

يمد الضوء الاوراق بالقوة اللازمة لانتاج الغذاء ، وهو يتحكم بنمو الاشجار وانتاجها . ومن الثابت ان الضوء الكثيف على فترات متقطعة ضروري لتحويل البراعم الخضرية الى براعم زهرية . ولذا نشاهد البراعم الزهرية بكثرة على اجزاء الشجرة الخارجية وخاصة في الاتجاه الجنوبي (شمال خط الاستواء) الذي لا تقل قوة الضوء فيه عن عشرة آلاف شعة (٢) و (١٨) . غير ان شدة الاضاءة المتواصلة لمدة طويلة تحد من تكون البراعم الزهرية . اما الاجزاء البعيدة عن الضوء الكافي لكثافة النمو الخضري او لكونها في الاتجاه الشمالي من الشجرة او لقرب المسافة بين الاشجار فلا تحصل على اكثر من قوة خمسمائة شعة فتنتج براعم زهرية قليلة على دوابر صغيرة ضعيفة . وللضوء صلة مباشرة في تكوين اللون

الاحمر في ثمار التفاح لانه يحتوي على الاشعة فوق البنفسجية الضرورية لانتاج مادة الايدان التي يتكوّن منها اللون الاحمر . ولذلك فالغيوم الكثيفة والغبار والضباب والعوامل الاخرى التي يمكنها استيعاب هذه الاشعة وحجبها عن الثمار تحول دون تكوّن اللون الاحمر .

تأثير الامطار

ان سقوط الامطار بمقادير وافرة لأمر ضروري لتأمين الماء اللازم لنمو اشجار التفاح وانتاجه ، ولا توافق زراعته عذياً بلا سقي في المناطق التي تقل فيها كمية الامطار عن معدل ٥٠٠ ملم . سنوياً ، الا اذا توفرت مقادير كافية من مياه الري الصالحة . وفضل المناطق لزراعة اشجار التفاح هي التي يسقط فيها اكثر من ٨٠٠ ملم . سنوياً في فصل الشتاء .

قد تضر الامطار الربيعية في انتاج الثمار لان سقوطها المتواصل لمدة طويلة في ميعاد الازهار يوقف تنقل النحل مما يعيق نقل حبيبات اللقاح ويضعف الاخصاب . زد على ذلك ان كثرة الامطار او سقوطها في اوقات غير مناسبة من الربيع يعرقل القيام بعمليات الحرث والعزق والتقليم والرش في مواعيدها المعينة في الشتاء والربيع .

تأثير الرطوبة

للرطوبة تأثير مباشر في نمو اشجار التفاح وتكوين ثمارها . فالاقليم الكثيرة الرطوبة او الجفاف لا تصلح لنمو هذه الاشجار . فكثرة الرطوبة في ميعاد الازهار تحول دون انطلاق حبيبات اللقاح من خلاياها وقد تعثرها الامراض الفطرية فتبيدها . وغير خاف ان الرطوبة المرتفعة تساعد على تكاثر الامراض على سوق اشجار التفاح واوراقها وثمارها مما يجعل أساليب الوقاية متعذرة وكثيرة

النفقات . وكثرة الرطوبة تشقق قشرة الثمار في بعض الأصناف وتساعد على نمو الخلايا البرنشيمية خارج اللب فتشوه الأثمار وتظهر كأنها صدئة (Russeted) . وقد يوقف الجفاف نمو حبيبات اللقاح ويجفف المياهم في الربيع فيستحيل الاخصاب . أما جفاف الهواء في الصيف فيساعد على نمو ثمار ذات قشرة ناعمة الملمس برّاقّة اللون .

تأثير الصقيع

تتضرر اشجار التفاح كثيراً من وقوع الصقيع في فصل الخريف قبل اكتمال نضج خشب بعض الأصناف ، وكثيراً ما تظهر فداحة هذا الضرر على الاشجار التي كانت مثقلة بالثمار في الصيف السابق للصقيع لتعذرها عن الاستمرار في توين خشبها بالمواد الضرورية لاتمام نضجه . أما الصقيع الذي يحدث بعيد بدء دور الاستراحة فقليلاً ما يؤذي الأشجار . انما قد يضر الصقيع المعروف « بالملّاح » بازهار التفاح فيتلفها وخاصة اذا كان النهار دافئاً وهبطت الحرارة دون الصفر فجأة في الليل ثم تلا ذلك ارتفاع بالحرارة . وتختلف مناعة الأصناف ضد هذا النوع من الصقيع فتتضرر منه غالباً أصناف رد ديليشس (استار كن) واستيمن واينساب وواينساب .

تأثير الرياح

اذا كانت الرياح الشديدة صفة ملازمة للاقليم وجب التردد في زراعة اشجار التفاح فيه اذ قد تجتث الرياح الهوج الاشجار من جذورها ، وغالباً ما تظهر منحنية باتجاه الرياح اذا لم تُدعم . وفي موسم الازهار تجف المياهم بسبب الرياح الشرقية الجافة وتتضارب الأزهار بالأغصان فتعطل أجزاءها ، ولا تقدر الحسارة التي تلحق بالمزارع في الأقاليم التي تعصف بها الرياح الموسمية بسبب تساقط الثمار في آخر فصل الصيف .

الفصل الثاني

تكون البراعم الزهرية

يجب التعرف الى كيفية تكوّن البراعم الزهرية وصفاتها الطبيعية والى العوامل التي تؤثر في نموها وانتاجها لما ترتبط به من وثيق الصلات بتحديد المناخ الملائم او انتخاب الأصناف المناسبة للزرع وتكييف طرق التعهد في البستان .

ميعاد تكون البراعم — ان البراعم هي مصدر النمو والاثمار في الأشجار ، وللبيئة وحالة نمو الاشجار صلة مباشرة بعدد ما تنتجه من البراعم وبنوعها . ويستحيل تمييز البراعم اول ما تتكون في الربيع لانها جميعها تكون خضرية ويبدأ تحوّل بعضها الى براعم زهرية تدريجياً اذا توفرت الظروف الملائمة للنمو في متوسط شهر حزيران وذلك بيده صنع تويج الزهرة وينتهي بعد مرور عشرة أشهر أي في نهاية شهر آذار حين يتم صنع حبيبات اللقاح .

اهم العوامل في تكوين البراعم الزهرية

اولاً — حالة الشجرة الطبيعية : ان العامل الأكبر المسيطر على تكوين البراعم الزهرية هو حالة الشجرة الطبيعية (Physiological Condition) في اول أيام الصيف ، وبعبارة اخرى وفرة الأغذية الضرورية في الشجرة ونسبة التوازن فيما بينها في بدء موسم انتاج البراعم . وحسب نظرية كراوس و كريبيل (٣) تكون الشجرة في حالة من الحالات الأربع التالية :

يلاحظ ان كل ما ذكر عن تأثير المناخ في أشجار التفاح يقيم اعتباراً للاجزاء الخارجية التي يمكن الانتباه لها ، لكن للمناخ تأثيراً أشد وطأة على نمو أشجار التفاح وانتاجها لانه يسيطر على بعض الصفات الداخلية في الشجرة مثل كيفية تكوّن البراعم الزهرية ، وانهاء دور الاستراحة في البراعم ، وتكوّن حبيبات اللقاح ، والاختصاص والاثمار . وسنشرح بالتفصيل تأثير المناخ في هذه الصفات في الفصول التالية ليدرك المزارع أهمية المناخ في انتخاب أصناف التفاح المتنوعة وزراعتها وكيفية تعهدا .

الحالة الاولى - تكون المواد النشوية ضئيلة في الشجرة والمواد الازوتية فيها كثيرة نسبياً فتتكون بعض البراعم الزهرية ولا تصل الى درجة الازهار الكامل (CN) . (نيتروجين أو ازوت = N و كربون = C) .

الحالة الثانية - تكثر المواد الازوتية في الشجرة وتتوفر المواد النشوية نسبياً وقد تتكون بعض البراعم الزهرية لكنها اذا ازهرت فلا يتم اخصابها (CN) الحالة الثالثة - توجد المواد الازوتية والنشوية بمقادير وافرة جداً وبالنسبة الضرورية وفي هذه الحالة تتكون البراعم الزهرية بكثرة ويتم اخصابها وتكوّن ثمارها (CN)

الحالة الرابعة - قلة المواد الازوتية وكثرة المواد النشوية فينتج منها نحو خضري ضعيف يجده من تكوّن البراعم الزهرية (CN) والملاحظ ان انتاج البراعم الزهرية يتطلب المواد النشوية والازوتية بمقادير وافرة متوازنة، فاذا اختل هذا التوازن عن النسبة المطلوبة في اوائل الصيف قل تحوّل البراعم الخضرية الى براعم زهرية . والمعروف ان وفرة المواد النشوية والازوتية معاً لأمر أهم من النسبة بينهما اذ قد تكون النسبة جيدة والكميات المتوفرة قليلة وفي هذه الحال لا تتحول البراعم الخضرية الى براعم زهرية .

ثانياً - الضوء : لقد ورد تأثير الضوء في تكوّن البراعم الزهرية في الفصل السابق . فاذا قل الضوء لكثافة النمو الخضري الناشئ من انعدام التقليم او من تشابك الاشجار او من ضعف اشعاع الشمس او من قصر الأيام في بعض الاقاليم ينقص تكوّن البراعم الزهرية .

ثالثاً - التقليم : اذا زاد أو نقص التقليم عن المعدل المطلوب بالنسبة لحالة الشجرة وعمرها يختل التوازن بين المواد الازوتية والنشوية فيضعف احتمال تحويل البراعم الخضرية الى براعم زهرية .

رابعاً - الأسمدة الكيماوية : تشجع اضافة الاسمدة الكيماوية الى الاشجار على غير هدى اختلال التوازن بين النمو الخضري والشمري وخاصة اذا لم تُضف بالمقادير الضرورية وبالنسبة لحالة نمو الشجرة .

خامساً - مساحة الاوراق : قد ثبت بالاختبار العلمي ان لعدد الاوراق ومساحتها صلة وثيقة بانتاج البراعم الزهرية . فاذا قلت مساحة الاوراق من جراء سقوطها لاصابتها بالامراض او بمواد الرش او اطردت قوة النمو الخضري اختل التوازن المرغوب . وقد تبين ان من الافضل ألا تقل نسبة عدد الاوراق على الشجرة عن ثلاثين ورقة لكل ثمرة . من هذا يتضح ما لأعمال التعهد من تقليم وتسميد وسقاية ورش من أهمية في انتاج البراعم الزهرية .

سادساً - الماء : اذا نقص الماء او توفر كثيراً أثناء عملية تحويل البراعم الخضرية الى براعم زهرية في فصل الربيع يتضاءل انتاج البراعم الزهرية . فالأفضل ان تتناقص مقادير الماء المتوافر تدريجياً في موسم التحويل لان ذلك يوجد حالة طبيعية في الشجرة تشجع على انتاج البراعم الزهرية .

سابعاً - طبيعة نمو الصنف : تكوّن بعض الاصناف براعمها الزهرية في عهد باكر من عمرها مثل الصنف روم بيوتي ؛ ومن الاصناف مثل نورثون اسباي ما يتأخر كثيراً في تكوّن براعمه (السنة العاشرة) ؛ وغيرها تكوّن البراعم بانتظام كل سنة ؛ وخلافها تنتج الازهار بكثرة على غير انتظام سنة بعد اخرى . وهذه بعض الاصناف المعروفة بانتاجها المنتظم السنوي : كرافنشتين ، ما كنتوش ، كولدن ديليشس ، روم بيوتي ، استيمن واينساب ، بيزكود (مشح) ، كوكس اورنج ، رينيت دي كندا (شتوي) . واليك أسماء بعض الاصناف المعروفة بانتاجها غير المنتظم او الدوري (اي سنة بعد اخرى) : استراخان ، يلونيوتن ، رد ديليشس (استاركن) ، ونتربنانا ، جونانان ، اسبتزنبوك ،

نورثون اسباني ، كنج ديفيد .

علاقة تكون البراعم الزهرية بالثمار الدوري (غير المنتظم)

هذا سر من اسرار اشجار التفاح كشف العلماء عنه الستار حديثاً فاصبح بالامكان السيطرة على انتاج البراعم الزهرية سنوياً. والمعروف ان بعض اصناف التفاح تكوّن البراعم الزهرية باعتدال كل سنة . اما الأصناف الأخرى فمن طبيعتها أن تكوّن البراعم الزهرية بكثرة في سنة الاثمار القليل ولا تكوّن براعم زهرية في السنة التالية التي يغزر الاثمار فيها . وحياناً تصاب الاصناف السنوية الاثمار بضرية صقيع مفاجيء في اوائل الربيع تلتف ازهارها فيقل انتاجها، ولكن يكثر تكون البراعم الزهرية فيها في ذلك الصيف، وهكذا تنقلب الى صنف دوري (يثمر سنة بعد أخرى) . فما هي هذه الصلة الحقيقية بين الاثمار القليل وكثرة تكون البراعم الزهرية ؟ .. ان الجواب على هذا السؤال يزيح الستار عن خفايا العوامل الداخلية التي تمكن الصنف من تكوين البراعم الزهرية باعتدال كل سنة للحصول على انتاج وافر ومتساوٍ في جميع المواسم

لقد تكرر سابقاً ان هنالك علاقة مباشرة بين كمية المواد النشوية المتجمعة في الاغصان وعدد اوراق الشجرة ومساحتها وبين تكوّن البراعم الزهرية فيها . وقد ثبت مؤخراً ان ثمة صلة وثيقة بين عدد الاوراق على الدواير وبين الاغصان وعدد البراعم الزهرية التي تنتجها . فاذا ازيلت مثلاً جميع الاوراق باستثناء واحدة على الغصن ثمري فقد لا تتكون البراعم الزهرية او يكاد يتلاشى تكوّناتها . اما اذا ابقى على الغصن ثمري ثلاث اوراق فيتمددى عدد البراعم الزهرية الى ثلاثة اضعاف ، مما يدل اولاً على ان عمل الاوراق والدواير مستقل بعض الاستقلال عن اقسام الشجرة الأخرى بمعنى ان الاغصان الثمرية لا تتأثر كثيراً بغذاء الاقسام الأخرى وخاصة البعيدة منها . ثانياً ان الاوراق تصنع مادة ضرورية لتكوّن

البراعم بالاضافة الى المواد النشوية ، وان تلك المادة المنتجة في الورقة الواحدة على الغصن ثمري تُستعمل اولاً لسد مسيس حاجة بعض اعضاء اخرى من الشجرة وقد تكون الجذور او الثمار الحديثة التكوّن ، ولا يفيض منها سوى القليل لاستعماله في انتاج البراعم الزهرية . فيلاحظ انه بزيادة عدد الاوراق الى ثلاث على كل غصن ثمري يكفي ما ينتج من هذه المادة لسد حاجة الاجزاء الاخرى في الشجرة وما يفيض عنها كافٍ لتكوين البراعم الزهرية بكثرة (١١) . وقد حدد العلماء عدد الاوراق الضرورية لانتاج كل برعم زهري وتغذية الثمار الناتجة منه . فاذا ابقى على جميع اجزاء الشجرة معدل عشر اوراق لكل ثمرة تفاح فلا تتكون براعم زهرية ، اما اذا زيد هذا العدد الى خمسين ورقة فيمكن القول ان كل برعم على الغصن ثمري قد يصبح برعمة زهرية لتوفر المادة الهرمونية الضرورية ؛ وهذا يفسر ظاهرة تناقص انتاج البراعم الزهرية في السنوات الغزيرة الاثمار حيث لا يفيض من المادة الهرمونية ما يكفي لتكوّن البراعم الزهرية بوفرة . وبما هو جدير بالذكر هنا انه لا يمكن فصل انتاج المواد النشوية عن انتاج المادة الهرمونية ولا ان يفصل انتاج هاتين المادتين عن التوازن بين النمو الحصري والثمار لان للعوامل الثلاثة صلة وثيقة بانتاج البراعم الزهرية .

تظهر بما تقدم اهمية كيفية تكوّن البراعم الزهرية في إعداد الخطط الواجب اتباعها في زراعة بساتين التفاح وتمهدها كزرع الاصناف على الابعاد الصحيحة التي تؤمن النور الكافي لتكوّن البراعم او انتخاب التربة الحسنة لزراعة الاصناف القليلة الانتاج او رسم الخطط الحكيمة لتعهد البستان من حرث ونسب وتقليم وسقاية ورش بالادوية وتخفيف الثمار ليكفل انتاج البراعم الزهرية بمقادير وافرة ومتساوية سنوياً .

الفصل الثالث

انتهاء دور استراحة البراعم

عندما تسوء الاحوال الجوية في الخريف يتوقف النمو تدريجياً وتتساقط الاوراق عن الأشجار فيقال إنها دخلت دور الرقاد . انما قد تكون الاحوال الجوية وحالة التربة احياناً ملائمة للنمو في اواخر الصيف ومع ذلك يتوقف النمو وذلك لدخول الاشجار دور الاستراحة قبل الرقاد . ويعتقد كثير من المزارعين خطأ ان الطقس الدافئ في الربيع هو الذي ينهي دور الاستراحة ويدفع البراعم الى النمو والازهار . والحقيقة انه قد لا تبدأ الاشجار نموها في الربيع مع ان الظروف الطبيعية ملائمة جداً للنمو وذلك لعدم انتهاء دور استراحة براعمها . ولا يمكن انتهاء دور الاستراحة هذا الا اذا استوفت تلك البراعم المقادير اللازمة لها من البرد في فصل الشتاء وحينئذ فقط يمكن ان ينتهي دور رقادها . فما هو اذن دور الاستراحة وماذا نعني بمقادير البرد اللازمة لانهاؤه .؟

دور الاستراحة هو ظاهرة طبيعية ذات صلة وثقى بصفات اصناف التفاح الداخلية ، فهو اذاً صفة موروثية ملازمة للصفة ومجهولة الاسباب . لكن علم مؤخراً ان للمناخ تأثيراً بيئياً في تقصير هذا الدور او انهاءه في البراعم اذا تعرضت هذه لمقادير معروفة من البرد في الشتاء . لذلك يشاهد في الفصول التي لا تتدنى فيها

درجة الحرارة في الشتاء ان بعض اصناف اشجار التفاح لا تنمو جميع براعمها الخضرية بل يبقى بعضها راقداً في فصلي الربيع والصيف ، وقد لا تتفتح البراعم الزهرية او يمتد زمن تفتحها اكثر من المعتاد . وقد تبين ان اشجار التفاح تتطلب مقادير من البرد تزيد عما يتطلب غيرها من الاشجار المتساقطة الاوراق ، كما ان موعد دخول براعمها دور الاستراحة وانهاؤه فيها يختلف بين صنف وآخر وبين برعمة واخرى في الشجرة نفسها بحسب نوع البراعم وقوة نموها ، اذ يتطلب النمو القوي مدة اطول للاستراحة .

بناء على ما تقدم استطاع العلماء معرفة مقدار البرد اللازم لكل صنف على وجه التقدير وتحديد نوع المناخ والاقليم الملائم له . واجمالياً تفضل زراعة اشجار التفاح في اقليم لا يرتفع فيه معدل الحرارة شتاءً عن ٧ درجات مئوية فوق الصفر لمدة لا تقل عن شهرين ؛ ويجوز ان تقصر هذه المدة اذا تدنى معدل درجة الحرارة عن ذلك ، وان تطول اذا ارتفعت ، لان الجوهر في الامر هو مقادير او كمية وحدات البرد وليس زمنه ، ولذلك فانتشار الغيوم يقصر تلك الفترة كما ان ضوء الشمس في الايام النقية يطولها . ولهذا السبب يفضل الا تزرع اشجار التفاح بارتفاع يقل عن ٥٠٠ متر عن سطح البحر في لبنان اذ يتعذر الحصول في بعض السنين على مقادير البرد الضرورية لانهاؤه دور استراحة البراعم باقل من هذا الارتفاع مما يسبب خسارة كبرى في الانتاج (٨) .

تقدر وحدات البرد المهابطة في موقع معين بواسطة آلة تسجيل الحرارة (Thermograph) وذلك باحصاء عدد الساعات التي هبطت فيها الحرارة دون ٧ درجات مئوية في اليوم (٢٤ ساعة) ، فتعتبر كل ساعة منها وحدة حرارية . تجمع هذه الساعات لكل شهر من اشهر الشتاء ويعتبر متوسط معدل المجموع لاعوام عديدة مقدار وحدات الحرارة في ذلك الموقع . بناء على ذلك يقدر

وجوب الحصول في اي موقع على ما لا يقل عن ٨٠٠ وحدة حرارية لافل اصناف التفاح طلباً للبرد .

وذكر ان من حسنات هذه الظاهرة امكان معرفة طبيعة كل صنف ومقدار البرد الضروري له وبذلك يحدد الاقليم الملائم لزراعته . ولكن من سيئاتها انه في السنوات التي لا تتدنى فيها الحرارة الى الحد المطلوب لا تحصل اكثر الاصناف على مقادير البرد الضرورية وبصورة خاصة اذا تحلل فصل الشتاء ايام صحو كثيرة خالية من الغيوم ، فان الاغصان الشمية تتعرض اثناءها لدرجة من الحرارة اعلى من درجة حرارة الهواء المحيط بها فتطول مدة استراحتها او ترقد كل الصيف الذي يلي ذلك الشتاء ، او قد يتأخر تفتشح الازهار الى ميعاد ظهور الرياح الحسينية الجافة التي تلتف بعض الازهار او جميعها في داخل البواعم قبل تفتشحها ، او تعرضها للطقس المتقلب فيصعب اخصابها . مثلاً على ذلك انه اذا زرعت الاصناف التي تتطلب البرد القليل في المواقع الشديدة البرد فانها تستوفي كفايتها من البرد في وقت قصير ، فاذا تحسنت الاحوال الجوية فجأة في الشتاء زمناً يسيراً تبدأ بواعمها بالنمو وتزهو مبكرة فتعرض للاخطار الناجمة عن التغير المفاجيء في الاحوال الجوية غير المستقرة وفتتد كسقوط الصقيع والامطار والبرد اثناء الازهار او بعده . كما انه لا تستحسن زراعة الاصناف التي تتطلب البرد الكثير في مواقع منخفضة دافئة لانها لا تستطيع استيفاء المقادير الضرورية لها من البرد ، وبذلك اما ان يتأخر تفتشح بواعمها ، او قد تموت البواعم لقلة البرد ، او لا يتم اخصاب الازهار .

اصناف التفاح ومقادير البرد الضرورية لانهاء دور استراحتها

تقسم اصناف التفاح اجمالياً من حيث حاجتها للبرد شتاءً الى اربع مجموعات (٨) :

المجموعة الاولى : الاصناف التي تكفي بالمقادير القليلة من البرد ولا تتضرر اذا لم تتدن الحرارة في فصل الشتاء عن معدل ٧ درجات مئوية مدة شهرين . وهذه الاصناف تزرع بنجاح في المواقع القليلة البرودة والمنخفضة بين ٥٠٠ - ٧٥٠ متراً في لبنان ، او التي تحصل على ما لا يقل عن ٨٠٠ وحدة حرارية : اربي ماكنتوش ، ونتر بيرمين ، رد جون ، رينيت دي بلنهم ، ونتر بنانا ، كراوند الكسندر ، كليل دي سنت سوفير ، وكنج ديفيد .

المجموعة الثانية : الاصناف التي تكفي بمقادير متوسطة من البرد والتي تأذى أزهارها اذا لم تتدن الحرارة عن معدل ٧ درجات مئوية اثناء شهرين من فصل الشتاء ، وهي تزرع بنجاح بارتفاع ٧٠٠ - ١١٠٠ متر عن سطح البحر في لبنان ، او التي تحصل على ما لا يقل عن ١٠٠٠ وحدة حرارية ، وقد رتبت بحسب طلبها المتزايد للبرد : يلونيوتن ، كرافنشتين ، يلو بلفلور ، كنج ديفيد ، استيمن واينساب ، كولدن ديلبشس .

المجموعة الثالثة : الاصناف التي تتطلب مقادير من البرد أكثر من المتوسط والتي تتضرر أزهارها كثيراً اذا لم تتدن الحرارة عن ٧ درجات مئوية مدة اقل من ثلثة أشهر من فصل الشتاء ، وهي تزرع بنجاح بين ٩٠٠ - ١٣٠٠ متر عن سطح البحر في لبنان ، او التي تحصل على ما لا يقل عن ١٢٠٠ وحدة حرارية ، وقد رتبت بحسب طلبها المتزايد للبرد :

رد ديليش (استاركن) ، جوناثان ، اسوبس استونبرك ، كوكس
اورنج بين ، بيزكود نون سوتش (سان باري) ، رد استراخان ، واينساب ،
رينيت دي كندا (شتوي) ، روم بيوتي .

المجموعة الرابعة : الأصناف التي تتطلب أكبر مقدار من البرد وهي الناجحة
أكثر ما يكون في الأقاليم ذات الشتاء الشديد القساوة ولا تزرع بنجاح إلا
إذا زرعت على علو يتراوح بين ١٥٠٠-٢٠٠٠ متر عن سطح البحر في لبنان، أو
التي تحصل على ما لا يقل عن ١٦٠٠ وحدة حرارية : نورثون اسباي ، فاموز ،
كورتلند ، ماكتوش .

يتضح إذن ان مقادير البرد الضرورية لانتهاء دور الاستراحة في البراعم هي
المقياس الصحيح لتحديد زراعة الأصناف ونسبة نجاحها في الأقاليم ، وأصدق دليل
على انتخاب الملائم منها لكل موقع . إلا انه لا يغرب عن البال ان إدراج
الأصناف بين هذه المجموعات شيء غير مقيد تماماً. فمثلاً يمكن زراعة الصنف
ونترنانا في المجموعة الثانية كما انه يمكن زراعة الصنف يلونيوتن في المجموعة
الأولى لانهما متقاربان في حاجتهما للبرد أو تحملهما المناخ القليل البرودة .
والمعروف للآن انه مع بعض التحفظ يمكن زراعة الأصناف من أي مجموعة
كانت في مجموعة أعلى منها، ونقيض ذلك لا يجوز الا فيما ندر اذا لا تتفتح الأزهار
ولا يتم اخصابها .

ويمكن أحياناً تعديل الأغلاط الناجمة عن زراعة الأصناف في محيط غير
ملائم لها؛ فالأشجار غير المستوفية كفايتها من البرد يمكن رشها في الشتاء بزيت
معدنية خصوصية فتفتح بهذه الطريقة براعمها في الميعاد المعين، وهذا عمل ضروري
في السنوات التي يكون شتاؤها دافئاً (١٩٥٠ - ١٩٥١) .

الفصل الرابع

الاثمار

لقد سردنا كيفية تكوّن البراعم الزهرية وتأثير المناخ فيها وخاصة ضرورة
استيفائها مقادير معلومة من البرد لانتهاء دور استراحة كل صنف منها . ويجدر
بنا الآن تتبع كيفية تفتح البراعم الزهرية وتلقيحها واخصابها وانتاج الثمار
نظراً لصلة هذه العملية الوثقى بانتخاب الأصناف وتعيين مواقعها في البستان قبل
الافدام على الزرع .

التلقيح


ان اول خطوة في تكوين الثمار بعد اكتمال نمو البراعم الزهرية هي عملية انتاج
حبيبات اللقاح ونقلها الى مياثم الأزهار وتعرف بالتلقيح . فانتاج حبيبات اللقاح
هو عمل من الاهمية بمكان نسبة لأشجار التفاح لان أزهار أصنافه المتنوعة تنتج
حبيبات لقاح تختلف في كميتها وحيويتها ومقدرتها على اخصاب ذاتها وغيرها
من الأزهار وتكوين الثمار . ويستنتج من هذا ان لعملية التلقيح أثرها البالغ في
ازدياد الانتاج اذا روعي انتخاب الأصناف الملائمة المتجانسة وروعي توزيعها
في البستان بطرق صحيحة .

تجهيز حبيبات اللقاح - يبدأ تكوين حبيبات اللقاح في البراعم الزهرية في
فصل الحريف بنمو بعض أجزاء الجهاز التناسلي الذي يمر في عدد من الانقسامات

الاخصاب

تجهيز البويضات - تبدأ البويضات نموها بعد بدء نمو حبيبات اللقاح بزمن طويل أي في آخر فصل الشتاء ويجري انقسامها الاختزالي قبيل تفتح الأزهار أو في ميعاد الإزهار فتصبح كل بويضة حاملة لنصف عدد القضبان الوراثية الضرورية للاخصاب أي سبعة عشر قضيباً. ولتأخر الانقسام إلى حين الإزهار لا يمكن الانتقال من تأثير الأحوال الجوية المتقلبة حينئذ على تكون تلك البويضات التي قد لا يتم انقسامها الاختزالي لرداء الطقس فتصبح عديمة النفع.


نمو حبيبات اللقاح في اتجاه البويضات - يجب أن تنقل حبيبات اللقاح إلى المياسم الجديدة التي يحمل سطحها المادة اللزجة الضرورية لتثبيت هذه الحبيبات



(مكدايازا)

الشكل رقم ٢ - مقطع طولي لزهرة تفاح في حال الاخصاب . لاحظ حبيبة اللقاح النامية داخل القلم باتجاه المبيض لاخصاب احدى البويضات العشر . يجب تلقيح ثلاث بويضات (بذور) لتأمين تكوين ثمرة التفاح ، وازدياد هذا المدد يزداد احتمال عدم سقوط الثمرة واكتمال شكلها .

الاختزالية الجنسية الضرورية لتكوين حبوب اللقاح بحيث تصبح هذه الأخيرة جاهزة للاخصاب في الربيع قبيل ميعاد الإزهار بأيام قليلة . وحببة اللقاح الجاهزة للاخصاب هي عبارة عن خلية واحدة محصنة بجدار سيك يحيط بالمادة الحيوية (البروتوبلازم) والنواة . وتحتوي هذه النواة الجنسية في الأحوال العادية قبل الانقسام الاختزالي على العدد الكامل من القضبان (الكروموزومات) الحاملة صفات الصنف . أما في أحوال تجهيزها للاخصاب فتصبح حاملة لنصف العدد الطبيعي نتيجة للانقسام الاختزالي . ونصف العدد الأساسي (haploid) لهذه



(مجاصص)

القضبان في التفاح هو سبعة عشر قضيباً . وقد يكون العدد الكامل أربعة وثلاثين قضيباً في الأحوال الطبيعية في بعض الاصناف وتسمى ثنائية الجنس (diploid) ؛ أو واحداً وخمسين قضيباً في ظروف غير طبيعية في بعض الاصناف الأخرى وتسمى ثلاثية الجنس (triploid) . ولهذا الحالة صلة مباشرة بالقدرة على الاخصاب أو عدمه (١٧) . فالاصناف الثلاثية الجنس ضعيفة أو لا مقدرة لها على الاخصاب لضعف حيوية حبيبات اللقاح فيها .

التلقيح - يتم نضج المتكات الحاملة حبيبات اللقاح في الربيع بعد تفتح التويج ببضع ساعات فقط وتفتح وتنقل منها حبيبات اللقاح إلى المياسم بواسطة الحشرات إذا لاءمتها الأحوال الجوية وبهذا ينتهي التلقيح ويبدأ الاخصاب .

أكثر من ثلاث بذور محصبة لاتمام نموها ، وبازدياد عدد البذور المحصبة تزداد امكانية استمرار نمو الثمرة بالشكل والحجم الطبيعي وعدم سقوطها (١٢) .

العوامل الحائلة دون الاثمار

(الانعقاد)

تنحصر العوامل التي تحول دون الاثمار في نوع الاغذية الجاهزة ومقاديرها في الشجرة عند الاخصاب، والاحوال الجوية، وتباين الصفات الجنسية، والامراض والحشرات، ومواد الرش والتغبير الكيماوية .

١ تأثير الماء ونوع الاغذية ومقاديرها - ان وجود الازوت بمقادير قليلة نسبياً في الاشجار في ميعاد الازهار بسبب سقوط الازهار والنار الحديثة التكوّن معاً حتى ولو كانت تامة الاخصاب وحاملة عدداً وافراً من البذور (١٨) . ولازالة هذا الخطر وجب تسبيد الاشجار بهذا العنصر قبل الازهار بثلاثة اسابيع . وكذلك فان مقادير الماء القليلة وخاصة في الاتربة الخفيفة جداً ، ومقادير الماء الكثيرة وخاصة في الاتربة الثقيلة الرديئة الانصراف تسبب سقوط الاثمار الحديثة التكوّن بكثرة .

٢ تأثير المناخ في الاثمار - يسيطر المناخ على الاثمار سيطرة قد تقضي على الموسم بكامله لان الحرارة المرتفعة او المتدنية فجأة والصقيع والهواء الحار والجفاف او الرطوبة الكثيرة والامطار قد (آ) تعطب حبيبات اللقاح في المتك (ب) تجفف المياسم او تميته (ج) تمنع انبات حبيبات اللقاح (د) واذا نبتت فقدت تحول دون وصولها الى المبيض (هـ) وتؤخر حركات الحشرات الناقلة لحبيبات اللقاح عن القيام بعملها في الوقت المناسب . واكثر الاصناف تأثراً

والثاماً بأقصر مدة ممكنة ، أي قبل انقضاء أربعة أيام على تفنح الازهار ، لان المياسم في هذه الغضون تتعرض للجفاف بأشعة الشمس او الرياح الشرقية او قد تعطلها الامطار . ويهبط حبيبات اللقاح على المياسم تبدأ بالنمو داخل القلم باتجاه المبيض (الشكل رقم ٢) . وقد تتم هذه العملية خلال ثمان واربعين ساعة في الظروف الطبيعية الا ان هذه الرحلة لا تتم عادة بهذه السهولة لاسباب المبينة في العوامل التي تحول دون الاثمار وجلبها يعود الى الأحوال الجوية والعلاقات الجنسية بين الاصناف .

اتمام الاخصاب - اذا نجح الحيط الدقيق النامي من حبيبة اللقاح في سطح الميسم بالتغلغل الى البويضة (الشكل رقم ٢) يخترقها (البويضة) وهناك يحصل الاخصاب المزدوج بين نويتي حبيبة اللقاح والبويضة وينتج من ذلك تكوّن البذور . فاذا كان الاخصاب كاملاً يمكن ان تكوّن في كل ثمرة تفاح عشر بذور ، انما هذا غير متيسر دائماً . هذا ويندر ان تتكون ثمار التفاح بدون اخصاب باستثناء الصنف اولدنبوك (١٧) .

الاثمار

(الانعقاد)

ماذا يعني بالاثمار؟ - قد يتم الاخصاب ولا تتكوّن ثمار، ولذلك فالاثمار يعني اتمام الاخصاب وبدء نمو الثمرة بانقسام خلاياها وبقائها على الشجرة ولو الى وقت قصير مما يدل على ان الزهرة المحصبة قد لا تصبح ثمرة بمجرد حصول الاخصاب المزدوج بين النويات . فمثلاً اذا اخصب مبيض (Carpel) واحد فقط ضمنه بويضتان فقد تحسبان وينتج منهما بذرتان ، وهذه لا تكفي لانماء الثمار لعدم امكان حصول انقسام في خلاياها فتسقط، اذ قد ثبت وجوب احتواء الثمرة على

بالمناخ هي المبكرة في الازهار يضاف اليها صنفاً رد ديليشس (استاركن)
واستين واينساب .

٣ تأثير تباين الصفات الجنسية - يُستدل بما ذكر عن التلقيح والاختصاص
انها ضروريان لانتاج الثمار، وانه بارتفاع نسبة الاختصاص في الزهرة الواحدة وفي
مجموع الازهار تزداد نسبة الإثمار في الاشجار . انما قد لا يختص جميع الازهار
بالنسب نفسها فيشاهد في بعض المواسم ان الازهار الكثير لا ينتج منه إثمار
كثير مع انه يكفي ان يختص ١٥٪ من الازهار لانتاج ثمار كثيرة تتطلب
التخفيف . ومعظم الاسباب التي تحول دون اتمام الاختصاص ترجع الى اختلاف
جنسي في الاصناف واليك بعضها :

آ - ضعف الاعضاء التناسلية : تختلف الاصناف من حيث قدرتها على انتاج
حيبيات لقاح او بويضات ذات حيوية قوية . فالاصناف الثلاثة الجنس تنتج
حيبيات لقاح ضعيفة وغالباً عقيمة ولا تصلح للاختصاص . وتنتج الاصناف الاخرى
حيبيات لقاح تتفاوت حيويتها بحسب الصنف وبحسب تقدمها في العمر .

ب - عدم التجانس الذاتي : اكثر اصناف التفاح تنتج حيبيات لقاح لا
تتمكن من اختصاص بويضات الازهار التي تحملها او الازهار النامية على اشجار
اخرى من الصنف عينه . ويعتبر عدم التجانس الذاتي اكبر عامل في اخفاق
عملية الاختصاص الذاتي في اشجار التفاح . ويعزى السبب الى عدم التجاوب
الجنسي الناتج من اختلافات في تركيب الاعضاء التناسلية وغوها ، ولعلها سبب
الطبيعة في منع الاختصاص الذاتي .

ج - عدم التجاوب الجنسي بين الاصناف : ثمة اصناف كثيرة تنتج حيبيات
لقاح ذات حيوية قوية لكنها لا تستطيع اختصاص بعض الاصناف الاخرى من
التفاح لعدم تجاوبها الجنسي (Sexual Affinity) .

د - الصلة الوراثية : قد لا يتم الاختصاص بين صنفين للصلة الوراثية التي
تمت اليهما والنتيجة من أن أحد الاصناف هو طفرة من الصنف الآخر . فالصنف
رد ديليشس مثلاً لا يختص الاصناف المشتقة منه بالبرعم مثل استاركن وشوتول
ديلشس ؛ والصنف ما كنتوش لا يختص بلاك ماك المشتق منه .

هـ - ميعاد الازهار: لا يكفي ان يكون هناك تجاوب جنسي بين الاصناف
للحصول على اختصاص جيد بل يجب ان تزهو الاصناف المراد تلقيحها في آن
واحد مع الاصناف الملقحة (بكسر القاف) كأن تزور الاصناف المبكرة
الازهار معاً مثل رد استراخان وكرافنشتين وما كنتوش والمتأخرة معاً مثل
روم بيوتي ونورثون اسباي ويلونبوتن .

ويختلف ميعاد الازهار من موسم الى آخر اذ قد يصادف بدءه ظرف كثير
الشتاء وقارس البرودة او مرتفع الحرارة وجاف فتتلف الازهار . او قد تطول
مدة الازهار او تقصر بحسب طبيعة الشتاء السابق .

و - التفاوت في اعمار الاشجار : قد يعني التفاوت في اعمار الاشجار
تفاوتاً في حيوية حيبيات اللقاح او البويضات ايضاً فتقل حيويتها وتنقص قدرتها
على الاختصاص . كما ان هنالك تفاوتاً في مواعيد بدء انتاج حيبيات اللقاح
والبويضات في الاصناف . فبعضها مثل الاصناف جونانان وكولدن وردد ديلشس
تنتج الازهار الكاملة وهي حديثة العهد ؛ والبعض الآخر مثل صنف يولونبوتن
ونورثون اسباي لا تصل درجة بلوغه قبل مرور عشرة اعوام من تاريخ الغرس .
فلا يجوز زرع اصناف الفئة الاولى والثانية اذا رغب الحصول على اختصاص جيد .

ز - الاصناف الدورية : تقل نسبة الاختصاص اذا زرعت الاصناف المشجرة
سنوياً مع الاصناف التي تثمر سنة بعد اخرى بغير انتظام ، او اذا غرست
الاصناف الدورية الاثمار وكان دور اثمارها مخالفاً .

ح - التركيب الجنسي : قد تموت حبيبات اللقاح او البويضات في الاصناف الثلاثة الجنس لعدم امكان انقسام خلاياها انقساماً اختزالياً طبيعياً .

ان رسم خطة الزرع الكفيلة بحدوث التلقيح والاختصاب الجيد ليس بالامر اليسير ، فقد كشف البحث ان مقدرة الاصناف على انتاج حبيبات لقاح صالحة للاختصاب قد تختلف من اقليم الى آخر كما انها تتأثر كثيراً بالغذاء والاتربة والمناخ ، ولذلك كان من الضروري درس هذه الظاهرة في كل بلد يهتم بامرها لاستطاعة وضع الخطط الصحيحة التي تكفل الاختصاب . وهذه اسما بعض الاصناف الثلاثة الجنس وهي غير صالحة للتلقيح والاختصاب : كرافنشتين ، رينيت دي كندا ، اسنيم و اينساب ، براملي سيد لنج ، وواينساب . اما الاصناف التالية فتنتج حبيبات لقاح ذات حيوية جيدة الا انها لا تصلح لاختصاب ذاتها مثلما تصلح للاختصاب المختلط : رد ديليشس (استار كن) ، كولدن ديليشس ، كنج ديفيد ، ماكتوش ، نورثون اسباي ، وتوربانا ، يلوبفلور ، كوكس اورنج بين . والاصناف التالية تصلح للاختصاب الذاتي والحلطي معاً : اسبزنبرك ، جونانان ، رد استراخان ، روم بيوتي ، يلونبوتن .

٤ تأثير الأمراض والحشرات في الاثمار - اذا لم يتخذ المزارع الوسائل الوقائية الضرورية في الوقت المناسب لمكافحة الحشرات والأمراض التي تفتك باشجار التفاح وثمارها تصل بالنهاية حتماً الى اتلاف البراعم والأزهار او تكون حائلًا دون اختصابها . من هذه الحشرات ما تنقب البراعم او تعطب الأزهار مثل حشرة انثونومس بومورم (*Anthonomus pomorum*) ؛ وكذلك حشرة دودة ثمار التفاح (*Cydia pomonella*) اذا انتهت الى الجنين داخل الثمار الحديثة تسبب سقوطها، واذا وصلت متأخرة بعد اكتمال نمو الجنين تسبب نضج الثمار قبل اوانها . والمرضان ، التبقع (*Venturia inaequalis*) واللفحة النارية (*Bacillus amylovorus*)

يتلفان الأزهار ويسببان سقوطها اذا اشتدت وطأتهما على الاشجار ابان تفتح الاثمار .

٥ تأثير الرش بالمواد الكيماوية في الاثمار - ان الرش بالمواد القلوية مثل محلول الكلس والكبريت قبل ميعاد الاثمار مباشرة او اثناءه او بعده لعمل ضار جداً بالثمار (٥) وخاصة في الاصناف المتوسطة الانتاج مثل رد ديليشس واستيمن واينساب وماكتوش لانه قد يعطب الأزهار او يسقط الثمار .

الاحتياطات العملية لزيادة نسبة الاثمار

يتضح مما سبق بجهه مدى تأثير العوامل التي تحول دون الاثمار في تدني الانتاج . ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات العملية لزيادة نسبة الاختصاب والاثمار وذلك بانتخاب المواقع الملائمة وتعيين الملقحات وتوزيعها بين الاصناف الاساسية تبعاً لنظام يضمن الانتاج الوفير .

انتخاب الموقع - ان للموقع المشجر تفاحاً تأثيراً بالغاً في الاثمار لانه يحدد ميعاد انتهاء دور استراحة البراعم وتفتح الاثمار؛ فاذا كان الموقع بالقرب من بحر او بحيرة تكون الرياح المارة نحوه اكثر برودة من الرياح المارة على سطح اليابسة وفي هذه الحال تتأخر مواعيد تفتح أزهاره وتنجو غالباً من ضربات الصقيع في اكثر المواسم . اما الأشجار الواقعة في الاتجاه الشرقي او البعيدة عن اجسام مائية كبيرة، والتي نالت كفايتها من البرد في الشتاء، فهي معرضة لتفتح أزهارها مبكراً في الربيع بداعي ارتفاع الحرارة المبكر في ذلك الاقليم فتعرض لضربات الصقيع المفاجيء او للجفاف الناتج عن الرياح الشرقية .

انتخاب الملقحات - يمكن زيادة انتاج اشجار التفاح بانتخاب الملقحات المناسبة وغرسها بين الاشجار الاساسية في البستان . ويجب ان يتصف الصنف

الملقيح بالصفات التالية: أولاً ان ينتج حبيبات لقاح ذات حيوية قوية ويكون بينه وبين الصنف الاساسي تجارب جنسي في الاخصاب ؛ ثانياً ان يبدأ ازهاره وإثماره في ميعاد ازهار الصنف الاساسي وإثماره ؛ ثالثاً ان ينتج الازهار بمقادير وافرة سنوياً ؛ رابعاً ان يلائم المحيط الذي سيزرع فيه ؛ خامساً ان يكون من الاصناف التجارية حتى يستفاد مادياً من ثماره. (راجع الجدول الاول)

وأفضل الاصناف للتلقيح والاختصاص هي: جوناثان ، روم بيوتي ، رد دبليش (استاركن) ، كولدن دبليش ، يلونيوتن ، وتربنانا ، بيزكوود ، نورثون اسباي ، ماكتوش ، ورد استراخان ، وجميعها ثنائية الجنس وتختلف مواعيد تفتح أزهارها ، ومواقع زرعها ، وقدرتها على انتاج حبيبات اللقاح والاختصاص الذاتي والمختلط ، وأكثرها من الاصناف التجارية العالمية .

وتظهر الاصناف التالية تجاوباً جنسياً في الاختصاص :

الصنف روم بيوتي ينحصر جيداً الاصناف التالية : وتربنانا ، كرافنشتين ، رد دبليش ، كولدن دبليش ، جوناثان ، وبيزكوود .

والصنف رد دبليش ينحصر جيداً الاصناف التالية : وتربنانا ، كرافنشتين ، جوناثان ، روم بيوتي ، رد استراخان ، رينيت دي كندا ، وبيزكوود .

والصنف وتربنانا ينحصر جيداً الاصناف التالية : رد دبليش ، روم بيوتي ، ورد استراخان .

والصنف استراخان ينحصر الاصناف التالية : جوناثان ، وتربنانا ، روم بيوتي ، ورينيت دي كندا .

والصنف جوناثان ينحصر جيداً الاصناف التالية : كرافنشتين ، رد دبليش ، واينساب ، واستيمن واينساب وكثيراً من الاصناف الاخرى بدرجات متفاوتة النجاح .

الجدول الاول - مواعيد الازهار والتركيب الجنسي وصلاحية بعض اصناف اللقاح للاخصاب (٤) و(٩) و(١٣) و(١٦) و(١٧) و(١٨)


صلاحية النوع للاخصاب	طريقة الاختصاص	التركيب الجنسي	جوية حبيبات اللقاح	ميعاد الازهار	اسم الصنف
جيد جداً	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	جيدة	مبكر	رد استراخان
وسط	عقم ذاتي اخصاب خططي	?	جيدة	مبكر	رد جيون
غير صالح	عقم ذاتي وخططي	ثلاثي	ضعيفة جداً	مبكر	كرافنشتين
جيد جداً	عقم ذاتي اخصاب خططي	ثنائي	جيدة	مبكر	ماكتوش
متماز	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	متمازة	متوسط مبكر	جوناثان
جيد	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	جيدة	متوسط مبكر	اسويس استراخونك
جيد جداً	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	جيدة	متوسط مبكر	بيزكوود نون سوتش (متسخ)
وسط	عقم ذاتي كامل اخصاب خططي	ثنائي	جيدة	متوسط مبكر	كوكس اورتج بين
غير صالح	عقم ذاتي وخططي	ثلاثي	ضعيفة جداً	متوسط	استيمن واينساب
وسط	عقم ذاتي اخصاب خططي	ثنائي	وسط	متوسط	يلو بلتور
جيد جداً	عقم ذاتي جزئي اخصاب خططي	ثنائي	جيدة جداً	متوسط	ونتر بنانا
جيد جداً	عقم ذاتي اخصاب خططي	ثنائي	جيدة جداً	متوسط	رد دبليش
غير صالح	عقم ذاتي وخططي	ثلاثي	ضعيفة	متوسط	واينساب
غير صالح	عقم ذاتي وخططي (جزئي)	ثلاثي	ضعيفة	متوسط متأخر	رينيت دي كندا
جيد جداً	عقم ذاتي جزئي اخصاب خططي	ثنائي	جيدة جداً	متوسط متأخر	كولدن دبليش
جيد جداً	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	جيدة جداً	متأخر	يلونيوتن
متماز	اخصاب ذاتي وخططي	ثنائي	متمازة	متأخر	روم بيوتي
جيد	عقم ذاتي اخصاب خططي	ثنائي	جيدة	متأخر جداً	نورثون اسباي

وهناك اصناف من التفاح تتطلب لاختصائها وتكوين ثمارها وجود اصناف معينة من الملقحات ؛ فمثلاً الصنف كرافنشتين يتطلب وجود الصنف جونانان ؛ والصنف استيمن واينساب يتطلب وجود رد ديليش ؛ والصنف جونانان يعطي انتاجاً اوفر بوجود الصنف رد ديليش ؛ والصنف كولدن ديليش يتطلب وجود روم بيوتي .

نظام توزيع الملقحات - لا ضرورة لاتباع نظام خاص في توزيع الملقحات في البساتين الصغيرة ، ويكفي ان تكون الملقحات متنوعة وموزعة بين الاشجار الاساسية . الا انه من الضار جداً زراعة مساحات كبيرة متراصة من صنف واحد من التفاح دون توزيع الملقحات فيها بنظام خاص لان الانتاج ينحط كثيراً بسبب العقم الذاتي الجزئي او الكامل في الصنف المزروع . فمن الضروري اذن زراعة الاصناف الملقحة المتجانسة في اختصاصها مع الصنف الاساسي على ان لا تقل نسبتها في اية حال عن ١٥٪ من مجموع اشجار التفاح في البستان . واذا كان الصنف الاساسي ذا عقم ذاتي كامل يفضل الا تقل نسبة الاصناف الملقحة عن ٢٥٪ ؛ كما يفضل ان لا تزيد المسافة بين الاشجار الاساسية والملقحة على ٢٥ متراً . ومن المرغوب زرع صنفين من الملقحات مع الصنف الاساسي لضمان الاخصاب الكامل والانتاج الغزير . ويختلف نظام توزيع الملقحات في بساتين التفاح باختلاف طبيعة الموقع والاقليم والمسافات بين الاشجار وعدد الاصناف الاساسية وطبيعتها والاصناف الملقحة ومجموع عدد اشجار التفاح في البستان . فيبدو من ذلك ان لكل حالة نظاماً خاصاً (الشكل رقم ٣) .

اما بعد الزرع فلا تتعدى الاحتياطات العملية لزيادة نسبة الاثمار القيام بتعمد الاشجار بالطرق الصحيحة كأن توضع قفران نخل ، وتضاف الاغذية الضرورية ، ويتجنب الحرث والرش في مواعيد الازهار .


(١)



الشكل رقم ٣ - بيانان لنظام توزيع الملقحات في بساتين التفاح .

(١) الصنف الاساسي . - كرافنشتين (.) عقم ذاتي وخطي كامل (ثلاثي الجنس) ميعاد الازهار مبكر .

(٢)



(مملوف)
الاصناف الملقحة . - استراخان (■) جونانان (x) رد ديليش (.) نسبة الملقحات في البستان : ٣٣٪

(٢) الصنف الاساسي . - استراكن ديليش (.) عقم ذاتي واخصاب خطي (ثنائي الجنس) ميعاد الازهار متوسط .

الاصناف الملقحة . - جونانان (x) وتربنانا (.) روم بيوتي (■) نسبة الملقحات في البستان : ٢٢٪

ضرورة النحل للتلقيح - لا تنتقل حبيبات اللقاح من المتكات الى المياسم في ازهار التفاح الا بواسطة الحشرات وفضلها النحل . وتكفي خلية او قفير قوي منه لتلقيح مايتي شجرة تفاح او ما مساحته ستة دونات من الارض . يجب الاعتناء بتربية النحل ليصبح قوياً جداً في ميعاد الازهار للنهوض بعمله المجدي المتواصل دون انقطاع والا فتهبط نسبة الاخصاب والاثمار كثيراً . كما يجب

تجنب التعمير بالمساحيق الكيماوية او الرش بالمحاليل قبل تفتح الازهار مباشرة
وانماه لتلافي ارتفاع عدد الوفيات بين النحل العامل فتشل حركته الانتقالية
بين الاشجار .

احتياطات عمية اخرى - في المواقع الدافئة القليلة الارتفاع يمكن حرت
تربة البستان حرثاً عميقاً في الحريف رغبة في تأخير موسم النمو لان ذلك يؤخر
البدء بدور الاستراحة فيتأخر ميعاد الازهار في الربيع . وبعد هذا العمل ضاراً
جداً في الاقاليم الباردة لانه يؤخر نضج النمو السنوي ويعرضه لضربات الصقيع .
ويجب ان يتجنب المزارع الحرت العميق اثناء الازهار في الربيع لانه ضار
بالاخصاب والاثمار (١٤) .

وهنا ينطبق ما ذكر سابقاً من ان اضافة الازوت بمقادير وافرة لثلاثة اسابيع
قبل ميعاد الازهار تساعد على زيادة نسبة الاثمار وتحول دون سقوط الثمار .
كما ان التقليل الحاطيء قد يضعف النسبة بين المواد النشوية والازتية وبذلك
يتأثر الاخصاب لفقدان المواد الازوتية المستخدمة في بناء الاجزاء الخضرية في
ذلك الحين .

الفصل الخامس

اثر الاصول البرية في احجام اشجار التفاح

تأثير الاصل في المطعوم

ان اكبر سبب في اختلاف احجام اشجار التفاح هو نوع الاصول المطعمة
عليها ، اذ ان للاصل البري تأثيراً عظيماً في المطعوم لانه يحدد حجمه واحياناً
شكله وسرعة نموه وانتاجه . وقد ثبت ان الاصل المقصر الذي بطبيعته لا يكبر
حجمه يقصر المطعوم ذا الحجم الكبير وغالباً ما يأخذ شكله . وكذلك فالاصل
المكبر القوي النمو يكبر حجم المطعوم الذي بطبيعته لا يكبر . هذا كله بالإضافة
الى التباين الطبيعي في أحجام اشجار التفاح الناتج من التطعيم على اصل بذري (١٧) .
وافضل مثال على تأثير الاصول البرية في المطاعيم هو مجموعة مولنج من الاصول
البرية الشهيرة التي يظهر منها ان بالامكان تطعيم صنف تجاري واحد على جميع
اصناف اصولها البرية فتختلف احجامه من متر ونصف المتر الى عشرة امتار في
الارتفاع . ومن حسنات هذا التأثير انه يمكن بواسطته انتخاب اصول معروفة
تلائم الاتربة والاقاليم والاصناف المتنوعة بما يساعد على توسيع المساحة المغروسة
باشجار التفاح (راجع الباب السادس) .

وكذلك يظهر ان نوع الاصول يؤثر في كيفية تكوين البراعم والبدء بالاثمار .
فالاصول المقصرة بتقنينها استعمال المواد النشوية في الشجرة تزيد نسبتها في

تأثير المطعوم في الاصل

كان الاعتقاد السائد ان المطعوم يتأثر بنوع الاصل ولا يؤثر فيه . ولكن وجد بالاختبار ان للمطعوم تأثيراً بيئياً في سرعة نمو الاصل ؛ فللمطعوم القوي تأثير في نمو الاصل اشد من تأثير الاصل المكبر في نمو المطعوم الضعيف (١٧) ، وذلك يرجع الى ان المطعوم يمد الاصل وخاصة جذوره بمادة ضرورية لنموه وتُعرف بالهورمون او فيتامين ب ١ . هذا وان لانتشار اغصان المطعوم او الشجرة وعددها تأثيراً مباشراً في انتشار جذور الاصل ونموها وعمقها وطبيعتها . فمثلاً اذا ما نُطعت اصناف مختلفة على اصول من بذور مالمس كومبونس الاصل الفرنسي المكبر وزرعت في تربة واحدة يختلف نمو الجذور وشكلها باختلاف الاصناف المطعمة عليها .

يتضح مما سبق ذكره انه يترتب على المزارع الامام بطبيعة نمو الاصناف والاصول المتنوعة قبل ان يبدأ في انشاء بستانه ، وقد افردنا باباً بكامله لبحث انواع الاصول وطبائع نموها وكيفية تكثيرها وتطعيم اصناف التفاح عليها (راجع الباب السادس) .

وخلاصة القول ان على الراغب في انشاء بستان من اشجار التفاح ان يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والجنسية المار ذكرها قبل الاقبال على عمله ، وان يرسم خطة الزرع بموجب هذه المعلومات والا ارتكب اغلاطاً اساسية تكبده نفقات باهظة في مستقبل الايام ، مع ان معرفتها لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تستهلك جهداً كبيراً قبل الشروع بالعمل .

الاغصان وهذا مما يساعد على انتاج براعم ثمرية بكثرة ، كما يساعد على التبكير في تكوين هذه البراعم في مستهل عمر الاشجار ؛ مثلاً على ذلك اذا طعم الصنف نورثون اسباني على الاصل مالمس كومبونس يبدأ اثماره بعد عشر سنوات تقريباً ، اما اذا طعم على الاصل دوسان النصف المقصر فيثمر بعد ست سنوات . وقد لا يؤثر نوع الاصل في اوان ازهار الاشجار في الربيع (?) .

تختلف الآراء في هل للأصل تأثير حقيقي في كمية الثمار ونوعها وموعد نضجها وطعمها وجودتها ، ولا يمكن الجزم في ذلك لنضارب النتائج التي توصلت اليها الابحاث العلمية اليها . ولكن المعروف ان الاصل الضعيف او المقصر ينضج ثماره باكراً في الموسم لاسباب طبيعية وكماوية لا لاسباب ترجع الى طبيعة الاصل . لذلك اذا كان فصل نمو الثمار ونضجها قصيراً فالأفضل زراعة الاشجار المطعمة على اصول نصف مقصرة لان الثمار تنمو عليها وتنضج بسرعة فيكون لونها اجمل وطعمها الذ . وبالعكس اذا كان فصل النمو طويلاً كما هي الحال في اكثر المواقع في لبنان وكان الاصل مقصراً تنضج ثمار المطعوم مبكرة في وقت حرارته شديدة الوطأة فينتج من ذلك لون غير طبيعي وطعم غير مرضٍ بالنسبة لصفات الصنف الطبيعية (١٧) وفي هذه الحال يفضل زراعة الاشجار المطعمة على الاصول المكبرة في المواقع المتوسطة الارتفاع والمرفعة التي يتأخر نضج ثمارها ريثا يبرد الجو .

يتوقف تأثير الاصل في مدى حياة شجرة التفاح على عدة عوامل متشابهة بعضها ببعض ؛ منها ان جميع العوامل التي تساعد على زيادة الانتاج تعجل في نهاية حياة الشجرة المثمرة ؛ وكذلك فان عدم التجانس الآلي والطبيعي بين المطعوم والاصل هو اقوى الاسباب في تقصير أجل الشجرة . يتضح من هذا ان الاصول المقصرة لا تعمر عليها الاشجار طويلاً .

مراجع الباب الاول

- ١ ل. ه. مكداينالز - تركيب ثمار التفاح وثمار تفاحية اخرى - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كورنيل - مذكرة رقم ٢٣٠ سنة ١٩٤٠ .
- ٢ س. برنارد - دراسات في النمو وتكوين البراعم الثمرية - مجلة جمعية الابحاث العلمية الصناعية - مجلد رقم ١١ صفحة ٦١ - ٧٠ سنة ١٩٣٨ .
- ٣ م. ه. هيلر وج. ر. ماكنس - علاقة مساحة الاوراق وموقعها بجودة الثمار وامكانية انتاج البراعم الزهرية في التفاح - المجلة العلمية لدائرة الزراعة في الولايات المتحدة الاميركية رقم ٣٣٨ سنة ١٩٣٣ .
- ٤ ل. ب. لاتيمر - التلقيح والاثمار في التفاح - مجلة محطة التجارب الزراعية ولاية نيومشير رقم ٢٧٤ سنة ١٩٣٣ .
- ٥ ل. ه. مكداينالز و. ا. ب. بوريل - تأثير الرش بالمواد الكبريتية اثناء الازهار على الاثمار في التفاح . مجلة فيتوبولوجي - مجلد ٢٤ ص ١٤٤ - ١٥٠ سنة ١٩٣٤ .
- ٦ م. ب. كرين وج. س. لورنس - مقدرة الاخصاب وقوة أشجار التفاح بالنسبة الى عدد القضيبان (كروموزومات) - مجلة علم الوراثة (جنتكس) مجلد ٢٢ ص ١٥٣ - ١٦٣ سنة ١٩٣٠ .
- ٧ ي. ي. اوختر وج. و. روبرتس - رش التفاح لتخفيف او منع الاثمار - وقائع الجمعية الاميركية للعلوم الشجرية . مجلد ٣٢ ص ٢٠٨ - ٢١٢ سنة ١٩٣٥ .
- ٨ و. ه. تشاندلر وم. ه. كمال - مقادير البرد اللازمة لتفتح براعم الاشجار الثمرة ونباتات اخرى في كاليفورنيا - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كاليفورنيا رقم ٦١١ سنة ١٩٣٧ .
- ٩ س. ه. هوير - مواعيد تفتح ازهار الاصناف المختلفة من التفاح وعلاقتها بالتلقيح الحطلي . مجلة الكلية الزراعية في واي بانكلترا . مجلد رقم ٣٤ ص ٢١٠ - ٢١٥ سنة ١٩٣٤ .
- ١٠ س. ب. هارلي وج. ر. ماكنس - تحريات في اسباب وطرق مكافحة الاثمار الدوري في اشجار التفاح - مجلة دائرة الزراعة في الولايات المتحدة الاميركية . المجلة العلمية رقم ٧٩٢ سنة ١٩٤٢ .
- ١١ اولاف اينست - انعدام الاخصاب المختلط في التفاح - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كورنيل . المجلة العلمية رقم ١٥٩ سنة ١٩٣٠ .
- ١٢ ب. ه. شبارد - مواعيد ازهار ونضوج ثمار التفاح النح - مجلة محطة التجارب الزراعية - ولاية ميسوري رقم ٢٥ سنة ١٩٣٧ .
- ١٣ ف. ر. جاردنر - مبادئ علم الاشجار - كتاب سنة ١٩٤٥ .
- ١٤ ل. ه. مكداينالز - مخبرات خاصة مع المؤلف سنة ١٩٤٩ .
- ١٥ و. ه. تشاندلر - بساين الاشجار المتساقطة الاوراق - كتاب سنة ١٩٤٧ .
- ١٦ ج. ه. كورلي و. ف. س. هوليت - الطرق الحديثة لانتاج الثمار - كتاب سنة ١٩٤١ .

اباب الثاني

انشاء بساين التفاح

لقد تأكد من شرح تأثير البيئة الطبيعية في نمو أشجار التفاح وتكوين ثمارها ان صفات الصنف وطبيعة الاقليم والموقع ونوع الاصول البرية هي أهم العوامل في نجاح زراعة بساين التفاح. ويستدل من هذا انه يتوجب على المزارع الراغب في انشاء بستان تنجح ان يتحقق أولاً موافقة الاقليم والموقع لزراعة أصناف التفاح المراد غرسها . ثانياً ان يتحقق ان التربة المعدة للغرس حاوية لجميع الصفات الضرورية الملائمة للنمو والانتاج كوفرة الاغذية المتنوعة، والعمق الكافي، وحسن انصراف الماء . ثالثاً ملاحظة غزارة الماء في الموقع لانه يضاعف الانتاج ويزيده جودة . رابعاً ان يرسم وينفذ خطة للزرع مستوحاة من المعلومات الدقيقة المتوفرة في الباب الاول والثاني لتلافي أكبر عدد من هفوات الزرع المتعذر اصلاحها بعد مرور الزمن بدون خسارة مادية فادحة . وسنشرح تسهيلاً للعمل اكثر العقبات التي قد تحول دون النجاح في هذا الباب ما خلا ماء الري الذي نبهته في باب تعهد أشجار التفاح .

الفصل السادس

انتخاب الاقليم والموقع

الاقليم هو بيئة جغرافية واسعة الارزاء ذات صفات طبيعية متشابهة. ويرجع التباين الطبيعي بين الاقاليم الى اختلاف المناخ؛ فاذا صحَّ أن لكل صنف من أصناف التفاح مناخاً يجود فيه وان لكل اقليم مناخاً خاصاً فمن الطبيعي اذن ان يكون لكل صنف اقليم يجود فيه نموه وانتاجه أكثر من سواه. وهذا هو عين الصواب اذ قد تجتمع العوامل الملائمة لزراعة صنف ما في اقليم واحد فيصبح ذلك الاقليم أفضل موطن لذلك الصنف. ان ثمار الصنف كافيبل بلان مثلاً تُعتبر ألد تفاح في فرنسا، وثمار الصنف كوكس اورنج يبين هي ألد تفاح في انكلترا، فاذا تبادل الصنفان الاقليم عبر بحر المانش فقدت ثمارهما من جودتها الاصلية. وهذا يعني وجوب اكتشاف الصنف الملائم لكل اقليم لان الصنف هو مفتاح سر النجاح في زراعة أشجار التفاح.

تحديد صلاحية الاقليم

تعدد العوامل التي تحدد صلاحية الاقليم لزراعة أشجار التفاح، فمنها المناخ والارتفاع والقرب من الشواطئ البحرية والتربة والقرب من الاسواق التجارية والموانئ الكبيرة.

المناخ - ان أهم ما يجب عمله بالنسبة للاقليم هو درس جميع العوامل التي تكوّن المناخ مثل (أ) درجة الحرارة وخاصة القصوى والدنيا في الصيف والشتاء (ب) مقدار ضوء الشمس وكيفية توزيعه (ج) درجة الرطوبة (د) كمية الامطار وكيفية توزيعها (هـ) اوان حدوث اول صقيع في الخريف وآخر صقيع في الشتاء او الربيع (و) امكان هبوب رياح شديدة في فصلي الربيع والصيف. وبالوصول على مجموعة وافية من هذه المعلومات ومقابلتها مع الاحوال الجوية التي يمكن ان تنمو فيها أصناف التفاح المتنوعة عندئذ يمكن الحكم على صلاحية الاقليم لنمو أشجار التفاح، وفي أحيان كثيرة يمكن التثبت أيضاً من صلاحية الصنف في تلك البيئة (راجع الفصلين الاول والثالث).

الارتفاع - ان الارتفاع يخفض درجة الحرارة ويلطف المناخ وبذلك يزيد نسبياً عدد الاقاليم القابلة لزراع أشجار التفاح كلما اقتربت من خط الاستواء كما يقللها بالاقتراب من القطب الشمالي. وهكذا ثبت ان اكثر اصناف التفاح التجارية يمكنها النمو والانتاج الجيد اذا زرعت في بلاد الشرق الأدنى بارتفاع يتراوح بين ٥٠٠ - ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر في الاقاليم المحاذية للشواطئ. وبإضافة مايتي متر الى الحد الأدنى في الاقاليم الداخلية. أما في الاقاليم التي يزيد ارتفاعها على ذلك حيث تتساقط الثلوج بكثرة ويتعذر الوصول الى الاشجار عدة أشهر من فصل الشتاء، تتعرض الأشجار لخطر الكسر من ثقل الجليد والثلج المترام، كما لا يمكن رشها بالمواد الكيماوية في المواعيد المعتبرة لوقايتها من ضرر الحشرات والأمراض؛ زد على ذلك ان أكثر أزهارها قد تسقط من الصقيع المتأخر في فصل الربيع باستثناء صنف ماكتوش ونورثون اسباي. وفي الاماكن المنخفضة التي لا تتدنى فيها درجة الحرارة الى المعدل المطلوب للصنف لا تتفتح أكثر البراعم الخضرية والزهرية لعدم استيفائها كفايتها من البرد فيضعف النمو

ويقل الانتاج .

ولا يختلف تأثير الارتفاع عن تأثير درجة الحرارة في ثمار التفاح شكلاً ولوناً وطعماً ، فالوان الاصناف الحمراء غالباً ما تكون باهتة غير كاملة التكوين في المواقع المنخفضة لكثرة الغبار وارتفاع الرطوبة التي تحجز أشعة الشمس الضرورية لتكوين اللون الأحمر في ثمار التفاح كما انها قد تسلب أحياناً تلك الأشعة بمقادير تزيد عن الحاجة .

القرب من الشواطئ - ان الاقاليم القريبة من الشواطئ البحرية لا تتعرض لدرجة قصوى من الحرارة الشديدة في الصيف ودرجة كثيرة البرودة في الشتاء ، وكذلك فالرياح التي تمر عليها تكون أكثر برودة من الرياح المارة على الاقاليم الداخلية المعاكس اتجاهها للبحر ، لذلك تتفتح براعم الاشجار القريبة من البحر متأخرة وتنجو غالباً من الاصابة بالصقيع او البرد كما ان ثمارها افضل لوناً وشكلاً وطعماً . أما في الاقاليم البعيدة عن الشواطئ فكثيراً ما يكون الفرق في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء وبين النهار والليل كبيراً وهذا ما يضر بانتاج ثمار التفاح وجودتها لارتفاع الحرارة وهبوطها المفاجيء وكثافة الاشعاع المتواصل .

القرب من المدن والموانئ الكبرى - لاجل الحكم على صلاحية الاقليم لزراعة التفاح يجب ان تعتبر سهولة طرق مواسلاته وانخفاض نفقات النقل وقربه من المدن الكبرى التي تتوفر فيها البرادات ، ومن الموانئ الصالحة لتصديره . يوجد في الشرق الادنى ، وخاصة في لبنان ، اقاليم كثيرة تصلح لزراعة اشجار التفاح ، وبسبب الافتقار الى المعلومات الدقيقة عن كمية الحرارة ، والضوء ، والرطوبة ، والمطر ، ومواعيد هبوط الصقيع المختصة بكل اقليم لا يمكن تحديد زراعة التفاح فيها بالضبط ، فيترتب على كل مزارع فطن ان يدرس احوال بيئته

الطبيعية ويحكم بما لديه من معلومات على صلاحيتها لزراعة اشجار التفاح . وبالجملة تعتبر سفوح جبال لبنان الغربية المشرفة على البحر أفضل اقليم في الشرق الادنى لزراعة اشجار التفاح ، ثم تليها منطقة الزبداني في سوريا ، والقسم الجبلي من الموصل في العراق ، وجبال الاردن الغربية والشرقية الشمالية (عجلون) في المملكة الاردنية الهاشمية ، ولكل اقليم منها مناخ خاص يختلف به عن غيره ، ولذلك وجب معرفة صفات الاصناف التي تلائم بيئته (راجع الفصل الثاني والعشرين) .

الموقع

نعني بالموقع الأرض التي ينشأ عليها البستان وهذا يضا هي أحياناً بأهيتها الاقليم اذ انه جزء منه وله أكبر الأثر في وفرة الانتاج وجودته وتدني نفقات التعهد السنوية لتأثير طبيعة الموقع واتجاهه وترتبه ووفرة مياهه في نمو اشجار التفاح .

طبيعة الموقع - ان لكل موقع مناخاً خاصاً يختلف به عن مناخ الاقليم بدقائق تفاصيله التي قلماً يشعر بها سوى سكان الموقع أنفسهم . ومع ذلك فلهذه التفاصيل أثر بين في زراعة اشجار التفاح . وأفضل المواقع لهذه الزراعة ما كان مرتفعاً عن الاودية والمسالك الضيقة بين الجبال حيث يرسب الهواء البارد الرطب فيساعد على انتشار الامراض ويعرض الثمار للتشويه . فالمرتفعات المشرفة على منخفضات كبيرة تسمح بتسرب الهواء فتحمي الاشجار من الصقيع في الشتاء وتؤمن استمرار حركة النسيم البارد الجاف في الصيف ، وهذا أمر ضروري لنضج الثمار ذات الطعم اللذيذ واللون اللامع البراق . وتعتبر المواقع في قعر الاودية والمسالك الضيقة أكثر ضرراً من السهول في الارتفاع نفسه والبعدينه عن خط العرض .

وأفضل المواقع ما كان منحدارها بين ٥ - ١٠ ٪ لانها تسمح بجمري النسيم

الفصل السابع

انتخاب الاتربة

تعتبر التربة أهم عامل بعد المناخ في نجاح نمو أشجار التفاح وإثمارها ، وقد تسبب فرقا في الانتاج بين ٥٠ - ١٠٠٪ وذلك لاختلاف انواعها ، وعمقها ، ومقدار خصبها ، وتفاعلها ، وتركيبها .

تأثير الاتربة في نمو أشجار التفاح وانتاجها

تعد التربة المغروسة بأشجار التفاح بمثابة الحزان الطبيعي الذي تستمد منه الماء والعناصر الغذائية الضرورية لتكوينها ، بما يدل على ان حجم الشجرة وقوة نموها وانتاجها تتوقف الى حد كبير على (ا) اتساع مساحة التربة النامية فيها (افقياً وعمودياً) وطبيعة تركيبها (ب) وفرة الماء والغذاء في تلك المساحة وسهولة الحصول عليها (ج) مدى انتشار الجذور العاملة على جمع الماء والغذاء ونقله الى أجزاء الشجرة العليا . وبمعنى آخر فانه بازياد المسافة بين الاشجار المغروسة ، وعمق الاتربة ، وخصبها ، وسهولة انتشار الجذور فيها ، تقوى الاشجار ويكبر حجمها ويزيد انتاجها كثيراً .


وقد لوحظ ان للتربة تأثيراً كبيراً في كيفية اتجاه النمو الخضري ، اذ ان الأشجار النامية في تربة جيدة الانصراف والتهوئة تنمو أعضاؤها عمودية او ما يقارب ذلك ولا تبدو متدلية نحيلة ؛ وكذلك تكون سوقها ذات حجم كبير واوراقها طبيعية الحجم واللون ، ويكون انتاجها وفيراً وطعم ثمارها لذيذاً وحلواً وزيتها العطرية كثيرة . أما الأشجار المغروسة في الاتربة الثقيلة

اللطيف الدائم وانصراف الماء في الاتربة الثقيلة وتسهل القيام بالعمليات الزراعية في جميع المواسم .


اتجاه الموقع شمال خط الاستواء - قد يضاها هذا العامل في أهيته عامل الارتفاع عن سطح البحر في تلطيف درجة الحرارة في الصيف او في تعريض الاشجار للعوامل الطبيعية الضارة في الشتاء ، ولكل اتجاه حسنه وسببته . فالاتجاه الجنوبي اجمالاً يفضل في المواقع الكثيرة الارتفاع والاتجاه الشمالي يفضل في المواقع المنخفضة . وفي الحقيقة ان مدى تأثير الاتجاه في أشجار التفاح يتوقف على صفات الاصناف الطبيعية . فالاصناف التي تتطلب مقادير كثيرة من البرد لانها فترة استراحة براعمها يجب ان تزرع في الاتجاه الجنوبي في المرتفعات العالية جداً اذ بذلك يتأخر إزهارها فلا تتعرض لاضرار الصقيع المتأخر في الربيع . ويتضاعف ضررها اذا زرعت الاصناف التي تتطلب البرد القليل على الارتفاع نفسه والاتجاه عنه .

العوامل الاخرى - ويجب ان لا يغرب عن البال ان سهولة الوصول الى الموقع أمر لا يمكن اغفاله اذ يجب ان تكون الطرق سهلة للنقل في أيام الصيف وغير صعبة الولوج في آخر أشهر الشتاء حين يبدأ العمل بجهد في تقليم الاشجار ورشها .

الشكل رقم ٤ - تأثير نوع التربة في انتشار جذور اشجار التفاح



(١) مقطع عمودي لتربة رملية طميّة ، جيدة الانصراف ، لا يتغير تركيب ذرات طبقاتها الخمس وليس فيها طبقة ماء جوفي أو صخور . كل نقطة تمثل جذراً واحداً بالنسبة لحجمه وموقعه . لم يمت من اشجار هذا البستان بعد ستين عاماً من سني النمو سوى ١٩ بالمئة (٢) .



(٢) مقطع عمودي لتربة طينية دغاينة رديئة الانصراف لان مستوى طبقة الماء الجوفي فيها لا يزيد اكثر من ستين سنتيمتراً عن سطح الارض . لاحظ ان انتشار جذور شجرة التفاح ينحصر في الطبقات العليا الضيقة . ماتت اكثر اشجار البستان قبل ان تبلغ خمسين عاماً (٢) .
(اوزكاتب وبانجر)

والرديئة الانصراف فتتمو ببطء في الربيع كما يتأخر نموها في الخريف وينضج خشبها ببطء مما يعرضها لضرر الصقيع ويجعل طعم ثمارها أكثر حموضة لان المواد النشوية فيها تستعمل في صنع المواد الزلالية ؛ كما انها تؤخر موعد نضج الثمار بعكس التربة الرملية الخفيفة . والتربة الثقيلة تسبب ارتفاع نسبة المادة الشمعية في القشرة وتعرفل تكوّن اللون الأحمر فيها (٢) و (٦) . ويستنتج أيضاً ان الأشجار المفروسة في التربة الحصبة الملائمة لنمو الأصناف تعمر كثيراً (٦) .

وتفضل زراعة الاصناف الحمراء في تربة من متوسطة الى خفيفة ، والاصناف الصفراء في تربة أثقل في البستان نفسه .

تأثير التربة في انتشار جذور أشجار التفاح

ان مدى انتشار جذور أشجار التفاح وسرعتها في بعض انواع التربة لأمر يدهش وخاصة في سنوات النمو الأولى . فاذا زرعت أشجار التفاح في تربة منقوبة ومناخ ملائم فبإمكان جذورها ان تغتفلل مسافة أقصاها ثلاثة أمتار افقياً ومتران عمودياً في السنة الأولى ، وبعد مرور ثلاث سنوات تصل الجذور الى اتساع أقصاه ثمانية أمتار افقياً وخمسة أمتار عمودياً (٣) . وتعتبر هذه الأرقام قياسية في سرعة النمو لأن معدل تعمق جذور أشجار التفاح هو ما بين المترين والثلاثة حيث تسمح التربة بذلك . وبما يذكر ان نمو الجذور يسبق كثيراً النمو الحضري باتساعه وسرعة انتشاره ، ويعتبر هذا أكبر ضمانة لحماية الاشجار غير المسقية من الجذب في السنوات القليلة الأمطار (٣) ، وهذا يساعد على حفظ التوازن في النمو من سنة الى اخرى .


تأثير نوع التربة (Soil Type) في انتشار جذور أشجار التفاح - ان لكل نوع من التربة أثراً خاصاً في انتشار جذور أشجار التفاح ونموها وانتاجها

(الشكل رقم ٤) . فاذا أمكن التعرف الى صفات أنواع الأتربة التي تفض بعض أصناف التفاح أمكن مضاعفة انتاجها .

تختلف مقدرة الجذور على الانتشار باختلاف تركيب مقطع الأتربة ؛ فا كان مقطعها العمودي مركباً من ذرات دقيقة جداً ومتراصة تكون رديئ الانصراف الى حد تحتنق معه الجذور من قلة الهواء . ومن الأتربة ما يكون مقطعها العمودي قليل الغور لوجود صخر أو طبقة دلفانية متاسكة جداً وقرب من سطح الأرض لا تتمكن الجذور من اختراقها . وأحياناً توجد طبقة من جوفية قريبة من منطقة الجذور تحول دون انتشارها . كما ان الأتربة الرما القليلة الغور ذات الأسفل الرملي الحشن لا تصلح لنمو الجذور بدون سة لطفافها ولان الصقيع يضرها في الاماكن الشديدة البرودة في الشتاء . يعتبرنو التربة لهذه الاسباب أقوى العوامل التي تحد من قدرة الجذور على الانتشار، وله الأمر صلة مباشرة بحجم أشجار التفاح وانتاجها ومدى حياتها (٢) .



تأثير أعمال التعمد في انتشار جذور أشجار التفاح في التربة - ثبت انه يمكن التأثير في اتجاه نمو جذور أشجار التفاح الحديثة وتسييرها حسب الرغبة عن طريق تنوع التعمد في السنوات الاولى من نموها (الشكل رقم ٥) . وأهم عامل توجيه انتشار الجذور عمودياً وافقياً في التربة هو دأبها على تحصيل الماء اللا لنموها . فاذا ما غرست نباتات صيفية كالذرة بالقرب من أشجار التفاح الحديث توجهت جذورها عمودياً في التربة تفادياً من المسابقة للحصول على الماء . واستعملت مياه الري لسقاية المزروعات الحولية كالحضرة انتشرت الجذور أفقياً بالقرب من سطح الأرض . واذا لم يغرس اي نبات بالقرب من الاشجار ك شيء في التربة المزروعة أشجاراً حديثة أو قديمة .

الشكل رقم ٥ - تأثير كيفية تعمد التربة على انتشار جذور اشجار التفاح عمرها ثلاث سنوات نامية في نوع واحد من التربة (١٦) .



(١) كيفية انتشار جذور شجرة تفاح مزروع بالقرب منها خضر مسقية . لاحظ تجمع نمو اكثرهما على مقربة من سطح التراب بين ٥ - ٣٥ سنتيمتراً .

(٢) كيفية انتشار جذور شجرة تفاح زرعت الذرة الصفراء بدون ري على بعد متر ونصف المتر منها . لاحظ ان جذور الذرة ارغمت جذور شجرة التفاح على النمو عمودياً في التربة لشدة المضاربة في الحصول على الماء فلم يتجاوز نموها الاقصى ٩٠ سم ولكنها نمت عمودياً الى ٢١٠ سم .



(٣) كيفية نمو جذور شجرة تفاح لم يغرس بقربها اي نبات ولم تسقى في السنوات الثلاث الاولى . لاحظ اتساع انتشارها افقياً (١٨٠ سم) وعمودياً (٢٤٠ سم) .

(يوكم)

تأثير أنواع الاصول واصناف المطاعم في انتشار جذور التفاح - لطبيعة نمو الأصل تأثير بيتن في انتشار الجذور؛ فمن الاصول ما تمتد جذورها عمودياً في التربة مثل النوع مالس كومبونس (اذا لم يقطع رأس الجذر الرئيسي) ، ومنها ما تنتشر جذورها افقياً وهذه هي الحال في معظم الاصول المكثرة خضرياً مثل نوع فرجينيا كراب واصناف الاصول البلدية والصنف نورثون اسباي . وإذا ان للمطعم تأثيراً في قوة نمو الاصل كذلك له تأثير في مدى انتشار جذوره ؛ فالاصناف التي بطبيعتها تنمو افقياً الى مسافات واسعة تمتد جذور اصولها افقياً الى اتساع النمو الخضري نفسه أو أكثر قليلاً .

صفات التربة الجيدة لنجاح اشجار التفاح

تساعد جميع الصفات التي تجعل من التربة بيئة خصبة على نجاح نمو اشجار التفاح ، وهذه أهمها :

أ حجم ذرات التربة وتركيبها - ان لهذا الأمر علاقة مباشرة بكميات الغذاء والماء المتوفرة في التربة ، فاذا صغر حجم الذرات كثيراً تصبح التربة طينية ثقيلة ويزيد أحياناً مقدار الماء المحفوظ فيها عن الحاجة فيؤخر انتشار الجذور ويحول دون تهويتها الضرورية ، ويجعل من الصعب الحصول على الغذاء الجاهز . كما ان الاتربة الرملية الحشنة لا تحتفظ بالماء وتفترق للغذاء وتعرضه للخسارة بسهولة اثناء الري او في فصل الشتاء . وكذلك تكسب كيفية تركيب الذرات ونسبها التربة صفات تؤثر في نمو الجذور وقد تساعد او تؤخر القيام بعمليات التعهد في البستان في المواعيد المعينة . لذلك فان التربة الرملية الطميّة (Sandy loam) والظمية (Loam) الحُصبة التي لا يتغير تركيبها المقطع العمودي الى عمق متر ونصف المتر والجيدة الانصراف والتهوية تشكل أفضل بيئة لنمو اشجار التفاح وانتاجها المتزايد (٢) . وتتوكل أجزاء التربة الرملية الطميّة من ٤٠ ٪ وملاً و ٤٠ ٪

طياً و ٢٠ ٪ طيناً ، واذا قل فيها مقدار الرمل قليلاً وزاد الطمي تصبح طميّة .
ب المواد الغروية المعدنية والعضوية - ان المواد الغروية تكسو ذرات التربة وتكسبها صفة سالبة وموجبة تستطيع بواسطتها اجتذاب العناصر الغذائية والماء . وهي اذاً السبب الأكبر في خصب التربة ، فينبغ تفتقر ذرات الرمل الى تلك المواد يشاهد ان ذرات التربة الطينية غنية بها .

ج عمق التربة - يؤثر عمق التربة في مقادير الماء والغذاء المتوفرة وفي اتساع الجذور وطبيعة انتشارها وسهولة انصراف الماء الجذبي الزائد . وهذا يعني اذا الموقع الذي تكون تربته السفلى صخرية او دلعانية قليلة الغور او يكون مستوى الماء الجوفي فيه قريباً من سطح الأرض هو غير صالح لنمو اشجار التفاح .

د درجة تفاعل التربة (pH value) - ان درجة التفاعل الكيماوي (وفرة الحموضة أو قلتها في التربة) ذات أهمية كبيرة في التربة النامية فيها اشجار التفاح ، وذلك لسببين : الاول ان جذور اشجار التفاح تفضل النمو في تربة حامضاً بعض الشيء تتراوح درجة تفاعلها بين ٦ و ٧ درجات بمقياس (pH) اي انها غير قاعدية (٧) . فالأتربة الكثيرة الحموضة (درجة ٤ pH) او القاعدية (درجة ٨ ، ٩ pH) لا تكون بيئة جيدة لنمو جذور اشجار التفاح . كما يجب ان يذكر ان الاتربة التي تزيد فيها مقادير كربونات الكلس على ٢٥ ٪ لا تصلح الا لنمو بعض الاصول المعروفة بتحملها التربة القاعدية ومنها الاصول البلدية . هذا مع العلم ان اشجار التفاح تتحمل وجود الكلس أكثر من اشجار الكمثرى (٤) والسبب الثاني ان درجة التفاعل في التربة تحدد مقادير العناصر الغذائية الجاهزة لتغذية الاشجار . فالترربة القاعدية (basic) وخاصة التي يكثر فيها الكلس تحول العناصر الغذائية الجاهزة في محلول التربة كالفوسفور والبوتاس وغيرهم الى حالة مركبة غير قابلة للامتصاص بواسطة الجذور؛ وعلى نقيض ذلك فالترربة

الحامضة تحلل الأغذية الى عناصر قابلة للامتصاص . ومن هذا يتبين ان سهولة حصول الجذور على العناصر الغذائية الضرورية للنمو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدرجة تفاعل التربة .

أصناف التفاح وانواع الاتربة

بإمكان أشجار التفاح النمو في أترية متنوعة واعطاء إنتاج وافر أحياناً، غير ان بعض الاصناف تعطي إنتاجاً أوفر وثمراً أجود من حيث الطعم والشكل واللون اذا ما زرعت في نوع معروف من الأترية . واليك بعض الأمثلة :

الصنف كرافنشتين - يفضل التربة العميقة الرملية الطيبة ذات الذرات الرملية الناعمة جداً القليلة الرطوبة الحسبة .

الصنف يلو نيوتن - يفضل التربة العميقة الطيبة الثقيلة او الطينية الخفيفة الجيدة الانصراف .

الصنف رد ديليشس - يفضل التربة الرملية الطيبة او أخف منها قليلاً، ولا ينمو جيداً في التربة الطينية الثقيلة .

الصنف اسبتزنبرك - يصعب إيجاد التربة الملائمة لنموه انما ينجح في الاتربة المتوسطة الجافة الحسبة .

أما بصدد الاصناف الاخرى الموصوفة في الباب الخامس فلم يعط الدرس بعد في شأنها نتيجة وافية مع العلم ان كثيراً منها لم تظهر تفضيلاً بين نوع من التربة وآخر . والملاحظ ان اكثر أصناف التفاح تفضل الأترية العميقة الجيدة الانصراف المتوسطة الحصب والرطوبة ، وان الاصناف الحمراء تفضل التربة الرملية او الرملية الطيبة التي تساعد على تكوين اللون الاحمر البراق بينما تجود الاصناف الصفراء في تربة أثقل قليلاً .

الفصل الثامن

رسم خطة الزرع

لا يمكن المزارع الفطن تجاهل مدى تأثير المناخ والاقليم والموقع والتربة وطبيعة نمو الاصناف في إنتاج ثمار التفاح المتنوعة ، بل قد يشعر بوجود رسم خطة للزرع تحتوي على جميع التفاصيل الهامة وتطبيقها اثناء انشاء البستان ليضمن له النجاح التام . وأهم هذه الامور هي انتخاب الاصناف ، تهيئة التربة للزرع تحديد مسافات الزرع ، تنسيق الاشجار ، وضع خطة التلقيح والاختصاص الري، الرش بالمواد الكيماوية، الزراعة المشتركة، مصدر المطاعيم، وكيفية الزرع

انتخاب الاصناف

يُعتبر الصنف مفتاح النجاح في جميع الاعمال الزراعية وعليه يتوقف الى حد بعيد مقدار الانتاج وجودته . ان أصناف التفاح، لحسن الحظ ، كثيرة وتختلف طبائع نموها وانتاجها بنسبة عددها تقريباً ؛ وهذا يجعل عملية الانتخاب أمر يسيراً شرط ان تتوفر لدى المزارع صفات الصنف والبيئة المزمع غرسه فيها وأهم ما يجب ان يتحققه المزارع عند انتخاب الاصناف هي الامور التالية :

طبيعة نمو الصنف وانتاجه - يتوجب على المزارع ان يتعرف الى صفات الصنف بكاملها حتى يحكم على صلاحيته للزراعة وللأسواق التجارية . ولهذا ادر:

وصف تسعة عشر صنفاً من الاصناف التجارية العالمية في الباب الخامس ليراجعها المزارع حين الحاجة وينتخب منها ما يلائم بيئته .

المناخ - لقد ذكر ما فيه الكفاية عن أهمية المناخ بالنسبة لاصناف التفاح، وجملة القول ان لكل صنف اقليماً أو مناخاً يفضل النمو فيه . وبما ان للمناخ تأثيراً عظيماً في كيفية تكوين البراعم الزهرية وفترة استراحتها وميعاد إزهارها ونجاح إخصابها وإثمارها وجودة ثمارها ومدى تبريدها وجب التعرف الى صفات المناخ بدقة متناهية في كل اقليم ليصير في الامكان انتخاب الاصناف التي توافق النمو فيه (راجع الفصل الثالث) .

الأتربة - لقد بحث أهمية نوع التربة وكيفية تركيبها وتفاعلها ومقادير الكلس فيها وعمقها وانصراف الماء الزائد منها ، ومدى انتشار الجذور فيها بالنسبة لنمو الاصناف المتنوعة وانتاجها .

الاصول - بما لا شك فيه ان انتخاب الاصل الملائم للصف والتربة والمناخ يضمن نجاح الاشجار لان قوة نمو الاصناف وحجمها وتكيفها للنمو في الاقاليم المتنوعة تتأثر كثيراً بنوع الاصل الذي يطعم الصف منه (راجع الباب السادس الخاص ببحث أنواع اصول التفاح وملاءمتها للاصناف والبيئة) .

رغبات المستهلكين وميول الاسواق التجارية - للاسواق التجارية أثر كبير في تحديد الاصناف الواجب زرعها ، فكثيراً ما تملئ ارادتها على المزارع حينما يوجد . فالمستهلكون في افطارهم يبدون فعلاً تفضيلهم لهذا الصنف أو ذاك على سواه وعندئذ ينشأ الطلب لأصناف معينة تصح فيما بعد مقياس الجودة في الاسواق التجارية . ولاتجاه او ميول الاسواق طابع خاص ، فالغريب في الامر ان أسواقاً كثيرة تفضل صنفاً على آخر ؛ فالصنف استاركن - مثلاً - غير

مرغوب في أسواق لندن لعدم ملاءمته لذوق الانكليز ؛ ومدينة نيويورك تعتبر الصنف ماكتوش أفخر تفاح ويدفع سكانها أسعاراً مرتفعة للحصول عليه ؛ وتفضل أسواق الصين الاصناف الصفراء اللون وخاصة الصنفين يلونيوتن وونتر بيرمين ؛ وفي الشرق الأدنى اختل الصنفان كولدن ديليشس واستاركن ديليشس المركز الاول في الاسواق التجارية . أما في الاسواق الاوروبية فالاصناف الاميركية بحسب رغبة المستهلكين فيها هي واينساب وروم بيوتي واستاركن واسبتزبرك (١١) . ليس المزارع مقيداً اذاً بانتخاب الاصناف المعروفة بوفرة انتاجها وجودة نوعها فحسب بل بأسعارها في الاسواق المحلية والعالمية . ويعتبر الصنف ماكتوش دون منازع أتمها وتليه بالترتيب بحسب نسبة أسعارها المتناقصة الاصناف : يلونيوتن وكولدن ديليشس ونورثون اسباي وكرافنشتين واسبتزبرك واستاركن وجوناثان وروم بيوتي واينساب وهو أقلها ثمناً .

تهيئة التربة للزراع

تهيئة أرض البستان بالطرق الصحيحة أثر كبير في نجاح نمو الاشجار وانتاج وتيسير الاعمال الزراعية اليومية بعد غرسها . وسنطرق هذا البحث مطولاً فيما بعد ، في الفصل التاسع .

تحديد الابعاد بين الاشجار

تتسع أو تضيق الابعاد بين الاشجار بالنسبة لحجمها ، ويختلف الحجم تبعاً للأصل المطعم عليه الصنف ولطبيعة نمو الأصناف . فالأصناف المطعمة على اصول مكبرة يجب زرعها على ابعاد واسعة وقد تختلف هذه بعض الشيء بالنسبة لطبيعة نمو الصنف ؛ فالأصناف ماكتوش واستين واينساب وكرافنشتين مثلاً تنتشر أغصانها اقليماً أكثر من غيرها ولذلك يجب ان تُغرس على ابعاد أكبر من الصنفين

رد جيون وروم بيوتي اللذين ينمون في الغالب عمودياً. والصنف جوناثان ضعيف النمو لا ضرورة لزراعة بابعاد واسعة. وقد يختلف حجم الاشجار أيضاً تبعاً لشدة التقليم وكيفية التربية؛ فالتقليم الجائر يقصر الأشجار، كما ان تربيتها على طريقة شبه الملك تجعل أحجامها أكبر منها على طريقة الشكل القدحي.

وكذلك تختلف ابعاد الزرع بالنسبة لمقادير المياه المتوفرة في التربة. فاذا زرعت الاشجار في مناطق ذات امطار قليلة يجب ان تتسع الابعاد بينها بالنسبة لنوع الاصل المطعمة عليه. كما ان نوع التربة وعمقها وخصبها تحدد اتساع الابعاد بين الاشجار؛ ففي التربة الطمية الرملية العميقة تزرع الاشجار على ابعاد أكثر منها في التربة الخفيفة لان أحجام أشجارها اكبر (٩)، وكذلك يؤثر اتساع التربة في حجم الاشجار ونتاجها، فكلما ضاقت المساحة المخصصة لنموها صغر حجمها وقل انتاجها نسبياً. ويتحكم الانحدار بالابعاد بين الاشجار بالنسبة لمقداره. اذ تقل المسافات بين الاسراب كلما ارتفع انحدار الموقع. ولل مناخ أثر فعال في تحديد الابعاد اذ تنمو فيه أشجار التفاح بأحجام مختلفة تبعاً لأنواعه، فتزرع في الأقاليم الباردة جداً الاصناف المطعمة على اصول مكبرة جداً وهذا يعني توسيع الابعاد؛ كما تزرع الاصناف المطعمة على اصول نصف مقصرة في الاماكن الدافئة على ابعاد قليلة. وأخيراً عند تعيين أبعاد الزرع يجب ان تعتبر العمليات الزراعية التي ستجري في البستان من حرث ورش وتقليم وتخفيف الثمار وقطفها، وجميعها عمليات تتطلب مسالك فسيحة يسير فيها العمال دون ايقاع الضرر بالثمار أو بالاشجار. وفي جميع هذه الاحوال أفضل قاعدة يمكن اتباعها هي التثبيت من عدم تشابك اغصان الاشجار بعضها ببعض لان ذلك يجلب أشعة الشمس عن البراعم فينقص الانتاج كثيراً*.

ويمكن القول ان الاسراف والتقتير في تحديد الابعاد أمران غير مرغوب

فيهما؛ والجدول الثاني يعطي فكرة تقريبية عن الابعاد الممكن استعمالها في زراعة أشجار التفاح في الشرق الأدنى.

الجدول الثاني - الابعاد الممكن استعمالها في زراعة أشجار التفاح في الشرق الأدنى

اشجار غير مسقية		اشجار مسقية		نوع الاصل	المناخ الصيفي
الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى		
٦ × ٥	٥ × ٤	٨ × ٨	٦ × ٦	مكبر	بارد جداً - بارد
٥ × ٥	٤ × ٤	٦ × ٦	٥ × ٥	متوسط	بارد - متوسط
٤ × ٤	٤ × ٣	٥ × ٥	٤ × ٤	نصف مقصر	متوسط - دافئ

تنسيق الاشجار في البستان

هناك طرق متعددة لتنسيق أشجار التفاح في البستان أهمها طريقة المربعات التي تُغرس بواسطتها الأشجار في مربعات متساوية الاضلاع، وهي أكثر ما تستعمل في المواقع السهلة المستوية القليلة الانحدار. والطريقة الثانية هي غرس الاشجار في مثلثات متساوية الاضلاع وبذلك يستوعب الموقع ١٥٪ من الاشجار اكثر، وهي تفضل على طريقة المربعات في الاماكن الجبلية حيث يزيد انحدار الارض على ٣٪ لانها تسمح بدخول أشعة الشمس الى اكثر أجزاء الشجرة مدة أطول ولا تعيق أعمال التعهد في البستان (راجع كيفية تعيين مواقع الاشجار في الفصل التالي).

خطة التلقيح والاختصاب

سبق تعريف أهمية عملية التلقيح والاختصاب بالنسبة لانتاج ثمار أصناف التفاح المتنوعة وكيفية تلافي الحسارة الناجمة عن ضعف الاختصاب الذاتي في

أشجار التفاح (راجع الفصل الرابع عن كيفية تنسيق الاصناف والعوامل الواجب اعتبارها عند وضع هذه الخطة تحقيقاً لزيادة انتاج الاشجار) .

خطة الري والوقاية

سنبعث هاتين الخطين بالتفصيل في الفصول اللاحقة لما لهما من الاهمية البالغة في انتاج الاشجار والعمل في البستان .

الزراعة المشتركة

تعتبر عادة الزرع بين الاشجار ضارة وخاصة اذا كانت الابعاد بينها قريبة . وقد ثبت ان سقي الحضر المزروعة بين الاشجار يسبب تجمع جذورها بالقرب من سطح الارض في منطقة ضيقة مقادير الغذاء فيها محدودة وتهويتها رديئة مما يضعف نموها . ولذلك يُعتبر ما يجنيه المزارع من زراعة الحضر بين الاشجار بالفعل خسارة في نموها وانتاجها (الشكل رقم ٥) . وكذلك لا ننصح بزراعة الاشجار الاخرى لانه يصعب معنوياً ومادياً ازلتها اختيارياً بعد نموها سنوات عديدة في البستان ، كما ان بقاءها يسبب الاضرار الجسيمة .

مصدر المطاعم

يترتب على كل مزارع يرغب في انشاء بستان تفاح تأمين العدد اللازم من كل صنف من الاصناف المطلوبة قبل ميعاد الزرع بأشهر كثيرة . وعليه ان يتحقق من الاصناف وسلامتها وكونها مطعمة على الاصول المرغوبة ، وأن يرتفع موقع الطعم ١٥ سم عن سطح ارض المشتل على أقل تقدير ، وان تكون الجذور وافرة وقوية ومنتشرة وسليمة . ويفضل ان لا يزيد عمر المطاعم على سنة ونصف السنة لانها تكون سهلة النقل قوية النمو ويسهل تكوين شكلها في البستان حسب

رغبة المزارع . اما المطاعم البالغة سنّاً فيصعب نقلها بدون تكسير اغصانها الاساسية وغالباً ما يكون نموها ضعيفاً في البستان .

اما عند تصنيف الاشجار لشراؤها فيجب اعتبار ارتفاعها (طولها) عن سطح الارض وقطر ساقها الذي يقاس فوق موقع الطعم بخمسة سنتيمترات . هذا وقد ثبت ان المزارع الذي يشتري مطاعم قوية كبيرة الحجم لا يزيد عمرها على سنة ونصف السنة وجذورها قوية وسليمة هو على يقين من ان نموها في البستان سيكون قوياً جداً (٨) .

الجدول الثالث - مقاييس الانتخاب الثلاثة للمطاعم الجاهزة للغرس

(عن معدل كاليفورنيا بتصرف)

النخب	ارتفاع المطعم سم	قطر الساق (ملليمتر)
الاول	١٧٥ - ٢٥٠	١٨ - ٢٢ او اكثر
الثاني	١٢٥ - ١٧٥	١٤ - ١٨
الثالث	٩٠ - ١٢٥	١٠ - ١٤
الرابع	٦٠ - ٩٠	٦ - ١٠

وعلى هذا تختلف اسعار الاشجار طبقاً لاختلاف مقاييسها الا انه لا ينصح بشراء الاشجار الصغيرة الحجم ذات الساق الدقيقة او التي يظهر تجانسها مع الاصل غير طبيعي .

الفصل التاسع

تهيئة موقع البستان وغرس الاشجار

تعتبر التربة البكر أفضل بيئة لزراعة أشجار التفاح انما يمكن اعداد أية تربة مستعملة لهذا الغرض . وأية كانت التربة فانه يجب اعدادها من جديد لتناسب خطة الزرع المرسومة . وهذا العمل الانشائي بمثابة الحجر الاساسي في بناء البستان وعلى اتقانه يتوقف الى حد بعيد نجاح نمو الاشجار وتدني نفقات تعهدها لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً .

تهيئة المواقع السهلية

ان المواقع التي يقل انحدارها عن اثنين في المئة لا تتطلب بناء الجدران ، ويمكن الاكتفاء بعمليات الحرث العميق او تجهيز الحفر الكبيرة للزرع بعد تعيين مواقع الاشجار ، ومواقع مصدات الرياح في الاماكن المعرضة لها ، ورفع الاسيجة الواقية من الحيوانات .


الحرث العميق - يابجأ المزارع الى عملية الحرث العميق بواسطة الآلات النقبية في المواقع المستوية السهلية التي تنعدم فيها الصخور والحجارة على ان لا يقل عمق الحرث عن متر واحد . كما يمكن استعمال الآلات الحديثة الخاصة بقلع الصخور في المواقع السهلية حيث توجد الصخور السطحية . ولا تزيد نفقات

الحرث العميق بالآلات الحديثة الخاصة على عشر نفقات نقب الارض باليد العاملة . والهام هو ازالة الصخور وجذور الاشجار والنباتات الضارة والتعمق في التربة .

الحفر العميقة - يلجأ البعض الى تجهيز حفر زرع عميقة بدلاً من نقب الارض . وهذه الطريقة تندني نفقات النقب باليد، وتصلح هذه الطريقة في الاتربة الثقيلة المستعملة زراعياً ولا ينصح باستعمالها في الارض البكر . تباشر تهيئة هذه الحفر بعد تعيين مواقع الاشجار في الصيف ؛ فيرسم مربع على الارض في موقع الشجرة طول ضلعه متران ويباشر رفع التراب من نصف المتر في الطبقة العليا من المربع ووضعه بالقرب من الحفرة في اتجاه معاكس لحطوط الزرع ، ثم يرفع تراب نصف المتر الثاني من الطبقة السفلى ويوضع في الاتجاه المقابل لتراب الطبقة العليا . وبعد هطول الامطار الاولى بايام قليلة يعاد تراب الطبقة العليا الى اسفل الحفرة ويوضع تراب الطبقة الثانية فوقه حتى تمتلئ الحفرة فقط وتترك الى حين الزرع . لا تؤخر طمر الحفر الى ميعاد غرس الاشجار لان ذلك يعرض موقع التحام الطعم بالاصل الى التغطية بالتراب بما يلحق الضرر بنمو الاشجار .

تعيين مواقع الاشجار - جهز الصندوق الخارجي للزرع بانتخاب احد حدود البستان كخط اساسي ودق وتبدأ في احد طرفيه واربط فيه حبلاً دقيقاً طوله ستة وثلاثون متراً او اكثر قليلاً (الشكل رقم ٦) . قس اثنا عشر متراً من هذا الورد على طول الحد الاساسي ودق وتبدأ ثانياً واربط الحبل فيه . حينئذ ضع علامة على الحبل في نهاية المتر السابع والعشرين واربط نهاية المتر السادس والثلاثين بالورد الأول وشد الحبل جيداً في نهاية المتر السابع والعشرين ودق وتبدأ ثالثاً في الارض . بهذا تصبح الزاوية المشكّلة عند الورد الاول قائمة . وكذلك شكّل زوايا قائمة في الاطراف الاخرى وأنتم صنع الصندوق الخارجي . ولايجاد مواقع الاشجار داخل الصندوق دق او تاداً على الابعاد المحددة على

اضلاع الصندوق واربط الجبل في وتدين متقابلين في اسفل الصندوق وعين مواقع الاشجار عليه بالابعاد المحددة في اتجاه واحد بنثبيت وتد في موقع كل



(ملوف)

الشكل رقم ٦ - كيفية تعيين مواقع الاشجار في البستان .


شجرة . وتسهل للغرس في الشتاء استعمال لوحة الزرع لانعام تعيين موقع الشجرة بدقة .

تصنع لوحة الزرع من خشبة طولها متران وعرضها اربعة سنتيمترات وسعها سنتيمتران اثنان . أحفر بها فجوتين جانبيتين عند أقصى طرفيها ٢٥ × ٢٥ مليمتراً واثقب فجوة في وسطها تماماً بحجم المطعوم الكبير . ضع وسط هذه اللوحة على الوند الذي يعين موقع الشجرة وعدّل اللوحة حتى تصبح موازية للجبل ودق وتدين طول كل منهما نصف متر في كل طرف . بهذه الطريقة يمكنك غرس الاشجار بالسرعة المرغوبة وبأسراب مستقيمة بدون عناء .

تهيئة مصدات الرياح والاسيجة - تستعمل المصدات في المواقع التي تشتد

فيها الرياح في الربيع والصيف للتخفيف من تأثيرها السيء على الازهار والثمار وخاصة في السهول المفتوحة حيث لا غنى عنها . وأفضل الاشجار للمصدات هي السرو العمودي او الهرمي (الشربين) الذي يغرس في صفين متقاربين (٨٠ سم)

وعلى بعد نصف متر بين الشجرة والاخرى (الشكل رقم ٧) . تغرس هذه الاشجار على مسافة لا تقل عن خمسة أمتار من أقرب سرب من أشجار التفاح .



أما في الاماكن القليلة الرياح فقد تفوق سيئات المصدات حسناتها لانها تسابق الاشجار المثمرة على الغذاء والماء وتشجع سكون الهواء البارد في الشتاء مما يضر بالاشجار الراقدة ؛ كما انها تحجب أشعة الشمس عن الاشجار المحاذية لها وقد تصبح ملجأ للحشرات ومبابة للأمراض .

أفضل الأسيجة ما كان من

(ملوف)
الشكل رقم ٧ - مشهد جميل لمصد رياح كثيف كوثه اشجار السرو الهرمي (شربين) الغروسة في سربين يفصل بينهما سمر واسع .

الاسلاك الشائكة المركزة على قوائم حديدية مثبتة في الارض بالاسمنت على ابعاد لا تزيد على اربعة أمتار . ويفضل ألا يقل ارتفاع السياج عن المتر ونصف المتر وان لا تزيد المسافة بين الاسلاك المتوازية على خمسة وعشرين سنتيمتراً ؛ ويباشر تركيبها بعد حرث الارض او نحتها وبناء الجدران .

تهيئة المواقع الجبلية

يفضل في المواقع الجبلية التي يزيد انحدارها على ٢٪ نقب الارض او قلب أسفل التراب الى أعلاه وبناء الجدران باتجاه خطوط الارتفاع الطبيعية للمحافظة على التراب من الانجراف .



(مملوف)

الشكل رقم ٨ - مشهد لبناني رائع لواقع جبلي تكسوه الثلوج (الشوير) اعده صاحبه لغرس أشجار التفاح . لاحظ استدارة المصاطب (الجلول) مع طبيعة الارض وعرضها المتساوي، وجدرانها المثبتة المتناسقة البناء نتيجة لوضع تصميم هندسي . قابل أسفل الصورة بأعلاها حيث لم تصل يد البستاني البارح .

نقب التربة (انقلابها) - يجب ان يجري النقب الى عمق لا يقل عن المتر الواحد لتنظيف الارض من الصخور والحجارة وجذور النباتات الضارة والأشجار، وحينئذ تفصل المصاطب (Teraces) بموجب تصميم هندسي وضع بعد مسح الارض لان المزارع مقيد في تكوين المصاطب (السهلات او الجلول) وبناء الجدران بعوامل طبيعية أهمها الانحدار، وطبيعة الطبقة السفلى، وحجم الأشجار .

آ - الانحدار - يعتبر الانحدار أكبر عامل في تحديد عرض المصاطب وارتفاع جدرانها (الشكل رقم ٨) . فاذا رغب زراعة الأشجار على الاصول الكبيرة ينصح ان يكون عرض المصطبة عشرة أمتار اذا كان الانحدار أقل من ٥٪ وتسعة أمتار اذا كان بين ٥ - ١٠٪ وتتسع هذه المصاطب لصفين من الأشجار، وميزتها انها تسهل أعمال التعهد وتخفف نفقات بناء الجدران. أما اذا بلغ الانحدار بين ١٠ - ١٥٪ فيجب بناء المصطبة الاولى بعرض تسعة أمتار والتي تليها بعرض أربعة أمتار ونصف المتر . وجميع المواقع المنحدرة بين ١٥ - ٢٥٪ يجب ألا يقل عرض مصاطبها عن أربعة أمتار. أما في حال استعمال الاصول المتوسطة بدون ري فيمكن انقاص نصف متر من عرض المصطبة التي لا يزيد انحدارها على ١٠٪ .


ب - الطبقة السفلى في التربة - تعتبر غير ملائمة لزراعة أشجار التفاح التربة التي لا يزيد عمقها عن متر واحد . فاذا وجدت الصخور على هذا العمق يجب تفجيرها وازالتها اذا امكن . واذا كانت الطبقة السفلى من الدلغان (Kaoline) او الصلصال فلا ينصح برفعها الى سطح الارض بل تنقب ويضاف اليها مقادير وافرة من الكلس وتترك في موضعها .

ج - حجم الأشجار - لما كان حجم الأشجار يختلف باختلاف الاصناف والاصول والمناخ وكيفية التعهدات من الواجب ان تقدر هذه الامور حق قدرها في تحديد عرض المصطبة على ان لا تقل مقاييسها عما ذكر اعلاه .

تعيين مواقع الأشجار - تعين مواقع الأشجار باستعمال خشبة الزرع كما سبق وصفه انما يلفت نظر المزارع الى امرين: اولاً ضرورة تعيين موقع السرب الاول من الأشجار على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حافة المصطبة لان

بهذه الطريقة تتمكن جذور الأشجار من الانتشار في دائرة طبيعية واسعة ، كما انه يمكن تلافي خسارة الأشجار اذا ما سقط الجدار . ثانياً الافضل ان تزرع الأشجار بطريقة المثلثات .

بناء الجدران
(السلاسل) - تبنى جدران المصاطب بموجب قواعد علمية من الضروري اتباعها لتلافي الخسارة الناجمة عن البناء المغلوط ، واليك بعضها : اولاً يجب ان يحفر اساس الجدار حتى الصخر او بلوغ اية قاعدة متينة من الدلائن المتراص . ثانياً يجب الا يقل عرض اسفل الجدار



(مملوف)

الشكل رقم ٩ - بيان بالطريقة الصحيحة لبناء جدار المصطبة :
اساس عميق وعرض يساوي ٤٠٪ من الارتفاع ، جدار ذو سطحين - الخارجي ويميل ٢٥٪ الى الداخل والداخلي مستوي .


عن ثلث ارتفاعه . ثالثاً يبنى الجدار من الحجارة الكبيرة في الاساس والصغيرة في الاعلى ، ويكون البناء بدورين ، الدور الداخلي يصعد عمودياً مستقيماً ، اما الدور الخارجي فيجب ان يصعد بانحراف من اسفله الى اعلاه بمقدار لا يقل عن ١٥٪ الى الداخل (الشكل رقم ٩) . رابعاً يفضل الا يزيد ارتفاع الجدار على المترين . خامساً يجب صنع ادراج حجرية في الجدار اذا زاد طوله على خمسين متراً لتسهيل التنقل بين المصاطب .

غرس اشجار التفاح

ان غرس الأشجار هو آخر عمل انشائي يقوم به المزارع في البستان ، فعليه ان يتفقد استعداداته كأن يفحص المطاعيم المعدة للغرس ليتحقق اعدادها واصنافها والاصول المطعمة عليها واحجامها وخلوها من الامراض والحشرات الضارة او بيوضها ووفرة جذورها وسلامتها ، وان جميع المطاعيم في حالة رقاد كما يتبين ذلك من سقوط الاوراق الطبيعي . ويترب عليه تفقد المواقع المعينة لغرس الأشجار وتهيئة الحفر الصغيرة بين اوتاد الزرع المنسقة سابقاً استعداداً للغرس . ومن الضروري التنويه بان اضافة الاسمدة العضوية في هذه الحفر عمل غير مستحسن لان الجذور وقتئذ لا تستفيد منها كما انها تسبب جفافها بدخول الهواء الى التربة .

موعد غرس المطاعيم - ان المزارع هو الشخص الوحيد الذي يستطيع تحديد موعد غرس الأشجار في بستانه دون خطا لان مواعيد الغرس تتأثر بالموقع والمناخ وتقلبات الاحوال الجوية المحلية من موسم الى آخر وبالاصناف المراد غرسها . الا انه يفضل غرس الأشجار مبكراً بقدر الامكان . فاذا غرست وهي راقدة في اوائل كانون الثاني تتمكن من تثبيت جذورها وتستعد للنمو المبكر فتكسب وقتاً ثميناً للنمو الحضري الذي يجب ان يتم نضجه قبل سقوط الصقيع في اواخر فصل الخريف .

عمق الغرس - ان الغرس العميق من الاغلاط الشائعة في الشرق الادنى وقد كلفت المزارع خسائر كبيرة بتأخر نمو أشجاره أو موتها . ويتضح من ابحاث انتشار الجذور ان اشجار التفاح ترسل جذورها في الاتجاه والى العمق المرغوب حسب ما تسمح بذلك طبيعة التربة والاصول . فاذا غرست الشجرة



(مخاض)

الشكل رقم ١٠ - كيفية غرس أشجار التفاح : شجرة تفاح غرست في حفرة أعدت قبل الغرس بزمن طويل؛ لاحظ ان الجذور تُوزعت بتساوي على الهرم الترابي وان موقع التحام الطعم (البرعم) بالاصل هو فوق سطح التراب المجاور للحفرة بمقدار ٥ - ١٠ سنتيمترات .

تحت التراب وبذلك تتلافى الضرر المحتم . انتبه ان يكون موقع اتصال المطعوم بالاصل باتجاه مجرى الرياح الطبيعي .

وغطها بقليل من التربة الناعمة ورسها جيداً ثم املا الحفرة بالتراب ورسه بقدميك. واذا كان التراب جافاً وجب سقاية الشجرة حالاً . فلتم الشجرة الى الارتفاع المرغوب حسب الشكل المراد اتباعه في تربيتها (راجع تربية أشجار التفاح وتقليبها في الفصل الرابع عشر) .

احذر ان تغرس الاشجار في الحفر الكبيرة قبل هطول الامطار على التراب حتى يستقر في مستواه الطبيعي في الحفرة فتضمن عدم طمر مركز التحام الطعم بالاصل

عميقة او سطحية تعود فتكيف نمو جذورها حسب مقتضيات الظروف . والقاعدة المتبعة في غرس هذه الاشجار هي ان تغرس بالعمق الذي وجدت فيه في المشتل (٩) او أكثر قليلاً على ان يبقى موقع التحام الطعم بالاصل ظاهراً فوق الارض (الشكل رقم ١٠) لانه اذا دفن جزء من المطعوم عميقاً في التراب لا يتأخر نموه فحسب بل قد تنمو منه جذور يتغذى منها وبذلك يزول تأثير الاصل . وما الفائدة من تطعيم الاشجار على اصول معروفة اذا فقد تأثيرها؟ وعليه يجدر بالمزارع ان يلاحظ دوماً ان مركز التحام الطعم بالاصل في المطاعيم المشتراة لا يقل ارتفاعه عن خمسة عشر سنتيمتراً عن سطح أرض المشتل .

ويختلف عمق الغرس بالنسبة لنوع التربة وتركيبها . فتغرس الاشجار في الأتربة الرملية على عمق ثلاثين سنتيمتراً وفي الأتربة الثقيلة على عمق عشرين سنتيمتراً على ان لا يتجاوز الغرس هذا العمق بأكثر من خمسة سنتيمترات في كل من الحالتين .

عملية الغرس - تفقد المطاعيم للتحقق من متانة التحام الطعم بالاصل والجذور للتأكد من سلامتها ولا تُزل عنها سوى ما كان ملتويًا او ممزقًا، واغسلها بمحلول مطهر لانتلاف بيوض الحشرات وتلاني الامراض؛ واحرص ألا تتعرض الجذور لأشعة الشمس او الهواء الجاف فترة أكثر من اللزوم لان قشرتها تجف فيتأخر او ينعدم نمو الجذور الشعرية عليها .

اجمع قليلاً من التراب الناعم المبتل على شكل هرمي في وسط الحفرة الصغيرة المعدة سابقاً (الشكل رقم ١٠) وضع لوحة الغرس في مركزها بين الاوتاد وضع ساق المطعوم في الفجوة الوسطى من اللوحة متحققاً ان موقع التحام الطعم بالاصل هو فوق اللوحة قليلاً . وبينما تمسك الشجرة بيدك اليسرى في هذا الوضع وزع جذورها بيدك اليمنى باتجاه نموها الطبيعي فوق كومة التراب

مراجع الباب الثاني

- ١ . ا. س. اوختر و ه. ب. تاب - زراعة اشجار البساتين والاشجار الصغيرة - كتاب - ١٩٣٧ .
- ٢ جوزف اوزكامب و ل. ب. بانجر - حجم واثاج وكيفية انتشار جذور اشجار التفاح في انواع الاتربة المختلفة - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كورنيل - رقم ٥٥٠ كانون الاول سنة ١٩٣٢ .
- ٣ و. و. يوكم - تطور نمو جذور اشجار الصنف ديليشس الحديثة النخ . المجلة العلمية لمحطة التجارب الزراعية - جامعة نبراسكا رقم ٩٥ سنة ١٩٣٧ .
- ٤ ليونرد ه. داي - اصول التفاح والفرجل والكهثري في كاليفورنيا - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كاليفورنيا رقم ٧٠٠ ايار سنة ١٩٤٧ .
- ٥ . ي. بيرك و ه. ي. موريس - دراسة نمو اشجار التفاح النخ . مجلة محطة التجارب الزراعية جامعة مونتانا رقم ٢٤١ - ١٩٣١ .
- ٦ و. ه. تشاندلر - بساتين الاشجار المتساقطة الاوراق - كتاب - ١٩٤٧ .
- ٧ ج. ل. شلتر و ه. و. ريتشي - زراعة الاشجار المثمرة - كتاب - ١٩٤٠ .
- ٨ ف. و. جاردنز و ف. س. برادفورد و ه. و. هووكر - مبادئ انتاج الثمار - كتاب سنة ١٩٣٩ .
- ٩ ف. و. الن - زراعة التفاح في كاليفورنيا . مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كاليفورنيا رقم ٤٢٥ ايار ١٩٤٧ ، والنشرة رقم ١٧٨ ايلول ١٩٥١ .
- ١٠ ج. ه. كورلي و ف. س. هوليت - الطرق الحديثة لانتاج الثمار - كتاب - ١٩٤١ .
- ١١ ي. ل. اوفر هولسر - دراسة تصدير الثمار الطازجة والحضار الى الشرق الاقصى . مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة كاليفورنيا - رقم ٤٩٧ تموز سنة ١٩٣٠ .

اباب الثالث

تعهد اشجار التفاح

لا يكفي ان ينشأ البستان على اسس علمية سليمة بل يجب ان يتلو ذلك رسم سياسة رشيدة تهدف الى حسن تعهد اشجاره بطرق قوية ، فبالاساءة الى هذا التعهد تصبح الاشجار عديمة الفائدة، وبالادارة الحكيمة يمكن رفع مستوى انتاج كل شجرة وادراك النجاح التام .

ليس بالامكان وضع قاعدة عامة يتمشى عليها المزارعون في كل بستان من بساتين التفاح في الشرق لاختلاف المناخ والتربة واصناف الاشجار وخبرة المزارع من اقليم الى آخر. لذلك فضل البحث بصورة عامة في اسس تعهد الاشجار عملياً وترك صلاحية تطبيق التفاصيل وتكييفها على عهدة المزارع حسب ظروفه المحلية . وهكذا جرى بحث الشؤون التالية : العناية باغراس التفاح الحديثة ، غذاء اشجار التفاح ومصادره ، تعهد التربة ، الماء وطرق الري ، تربية اشجار التفاح وتقليمها ، وتخفيف الثمار . اما فيما يتعلق بوقاية الاشجار من الامراض والحشرات والاعراض الغذائية والطبيعية فقد ارجىء بحثها لاتساعها واهميتها الى الباب الاخير .

الفصل العاشر

العناية باغراس التفاح الحديثة

تختلف العناية بالمطاعم المغروسة حديثاً عنها في الأشجار المثمرة اختلافاً شكلياً فقط وذلك في مواعيد اعمال التعمد ومقاديرها وكيفية تطبيقها وكل ذلك يختلف بتطور نمو الشجرة . وستبحث هذه الاعمال نسبة لكل فصل من فصول السنة لسهولة حصرها .

اعمال السنة الاولى

يهدف المزارع في السنة الاولى الى الحصول على نمو خضري قوي جداً لتشجيع انتشار الجذور المتساوي في جميع اتجاهات التربة ، ولانتاج اغصان قوية تتخذ قاعدة لتكوين هيكل الشجرة . وعليه يستحسن اجراء الاعمال التالية :

اولاً - قلم المطعوم بعد الغرس مباشرة كما هو مبين في الفصل الرابع عشر .

ثانياً - احرت التربة حرارة سطحية مرتين او اكثر في اواخر الشتاء والربيع لازالة الاعشاب .

ثالثاً - جهز مزيجاً من الكلس وضع فيه قليلاً من كبريتات النحاس والشبة واضف اليه الماء كي يصبح قوامه لزجاً، وبعد الحرارة الاولى في الربيع اطل به سوق المطاعم بفرشاة صغيرة الى ارتفاع ثلاثين سنتيمتراً من رأس المطعوم (الشكل رقم ١١) . كرر هذه العملية كلما امطرت السماء وزال الطلاء لوقاية سوق

المطاعم من حرارة الشمس المسلطة على الاشجار العارية في ذلك الحين .


رابعاً - جهز لفائف من الورق المتين بعرض عشرة سنتيمترات ولها على الساق بارتفاع خمسة عشر سنتيمتراً عن سطح التربة واربط طرفيها الاعلى والاسفل بالرافيا رباطاً خفيفاً (الشكل رقم ١١) . اطل اللفائف بمادة لزجة دبقية كالاوستيكو مثلاً لتحول دون تسلق الحشرات على الساق . انتبه الى ابقاء المادة لزجة على اللفائف وكلما جفت اضع مقداراً جديداً منها . لا تضع هذه المادة على الساق مباشرة لانها ضارة بالنمو الخضري . ومراعاة نمو الساق يجب حل رباط اللفائف في الصيف واعادة ربطها في مكان آخر . تجرى هذه العملية سنوياً حتى بعد بلوغ الاشجار دور الامتار .

خامساً - لا تقلم الاشجار الحديثة ولا تؤزل اي جزء خضري عنها خلال فصل الصيف لئلا يضعف نموها الخضري ويقف انتشار جذورها .

سادساً - الافضل ان لا تسقي الاشجار اثناء نموها في السنة الاولى اكثر من مرتين الا في ظروف خاصة لانه ثبت ان الاشجار التي لا تخضع لنظام سقاية مستمرة قصيرة الفترات لا تدخر جذورها وسعاً وراء السعي المتواصل الخيث للحصول على مقادير وافرة من الماء والغذاء لسد حاجتها واتساع انتشارها . وبالعكس يعتبر الاكثار من سقاية الاشجار في السنوات الاولى ضاراً وخاصة اذا تعددت السقايات القصيرة الاجل المتقاربة الفترات . لا تسقى في اواخر الصيف ابداً فيكون هذا العمل مدعاة لتشجيع النمو الخضري المتأخر فاذا وقع الصقيع المفاجيء باكرآ تضرر النمو لعدم اكتمال نضج خشبه .

سابعاً - احذر ان تزرع بين الاشجار اي نوع من الخضر التي تطلب ريةً لانها توغم جذور المطاعم على النمو السطحي ولا تسمح للهواء بالتغلغل بسهولة الى

اعماق التربة؛ كذلك لا يستحسن غرس الخضر غير المسقية الا اذا غرست مسافة مترين او اكثر عن اشجار التفاح .



(معلوف)

الشكل رقم ١١ - اشجار تفاح عمرها عامان مفروسة بأسراب متناسقة. لاحظ انها فلتت وطلبت سوقها بالكس ووضع عليها لفائف مطلية بجادة لرجة لمنع الحشرات من التساق الى اعلى الاشجار في الربيع .

ثامناً - رش الأشجار الحديثة بالمواد الكيماوية الواقية من الأمراض والحشرات القارضة والماصة لا أقل من مرتين في الصيف ومرة واحدة في الشتاء كما هو مبين في الباب الاخير .

تاسعاً - احرت التربة في الحريف بعد توقف النمو الخضري وقبل موعد سقوط الامطار الاولى حرارة عميقة لتتفتح لاستقبال الامطار الشتوية. انتبه الى ابقاء حيوانات الحرت بعيدة عن الاشجار خشية ان تكسر بعض الاغصان المراد تربيتها في هيكل الشجرة .

عاشراً - اصف السماد العضوي المختمر من روث الحيوانات في فصل الحريف بمعدل خمسة كيلوغرامات للشجرة الواحدة في حفر كما هو مبين في الفصل الحادي عشر .

اعمال السنة الثانية

لا تختلف أعمال هذه السنة عن سابقتها كثيراً لان هدف المزارع ما زال إنتاج نمو خضري قوي :

اولاً - رش الاشجار بالزيت المعدنية المبيدة لبيوض الحشرات في الشتاء .
ثانياً - قلم الاشجار في شباط او آذار بقصده تكوين الهيكل المرغوب كما هو مبين في الفصل الرابع عشر .

ثالثاً - يجب حماية الاشجار من القلع في الاقاليم والمواقع التي تتعرض فيها للعواصف الموسمية الشديدة اثناء فصلي الربيع والصيف كالبقاع مثلاً وتثبيتها في اتجاه نموها الطبيعي بدعائم خشبية . اختر دعامة مستقيمة بطول مترين وقطر خمسة سنتيمترات وابر الرأس الغليظ واغمسه بالفطران ودعه يجف واغرسه في التربة الى عمق ٥٠ سم وعلى بعد ٢٠ سم من الشجرة من الجهة التي تعصف منها الرياح لكي يصبح الرأس الأعلى للدعامة منحنيًا قليلاً في اتجاه مصدر الرياح . اربط الشجرة في موضعين أحدهما بارتفاع عشرة سنتيمترات عن سطح الأرض والآخر اربعين سنتيمتراً أعلى منه مستعيناً بالرافيا للربط . تجرى هذه العملية في الربيع بعد الحرارة الاولى وقبل تفتح براعم الاشجار .

رابعاً - واظب على اجراء العمليات الثانية والثالثة والرابعة والثامنة والتاسعة والعاشر من السنة الاولى في مواعيدها المناسبة . لا تزرع الخضر المسقية، لكن يمكن زرع الخضر غير المسقية على بعد ثلاثة أمتار عن ساق الشجرة .
خامساً - ازل أزهار الشجرة الحديثة لان انتاجها الثمار يضعف نموها الخضري .

اعمال السنة الثالثة

اولاً - تابع رش الاشجار بالزيت المعدنية في الشتاء لوقايتها من فتك الآفات .

ثانياً - انجز عملية تكوين هيكل الشجرة كما هو مبين في الفصل الرابع عشر بالتفصيل .

ثالثاً - راجع العمليات الثانية والثالثة والرابعة والثامنة والتاسعة والعاشر المتبعة في السنة الاولى . وكذلك تابع العملية الثالثة للسنة الثانية للمحافظة على استمرار النمو الحضري (الشكل رقم ١١) .

رابعاً - زد مقدار السماد الكيماوي الازوتي الى ربع كيلوغرام (كما هو مبين في الفصل الحادي عشر) وذلك في شهر آذار. لا تغرس الحضر من الآن فصاعداً. خامساً - اسق الاشجار المفروسة في الاتربة الرملية مرتين اثناء الصيف تطويماً اذا توفر الماء والا فاستعمل الاثلام المتوازية للسقاية لانها افضل من الاحواض كما هو مبين في الفصل الثالث عشر .

سادساً - اذا شئت فسمد هذه الاشجار مرة اخرى في الحريف كما جرى في السنة السابقة او ازرع التربة بالبذور القرنية كما هو مبين في الفصل الثاني عشر .

اعمال السنتين الرابعة والخامسة

لا يختلف تعهد الاشجار غير المثمرة في هاتين السنتين عنه في السنة الثالثة . وكما ورد في الفصل الرابع عشر ان التقليم يخف سنوياً ويتحول تدريجياً من تكوين الهيكل والاجزاء الحضرية الى انتاج الفروع والدواير حاملة البراعم الزهرية .

يمكن زيادة الري الى ثلاث ريات آخرها في شهر آب. اما عمليات الرقاية فتصبح عادية كأنها في الاشجار المثمرة. يجب لفت نظر الزراع الى ان الافراط في الري والتسميد والرث امر ضار بالاشجار كالاهمال . وفضل ما يمكن المزارع عمله هو تنسيق اعمال مزرعته وتدوين ملاحظاته الشخصية من سنة الى اخرى في مذكرة يحتفظ بها للرجوع اليها حيث تدعو الحاجة .

الفصل الحادي عشر

غذاء اشجار التفاح ومصادره

تتوقف نسبة نجاح اي صنف من النبات الى حد كبير على مقدار الحرارة والضوء والماء والغذاء في كل موقع، ونسبة ما يحتاج اليه الصنف منها. وهناك ظاهرتان تدلان على حاجة الاشجار للعناصر الغذائية : اولاهما دخول هذه العناصر في تركيب الاشجار ؛ والثانية انه بفقدان بعض العناصر الغذائية نظراً اعراض معينة غير طبيعية على النمو الحضري والثمار . وقد وجد التحليل الكيماوي ان معظم اشجار التفاح وثمارها تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين المتوفرة بكثرة في الهواء والتربة في حالة يمكن استثمارها لمصلحة الاشجار ؛ وتتركب البقية الباقية من مقادير قليلة جداً من عناصر الازوت والفوسفور والبوتاس والكبريت ، وكميات ضئيلة جداً من عناصر الكلس والحديد والمنغنسيوم وآثار من عناصر البورون والزنك والمنغنيز والنحاس ، ولا يمكن الحصول على جميع هذه العناصر الا من التربة .

العناصر الغذائية الضرورية

يطلق على عناصر الازوت والفوسفور والبوتاس والكبريت والكلس اسم العناصر الغذائية الضرورية. وتحتاج النباتات للآزوت او النيتروجين لانه يدخل في تركيب المادة الحيوية والمادة الحضرية لصنع الغذاء ، وفي المواد

الحضر . ثانياً لانتشار جذور الاشجار في التربة في اعماق سحيقة وبذلك تحصل على ما يلزمها من العناصر المجردة التي تتحلل تدريجياً . لهذا يصح القول ان اضافة العناصر الغذائية الضرورية تأتي بافضل النتائج فقط اذا افترقت التربة لها وكانت الشجرة بأمرس الحاجة اليها .

انواع الاسمدة وميزاتها

علم بما تقدم ان هناك ثلاثة انواع من الاغذية لا تستغني الاشجار عن اضافتها الى التربة ، وهي الاسمدة العضوية ، والاسمدة غير العضوية ، والاغذية الوقائية .

١ - الاسمدة العضوية

يقسم هذا النوع من الاسمدة الى قسمين : القسم الاول مكون من نفايات الطيور والماعز والغنم والحيل والابقار وهي مرتبة بحسب فائدها الغذائية . والقسم الثاني مكون من الساد الاخضر ومن اهم انواعه النباتات القرنية . وتحصر فوائد الاسمدة العضوية في ثلاثة امور هامة : اولاً اضافة كميّات لا يستهان بها من عنصر الازوت . ثانياً كونها مصدر حرارة تقتات منه الكائنات الحية الدقيقة محللة العناصر الغذائية المجردة في التربة . ثالثاً ان اضافة هذه الاسمدة الحشنة مثل روث الحبول او زراعة القرنيات تحسن حالة التربة الطبيعية وتحول دون رصّها وتساعد على تسرب المياه اليها وانتشار الهواء فيها ، وهذه امور هامة جداً بالنسبة لنمو الجذور وانتشارها في التربة .

٢ - الاسمدة غير العضوية

تقسم هذه الاسمدة الى ثلاثة اقسام : الازوتية ، والفوسفورية ، والبوتاسية ، وفي كل منها انواع متعددة تطلق عليها اسماء تجارية مختلفة .

الزلالية ، وهو ضروري للانعقاد وتكوين ثمار لذيذة الطعم . ويدخل الفوسفور في تركيب الحوامض والمواد الزلالية الموجودة في الخلايا . ولكون عمل البوتاس مجهولاً يعتقد انه ضروري كعامل في تكوين الزلايات ويساعد على نقل الماء من التربة فينقص منها بسرعة لكثرة الحاجة اليه . ويدخل الكبريت في تركيب المواد الزلالية ، وهو ضروري لتكوين الفيتامينات ولنمو الجذور ويسهل نقل المواد النشوية وامتصاص الاغذية والماء من التربة ويخفف من التسمم الناتج عن وجود عناصر مؤذية . وان نقصان جميع هذه العناصر يسبب اعراضاً غذائية سيأتي بحثها في الفصل الحادي والثلاثين .

وما تبقى من العناصر الغذائية كالبورون والزنك والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس فقد ارجىء البحث بها الى الفصل الحادي والثلاثين ايضاً لانها تسبب اعراضاً غذائية كان يظن انها نتجت عن اصابة الاشجار بالامراض .

الحاجة للاسمدة

لاحظ المزارعون منذ القدم ان في استغلال التربة سنة تلو سنة بزراعة الحضر والحبوب والاشجار ينضب المخزون فيها من العناصر الغذائية التي يجب توفيرها لتأمين استمرار النمو الطبيعي . ولذلك ينبغي اضافة الاسمدة العضوية اليها من روث الماعز والغنم والحبول والابقار . ونظراً لاحتواء هذا النوع من الاسمدة غالباً على عنصر الازوت بينما تقتقر التربة الى العناصر الاخرى لجأوا الى اضافة الاسمدة البوتاسية والفوسفورية غير العضوية .

وتجدر الملاحظة ان تأثير اضافة العناصر الغذائية للاشجار النامية بشكل ساد كباوي كان في اغلب الابحاث العملية والاختبارات العملية بطيئاً او معدماً باستثناء الازوت احياناً . وذلك يرجع اولاً الى ان ما تتطلبه الاشجار لنسوها البطيء من هذه العناصر عاماً بعد عام هو قليل نسبياً اذا قيس بمطالب

الاسمدة الازوتية - 'تُحصر هذه الاسمدة في خمسة انواع: نترات السودا (التشيلي) وبه ١٦٪ ازوت، وسلفات الامونيا وبه ٢٠،٥٪، وسيناميد الجير وبه ٢٢٪، ونترات الامونيا وبه ٢١٪، وفوسفات الامونيا وبه ١١٪ من الازوت، ولكل من هذه الانواع ميزاته . ان الازوت في نترات التشيلي هو في حالة جاهزة لتمتصه الجذور، وأكثر ما تستفيد منه أشجار التفاح اذا اضيف قبل موعد الازهار بشهر واحد . اما الازوت في سلفات الامونيا فهو في حالة غير جاهزة ويجب ان يتحول الى شكل نترات لتمتص الجذور من امتصاصه الا اذا وجد في تربة كلسية او قاعدية اذ تتمكن الجذور عندئذ من امتصاص جزء يسير منه في حالة الامونيا (٢) . ويمتاز عنه سداد نترات الامونيا بوجود ٥٠٪ منه في حالة اكثر قابلية للامتصاص . ولا ينصح باستعمال سيناميد الجير بكميات كبيرة في التربة الكلسية لثلا بولتد مادة كياوية سامة جداً يبقى تأثيرها في التربة مدة سنتين وقد تسبب سقوط الاوراق ابان صيفين متتاليين (٣) .

الاسمدة الفوسفورية - يوجد هذا العنصر في فوسفات الجير في الطبيعة وفي التربة ، وهو غير قابل للامتصاص بواسطة الجذور الا اذا تحول الى حامض الفوسفور باضافة حامض الكبريتيك فتتكون مادة دوبل سوبر فوسفات التي تحتوي على ١٤ - ٢٠٪، وتحتوي مادة تربل سوبر فوسفات على ٤٥ - ٦٠٪ من الفوسفور ، وهذه الاخيرة سهلة الانحلال وقابلة لان تمتصها الجذور .

الاسمدة البوتاسية - هناك نوعان من هذه الاسمدة : سلفات البوتاس وكلورور البوتاس . يحتوي كل منهما على ما لا يقل عن ٤٨٪ من البوتاس . وافضلها هو سلفات البوتاس الذي يحدث تفاعلاً حامضياً في التربة الكلسية والذي يضيف عنصر الكبريت ولا ينتج عنه رد فعل سيء اذا استعمل بكثرة .
ضرورة اضافة الكلس للتربة - ان نقصان الكلس في التربة لا يجد من

انتشار الجذور ومقدرتها على امتصاص الماء فحسب بل يساعد على رصها وازدياد تماسكها ورداءة تهويتها . فاذا كانت طينية ساءت حالتها الطبيعية واصبحت غير صالحة للنمو وصعب العمل فيها ؛ واذا كانت رملية قلت مقدرتها على الاحتفاظ بالماء وقل تماسكها . لذلك يجب اضافة الكلس للتربة الرملية او الرملية الطمية لزيادة تماسكها واحتفاظها بالماء ، وللتربة الطينية الثقيلة ، وخاصة حيث يكثر ماء الري ، لتفكيكها واصلاح حالتها الطبيعية بعد تحقق ضرورة الكلس لها . وفضل نوع من الكلس هو كلس البناء المطفي ويضاف بمعدل يتراوح بين ٧٥ - ١٠٠ كيلوغرام للدونم الواحد حسب الحاجة اليه .

٣ - الاغذية الوقائية

كشف الاختبار عن احتياج الأشجار أحياناً الى مقادير ضئيلة او آثار من عناصر البورون والزنك والمنغنيز والنحاس والحديد والمغنيسيوم لغذائها . وبسبب نقصانها اعراضاً غذائية في نمو أجزاء معروفة من الاشجار كان يعتقد انها ناتجة من اصابة الاشجار بأمراض فطرية . تضاف هذه العناصر الى التربة أو ترش على الاشجار لتلافي حدوث تلك الاعراض ، وسيبحث هذا الموضوع باسهاب في الفصل الحادي والثلاثين .

مواعيد التسميد

تختلف مواعيد التسميد تبعاً لنوع الساد. فتضاف الأسمدة العضوية المكونة من روث الحيوانات المختبر قبل ميعاد هطول الامطار الاولى في الخريف لتتحلل وتنتقل منها العناصر الغذائية الضرورية في الربيع ، ويتطلب هذا العمل وقتاً لا يقل عن ثلاثة أشهر أو اربعة . واذا كانت الأسمدة خضراء كالقنريات يجب زرع بذورها في الخريف لتمتص من انتاج أقصى ما يمكن من النمو الحضري قبل حلول فصل الربيع .

وتضاف الاسمدة غير العضوية في موسم الشتاء . فاذا كانت بوتاسية او فوسفورية وجب اضافتها في اواسط فصل الشتاء (كانون الثاني) ؛ واذا كانت سلفات الامونيا وجب وضعها قبل الازهار بشهرين ؛ وتضاف نترات السودا او نترات التشيلي قبل موعد الازهار بشهر واحد فقط وذلك قبل آخر الامطار .

مقادير الاسمدة المضافة

يعتقد البعض انه يمكن بتحليل التربة تقدير حاجتها للاسمدة، وهذا الاعتقاد خاطيء لسببين : الاول أن القرائن الدالة على نقصان بعض العناصر الغذائية كالپوتاس والفوسفور معاً في التربة هي غيرها الدالة على نقصان احدهما فقط اذا كان العنصر الآخر متوفراً . والسبب الثاني هو ان القرائن الدالة على نقصان احد العناصر كالپوتاس - مثلاً - تتغير من تربة الى اخرى على صنف النبات عينه . ولا يوجد علاوة على ذلك طريقة مباشرة عملية لمعرفة العناصر الغذائية الجاهزة في التربة لاختلاف مقاديرها باختلاف المواسم . وأفضل الطرق لتحقق نقصان العناصر الغذائية في اية تربة كانت هي ملاحظة المزارع الدقيقة كيفية نمو اشجاره وحالة انتاجها .

يجذر الافراط من استعمال الاسمدة على انواعها لما لها من سيئات : فان اضافة روث الحيوانات بكثرة زائدة كل عام مثلاً تحول دون انتاج البراعم الزهرية وانعقاد الازهار وتؤخر نضج الثمار التي يفسد طعمها ويقبح لونها ويصير لها خشناً وجافاً لكثرة ما فيها من الازوت (٢) . وباضافة الفوسفور والبوتاس على غير هدى تطرد بعض العناصر الضرورية من محلول التربة لدى الحاجة اليها (٣) .

يتوقف مقدار ما يجب اضافته من الاسمدة على نوع السباد ونسبة تركيبه، ونوع التربة وكيفية تعيها، وعمر الاشجار وحجمها ، ومقدار نقصان العناصر

الغذائية ، ولهذا يصعب وضع قاعدة ثابتة للتسييد لان لكل بستان ظروفاً خاصة . ويتبع البعض قاعدة عامة لاستخدام الاسمدة الازوتية المعدنية هي اضافة مئة غرام من السباد الازوتي للشجرة الواحدة عن كل عام من اعوام النمو مرة كل سنتين ؛ فاذا كان عمرها اربع سنوات يضاف اليها ٤٠٠ غرام ، واذا كان عمرها خمسة وعشرين عاماً تعطى كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام ، وهذه اقصى كمية يجبذ اضافتها للشجرة ؛ ويعطى نسبة الى هذه المقادير نصفها من الفوسفور (٤٤٪) وثلاثة ارباعها من البوتاس (٥٨٪) لكل شجرة مغروسة في الاتربة الرملية الطيبة (الحامضة) مرة كل ثلاثة اعوام . اما الاشجار المغروسة في الاتربة الطينية الكلسية فتعطى مقادير اكبر فتصبح نسبة الفوسفور ثلثي كمية الازوت المضافة ونسبة البوتاس تعادلها . اما روث الحيوانات (الغنم والماعز والحبول) فيضاف بمعدل كيلوغرامين عن كل سنة من سنوات النمو مرة كل ثلاث سنوات ؛ اما روث البقر فيضاف بمعدل ثلاثة كيلوغرامات . ويشترط ان لا يزيد مقدار السباد العضوي المضاف عن اربعين كيلوغراماً للشجرة المثمرة الكبيرة الحجم (راجع المنهاج السنوي لتعهد التربة في الفصل الثاني عشر) .

اساليب اضافة الاسمدة

لقد استوحى العلماء احدث اساليب اضافة الاسمدة الى التربة من طريقة انتقالها في الجذور وكيفية تفاعلها في التربة . فقد وجد ان الجذور تحتص في رفع الاسمدة في الاشجار فاذا سدت التربة على جانب واحد من الشجرة تمتص الجذور النامية فيه تلك الاسمدة وترفعها الى الاغصان والفروع النامية في ذلك الجانب (٣) ؛ وهذا يوجب وضع الاسمدة في التربة حول جميع جوانب الشجرة . وبما ان التربة تتفاعل مع الاسمدة المضافة اليها وقد تجيها وتجمعها غير قابلة الامتصاص وجب اضافتها بمقادير وافرة في مواقع ضيقة لتأخذ التربة حاجتها منها

اولاً لاشباع نهما (حالة تفاعلها) وما يفيض يبقى في حالة محلول جاهز للامتصاص . واذ تكفي بضعة جذور في كل جانب لامتصاص ما تحتاج اليه الشجرة فلا خوف ان تتأثر الاشجار من اضافة الاسبدة بهذه الطريقة (٣) .

وهكذا توزع الاسبدة العضوية المختمرة وغير العضوية بكثافة في حلقتين او ثلاث حلقات ضيقة حول الاشجار تبعد الاولى مسافة ٦٥ سم وتبعد الثانية متراً ونصف المتر والثالثة مترين وربع المتر عن سوق الاشجار الكبيرة . تحفر هذه الحلقات على عمق عشرين سنتيمتراً وعرض لا يزيد عن ثلاثين سنتيمتراً في حالة اضافة روث الحيوانات وعرض خمسة عشر سنتيمتراً اذا اضيفت الاسبدة الكيماوية . ويوضع الساد في هذه الحلقات ويطمر بالتراب . وقد ابتكر بعضهم طريقة عملية لاضافة الاسبدة الكيماوية بثقب الارض باداة حادة قطرها ثلاثة سنتيمترات الى عمق عشرين سنتيمتراً في مواقع متعددة في ثلاث دوائر ترسم بالابعاد المذكورة اعلاه حول ساق الشجرة وتوزع الاسبدة عليها وتطمر . وهذه طريقة سهلة التنفيذ قليلة النفقة ولها التأثير عينه على تسويد الاشجار . والافضل وضع منهاج سنوي للتسويد يسير عليه المزارع سنة بعد سنة وتجدر فودجاً عنه في الفصل الثاني عشر .

الفصل الثاني عشر


تعهد التربة

ان الغاية من حرث التربة وعزقها وتسبيدها هي جعلها صالحة لنمو الاشجار . واهم اسباب الحرث هي المحافظة على رطوبة التربة بمنع ضياعها بواسطة النتح من اوراق الاعشاب ، وايجاد البيئة الملائمة لتكثير الكائنات الحية الدقيقة العاملة على هضم المواد الغذائية وجعلها صالحة كغذاء للنبات ؛ والعمل على عدم ارتصاص التربة وتكتلها فتتيسر التهوية الضرورية لتنفس الجذور ويسهل تسرب الماء اللازم الى اعماقها .

طرق تعهد بساتين التفاح

تختلف انواع تعهد تربة بساتين التفاح باختلاف الاقاليم والمناخ والاتربة . واليك خلاصة اشهر انواع التعهد الثلاثة المتبعة في العالم :

الطريقة الاولى : التربة المكسوة دائماً - وهذا يعني ابقاء التربة مكسوة بالاعشاب الخاصة (Sod) اثناء جميع فصول السنة . وتستعمل هذه الطريقة بكثرة في الاقاليم التي تهطل امطارها اثناء فصول السنة الاربعة فتوفر نفقات الحرث وتقي التربة اذى الرص والانجراف . وهذه الطريقة لا تصلح للاستخدام في الشرق الادنى .



(مملوف)

الشكل رقم ١٢ - التربة المكسوة شتاء: ان النباتات القرنية النامية في هذا البستان في فصل الشتاء تقي تربته انهدام تركيب ذراتها الناتج عن تكرار الحراثة ، كما انها تضيف اليها المواد العضوية والاغذية ، وترفع حرارة التربة شتاء بمقدار خمس درجات مئوية . لاحظ ان المزارع بدأ حرثها في الموعد المناسب .

(Lupinus termis) ونبات سسبانيا (Sesbania) . تزرع هذه النباتات قبل هطول الأمطار الاولى في أوائل شهر تشرين الاول في المواقع المروية لكي تنتج غمواً خضرياً وفيراً ؛ أو بعد هطول الأمطار الاولى مباشرة في المواقع غير المسقية . وبعد اكتمال إزهارها تقطع عند سطح الأرض وتلقى على التربة الى بعد ميعاد إزهار الاشجار وانعقاد الثمار ثم تجمع في أكوام وتحرق الأرض وتنثر عليها الاجزاء الجافة . أما اذا توجب حرث هذه النباتات مبكراً فيجب ان يرش السباد الكيماوي الازوتي حالاً لكي لا ينقص عن المقادير الضرورية ابان الإزهار.

وضع منهاج سنوي لتعهد التربة

انه من الانسب وضع منهاج سنوي لحرث التربة وتسميدها وتعديل هذا منهاج من آن الى آخر حسب الخبرة المحلية وتقدم الابحاث العلمية لانه يفضل

الطريقة الثانية : الحراثة النظيفة - اي ابقاء الارض خالية من الاعشاب في جميع الفصول (Clean Cultivation) بحرثها مراراً ، وهذه الطريقة متبعة في الشرق الادنى وبعض الاقاليم الاخرى مثل كاليفورنيا ، وتعتبر كثيرة النفقات وضارة لانه بتكرار الحراثة يمكن هدم تركيب التربة وسرعان ما تنقصها المواد الغذائية الضرورية وتصبح تهوئتها . وقد ثبت في ولاية كاليفورنيا ، حيث الصيف طويل وجاف والحرارة شديدة ، عجز الاشجار قبل اوانها وصغر حجم ثمارها وقد نتج هذا من ارتصاص التربة وانجرافها وفقد المواد العضوية والغذائية التي كثيراً ما تذوب وتتسرب الى اعماقها (٣) . ولذا ينصح ان لا تحرق التربة الا بمقدار الحاجة الى ازالة الاعشاب وحسب .

الطريقة الثالثة : التربة المكسوة شتاء - وهذا يعني زرع النباتات القرنية او غيرها من الحشائش اثناء فصل الخريف (Winter Cover Crop) وبقاء التربة نظيفة من الاعشاب اثناء فصلي الربيع والصيف . وهذه افضل طرق تعهد التربة خاصة في الاقاليم الغزيرة الامطار شتاء كما هي الحال في لبنان . ومن فوائد هذه الطريقة انها تضيف الى التربة مواد عضوية خشنة تساعد على حفظها مسامية ، وهي في الوقت نفسه مصدر قوت للكائنات التي تجهز الاغذية الضرورية للنبات ، ومصدر للازوت وللمواد العضوية الغروية التي تساعد على اصلاح تركيب التربة الطبيعي وتزيل التأثير السيء الناتج عن تكرار الحراثة الصيفية . ويرفع وجود هذه النباتات في الشتاء حرارة التربة بمقدار خمس درجات مئوية بالنسبة للتربة النظيفة ، كما ان التربة المغطاة باجزاء النبات (Mulch) في الصيف تكون ابرد من التربة النظيفة بمقدار خمس درجات مئوية ايضاً (الشكل رقم ١٢) .

وافضل النباتات للزرع هي الخندقوق البستاني او البرسيم المر (Melilotus indica) والفول (Vicia faba) والباقية (Vicia sativa) وفي الاقاليم الدافئة يفضل الترمس

تغيير طرق التعهد وخاصة الحرث من آن الى آخر حفظاً لتركيب ذرات التربة وحيويتها وحالتها الغذائية . كما ان المنهاج المنظم يظهر للمزارع صلاحية اعماله او اخطاها فيمكنه ذلك من تحسينها . وفضل منهاج هو الذي يستوحي الدورة الزراعية الثلاثية او الرباعية .

السنة الاولى - تحرت الارض عميقاً في الحريف قبل هطول الامطار الاولى وتسمد بالسماد العضوي بمعدل كيلوغرامين لكل سنة نمو . وتسمد التربة في اواخر الشتاء قبل الازهار بشهر واحد بالسماد الآزوتي بالطرق الميئة في الفصل السابق بمعدل ٥٠ غراماً (ربع اوقية) عن كل سنة نمو ؛ وتحرت التربة حرارة سطحية عند اللزوم في الربيع بقصد ازالة الاعشاب فقط . وتسقى في المواعيد وبالمقادير الميئة في الفصل التالي .

السنة الثانية - يضاف الكلس المطفي الى الاتربة الحامضة او الرملية او الطينية الثقيلة جداً عند الحاجة قبل هطول الامطار الاولى في فصل الحريف او قبل الري لزراع حبوب النباتات القرنية بمعدل مئة كيلوغرام للدونم الواحد . تزرع النباتات القرنية قبل هطول الامطار الاولى اذا كانت الارض مروية وتقص بعد اكتمال ازهارها مباشرة ، ويمكن حرثها حالاً او نثرها على سطح الارض . وفي حالة حرثها حالاً يجب اضافة السماد الآزوتي قبل إزهار الاشجار بشهر واحد بمعدل ٥٠ غراماً لكل شجرة عن كل سنة من سني النمو . وبعد اكتمال انعقاد الثمار يمكن حرث الاجزاء النباتية ، او جمعها وحرث التربة واعادة نثرها بقصد تغطية سطح الارض في ايام الصيف ، ويُلجأ الى هذه العملية الاخيرة فقط في الاتربة التي لا تسقى صيفاً .

السنة الثالثة - تحرت التربة في الحريف حرارة عميقة وتبقى نظيفة في جميع فصول السنة بالحرث لازالة الاعشاب الضارة . تضاف الاسمدة الفوسفورية

بمعدل خمسين غراماً والبوتاسية بمعدل خمسة وسبعين غراماً عن كل سنة نمو لكل شجرة بالاساليب الميئة في الفصل السابق وذلك في اواسط فصل الشتاء . ويلى هذا اضافة الاسمدة الآزوتية قبل إزهار الاشجار بشهر واحد بمعدل مئة غرام لكل شجرة عن كل سنة نمو . تحرت التربة عند الاقتضاء لازالة الاعشاب فقط (راجع تأثير اعمال التعهد في انتشار جذور اشجار التفاح في التربة في الفصل السابع) .

ومن البدهي ان الحرارة العميقة في الربيع وخاصة قبل الازهار مباشرة ضارة جداً بالأخصاب والانعقاد والاحرى تجنبها واستبدالها بالحرث السطحي قبل الازهار او بعد الانعقاد بفترة طويلة .

الفصل الثالث عشر

الماء وطرق الري

للماء تأثير عظيم في نمو اشجار التفاح وانتاجها وجودة الثمر وحجمه وشكله ولونه وطعمه ومدة حفظه في البراد . وعليه يمكن المزارع ان يتحكم بمياه الري لمصلحته اذا عرف مدى تأثيرها وكيفية هذا التأثير في نمو الاشجار واستطاع تقدير الكميات اللازمة منها ومواعيد وطرق استخدامها .

تأثير الماء في نمو اشجار التفاح

ان الاوراق هي اكثر الاجزاء حاجة للماء لانتاج النشاء والمواد الزلالية المكونة فيها وللاحتفاظ بشكل الخلايا الطبيعي والموازنة بين العمليات الكيماوية والطبيعية والعمل على تبريد الاشجار (الناتج عن عملية النتج) لاتقائها اضرار الحر . يشجع الري بمقادير معتدلة في اواخر فصل الربيع على تغيير البراعم من خضرية الى زهرية ويساعد على انعقادها . وتحول زيادة الماء او نقصانه دون انتاج البراعم ، كما يسبب سقوط الازهار ويجول دون انعقاد الثمار وخاصة في الاقاليم القليلة الامطار (٣) .

وللماء اثر كبير في تكوين شكل الثمار وحجمها اذ بانخفاض مقادير الماء عن المعدل الضروري تصبح الثمار اكثر استدارة وانبساطاً ، وبازدياده تكون اكثر استطالة وذات زوايا . ويعتبر الماء الزائد عن الحاجة عاملاً هاماً في تكوين لون

رديء وطعم كثير الحموضة وفي تقصير مدة تبريد الثمار . وفي حالة نقصان الماء الى درجة الذبول الدائم قد ينتقل الماء من الثمار الى الاوراق وينتج عن ذلك لون رديء باهت ويصبح لب الثمار جافاً وخشناً . يستدل من هذه الامور ان ايجاد الماء بالمقادير اللازمة للنمو والانتاج ليس امراً ضرورياً فحسب بل هو عمل غير يسير ويتطلب خبرة باسرار الري .

مصادر الماء

ان الامطار والثلوج هي المصدر الوحيد للماء القراح ، ويختلف توزيعها في العالم بحسب جيولوجية الاقاليم وموقعها الجغرافي . فبعضها يسقى من مياه الامطار في جميع المواسم والبعض الآخر يسقى في مواسم معروفة كما هي الحال في الشرق الادنى . والهام في الامر احتفاظ التربة بمقدار وافر من هذا الماء وما يفيض يتسرب اما الى جوف الارض ويخرج بشكل ينابيع او يسير على سطحها جارفاً التربة بما فيها من المواد الغذائية الى البحر .

ماء الامطار - يعتمد على الامطار لسقاية اكبر مساحة مفروسة باشجار التفاح في العالم ، وينطبق ما تقدم على الاقاليم التي يهطل المطر فيها صيفاً والثلج شتاءً . وفي الاقاليم التي تسقط فيها الامطار الموسمية في الخريف والشتاء بوفرة يمكن الاعتماد على ماء الامطار فقط اذا كانت التربة قابلة للاحتفاظ بها كما هي الحال في بعض مواقع الشرق الادنى؛ اما في ولاية كاليفورنيا فقد غرست معظم مزارع التفاح في مواقع لا تسقى في الصيف بل تعتمد على ما يهطل من الامطار في الشتاء (٧) . وفي هذه الحال يجب ان يلجأ المزارع الى العمليات الزراعية التي توفر الغذاء الكافي وتزيل الاعشاب منعاً لاستنزاف الماء بدون جدوى .

الماء الجوفي - يختلف هذا الماء عن ماء الأمطار أحياناً لأنه أثناء تغلغله في طبقات الأرض يلتقط منها بعض الأملاح الضارة . ولهذا وجب الانتباه دائماً

الى تحليله قبل استعماله للتحقق من صلاحه للري. كما ان على المزارع الانتباه الى مستوى الماء الجوفي لئلا يرشح الى منطقة الجذور النامية فيسبب تعفنها أو اختناقها في فصل الشتاء في المواقع السهلية كما هي الحال في سهل البقاع .



(معلوف)

الشكل رقم ١٣ - بناء السدود لحفظ الماء للري: لقد استغل المزارع الفطن ضعف الطبيعة فشيّد هذا السد بيناه حائط في الفجوة الضيقة بين الصخور بارتفاع تسعة أمتار واستطاع ان يحتفظ بمقدار ١٤,٠٠٠ متر مكعب من ماء الامطار يمكنه استعمالها في ري ٣٠٠٠ شجرة تفاح او اكثر .

تقدير كمية الماء اللازمة للري

لأجل تقدير كمية الماء الضرورية للري يجب معرفة مقدار ما تحتاج اليه الشجرة الواحدة ومقدار ما يمكن ان تستوعبه التربة المغروسة فيها تلك الشجرة. ويقدر ما تستهلكه شجرة واحدة مشمرة متوسطة الحجم غرست على ابعاد ٦ × ٦ أمتار في موسم واحد بنائية أمتار مكعبة من الماء (اي ٨٠٠٠ لتر ماء) باعتبار استهلاك الشجرة الواحدة من هذا الحجم ثلاثة أمتار مكعبة لسد حاجة النمو الحضري وخمسة أمتار مكعبة من الماء لانتاج مئة كيلوغرام من التمار (١)

و(٨) . وحقيقة الأمر ان هذه الأرقام قليلة النفع عملياً لاختلاف البيئة النامية فيها الاشجار والعوامل المؤثرة عليها كالحرارة والرطوبة وسرعة الهواء ونوع الضوء وشدته وتوفر مقادير الغذاء في التربة ونقصان الكلس او البوتاس منها ونوع الاصول المطعمة عليها الاشجار وكيفية انتشار جذورها، ومع ذلك فانها تعطي فكرة تقريبية لمتطلبات الشجرة .

تتوقف سعة التربة المغروسة فيها الشجرة للماء على عمقها ومساحتها (اي الابعاد بين الاشجار) ونوع وتركيب ذراتها وكيفيته . فاذا اشبعت بالماء مساحة معروفة من التربة وانصرف الماء الزائد او الطليق لعجز التربة عن استيعابه يعتبر ما تبقى فيها من الماء قدرتها على الاستيعاب وقد سميت « قدرة استيعاب الحقل » (Field Capacity) . ينضب هذا الماء تدريجياً مع مر الأيام لاستهلاكه في النمو الى ان تصبح الشجرة عاجزة عن سد حاجتها منه لأسباب طبيعية فتذبل، ويسمى هذا الحد « نسبة الذبول الدائم » (Permanent Wilting) . فالفرق بين قدرة استيعاب الحقل ونسبة الذبول الدائم هو كمية الماء المخزون والذي يمكن الأشجار الاعتماد عليه ويُعرف بمقدار « الماء الجاهز » (Available Water) وتختلف مقاديره تبعاً لنوع التربة .

اذا عُرف مقدار الماء الجاهز في التربة سهل تقدير ما تتطلبه الأشجار من الماء لريتها ؛ وقد درست هذه الناحية واليك مثلاً أخذ من اجاث علماء ولاية كاليفورنيا التي تطابق طبيعتها في كثير من الاحوال طبيعة الشرق الأدنى . فاذا افترضنا ان أشجار تفاح غرست على ابعاد ٦ × ٦ أمتار في تربة منقوبة الى عمق ١٢٥ سم واصبح بإمكان كل شجرة مشمرة استغلال الماء الجاهز الموجود في ٤٥ متراً مكعباً من التراب تكون مقادير الماء الجاهز في التربة كما هو مبين في الجدول الرابع .

الجدول الرابع - مقادير الماء الموجودة في اتربة متنوعة
حجمها ٤٥ متراً مكعباً (٣) و (١٠)

نوع التربة	النقل النوعي	قدرة استيعاب الحقل %	نسبة الذبول الدائم %	النسبة المثوبة من الماء الجاهز في ٤٥ متراً مكعباً من التراب	عدد الامطار المكعبة من الماء
طمي رملي (رامونا)	١٤٤٦	١٢	٤٤٥	٧٠٥	٥
طمي (بولو)	١٤٣٠	٢٤	١٢٤٠	١٢٤٠	٧٤١
طمي طيني (دوبلن)	١٤٢٠	٣٠	١٣٤٠	١٧٤٠	٩٤٣
طين (ادوب)	١٤٣٠	٣٨	١٩٤٠	١٩٤٠	١١٤٣

تدل هذه الارقام ان التربة الرملية تحتفظ بنصف ما تحتفظ به الاتربة الطينية من الماء الجاهز، ويستنتج ان الاشجار لا تحتاج الى السقاية مطلقاً في الاتربة الطينية . ومع صحة هذه الارقام لا يمكن اعتبار هذا الاستنتاج صحيحاً كل الصحة لانه ليس بوسع الجذور ان تنتشر بسهولة في الاتربة الطينية كما هي الحال في الاتربة الرملية او الطمية . ويقدر ما يمكن ان تحصل عليه الشجرة من الماء في الاتربة الطينية بما لا يزيد عن ٦٠٪ من الماء الجاهز . وعليه يمكن تحديد كمية الماء الممكن استغلالها من اشجار التفاح المغروسة على ابعاد ٦ × ٦ امتار بخمسة او ستة امتار مكعبة من الماء وما تبقى يسد من ماء الري والباقي حجم الاشجار صغيراً وتضاءل انتاجها . وبناءً على ما تقدم تحتاج الشجرة المغروسة على ابعاد ٦ × ٦ امتار من مترين الى ثلاثة امتار مكعبة من الماء في فصل النمو على اقل تقدير بالاضافة الى ماء الامطار الموسمية ، وان لكل بستان ظروفه الخاصة .

مواعيد الري

تتأثر مواعيد الري بثلاثة عوامل هي : سرعة فقدان الماء من الاشجار (النتح) ، ونوع التربة وعمقها ، وطريقة الري . فيجب درس كل بستان

بمفرده لتحديد مقدار الماء اللازم ومواعيد ريه . وجدير بالملاحظة ان مقدار الماء الجاهز في التربة ابان الربيع يجب ان يكون وافراً وخاصة قبل الازهار بشهر واحد . فاذا زرعت النباتات القرنية يستحسن قطعها قبل ميعاد الازهار بشهر ونصف الشهر كي لا تراحم الاشجار على الماء . ولكن حذار من ري الاشجار في ميعاد الازهار أو اثناء الانعقاد فتتزل بها اشد الاضرار .

وبما ان ثمار التفاح تنمو بانقسام الخلايا في الاسابيع الستة التي تتلو الانعقاد ثم تنمو بعدها باستطالة خلاياها فالأفضل ري الاشجار لأول مرة في الربيع بعد الانعقاد بأسبوعين للحؤول دون سقوط الثمار بكثرة في شهر ايار او حزيران . فاذا اعتبر هذا التاريخ اول موعد للري يمكن تحديد الفترات التالية بعد درس حالة البستان وهذه غالباً ما يقصر امدها في الاتربة الرملية ويجب ان لا يتعدى عشرين يوماً ، وقد يطول امدها في الاتربة الطينية الى ستة اسابيع . واذ ثبت نهائياً ان الاشجار المنتجة لا تحتاج الى الماء بكثرة الا بعد بلوغ مقداره «نسبة الذبول الدائم» وجد بالاختبار انه من المفضل ترك التربة بدون ري حتى يجف سطحها الى عدة سنتيمترات في العمق قبل البدء بالسقية التالية .

طرق الري ومقادير الماء

تسقى الاشجار بطرق متعددة وفقاً للعادة المتبعة بين المزارعين في كل اقليم او حسب عمر الشجرة ونوع التربة وانحدارها ومقدار الماء المتوفر للري . وقد ثبت ان من الافضل ري الاشجار الحديثة بالاحواض الواسعة او الانلام البعيدة في السنوات الثلاث الاولى اذا كان لا يد من ذلك . تجهز هذه الاحواض على شكل مربعات او دوائر واسعة تبعد حلقاتها متراً واحداً عن سوق الاشجار وباتساع متر ونصف المتر ويزاد حجمها بازدياد نمو الاشجار وتتلأ بالماء مرة واحدة كل رية .

تعتبر في الاشجار المثمرة طريقة تطويق الارض بكاملها افضل اساليب الري لتوسيع الفترات بين الريه والاخرى بدون انقاص مقادير الماء الضرورية للنمو. بهذه الطريقة يسهل الحرث وتقل نفقاته وتخفض تكاليف اعداد التربة للري فتكفي ريتان في الموسم الواحد على اعلى تقدير في الاتربة المتوسطة والطينية .

وفي حال عدم توفر الماء للري بالتطويق يمكن اتباع طريقة الري بالانلام العريضة (١١) وهي تمتاز عن الري بالتطويق لانها لا تتطلب مقادير كبيرة من الماء . جهاز ثلثين او ثلاثة انلام سطحية لا يزيد عمقها على عشرين سنتيمتراً ولا يقل اتساعها عن ستين سنتيمتراً بواسطة محارث خاصة بين اسراب الاشجار على ان يبعد الثلم الاول ٧٥ سم عن سوق الاشجار المثمرة والثاني يبعد المسافة نفسها عن حافة الثلم الاول . يمكن تكييف عدد هذه الانلام وحجمها والابعاد بينها بالنسبة لعرض المصطبة او السهلة المغروسة . وبموجب هذه الطريقة يجب ان توزع الانلام لتشغل اكبر مساحة من الارض بين الاسراب وان تكون الانلام عريضة وحافتها قليلة الارتفاع لمنع تجمع الاملاح واحياناً العناصر الغذائية على سطح تلك الحافة بعد جفافها . تملأ هذه الانلام على فترتين في يوم واحد اذا شاء المزارع توفير الماء وتوسيع فترات الري . تكفي هذه الكمية اذا وزعت مرتين اثناء الصيف في الاتربة الطينية ولا بد من ريّة ثالثة في الاتربة الطمية ورابعة في الاتربة الرملية .

وافضل طريقة لتوفير المياه هي الري بانابيب مصنوعة من ألياف القطن الطويلة المتينة فتروشح المياه منها تحت ضغط خفيف، كما يمكن فتح ثقوب صغيرة في الانابيب على ابعاد ٦٠ سم للاسراع في الري . وهذه افضل طريقة للسقي

في المواقع الكثيرة الانحدار (١٠) . توفر هذه الطريقة نفقات تجهيز احواض او انلام للري وتمنع انجراف التربة. وهذه الانابيب خفيفة وسهلة النقل ويمكن وصلها بعضها ببعض بواسطة انابيب من المعدن . فاذا توفرت هذه الانابيب باسعار معتدلة يُنصح باستعمالها في سقي الاشجار في المواقع المنحدرة وفي الاماكن التي ليس فيها الكفاية من الماء (الشكل رقم ١٣) .

الاعوام بأقل ما يمكن من الشذوذ . رابعاً - تجديد حياة الشجرة الهرمة او اصلاح اي عطل يطرأ عليها .

تأثير التقليم في النمو والاثار

التقليم وحجم الاشجار - من المؤكد ان الشجرة التي لا تقلم ابدأ يصبح حجمها أكبر كثيراً من حجم الاشجار المقلمة ، ولذا يعتبر التقليم على اختلاف درجاته عملية تقصير أو تصغير بالنسبة لنمو الاشجار الحضري . وبذلك يتسكن المزارع الحبير ان يتحكم بحجم اشجاره بالكيفية والشكل كما يرغب فيتربط عليه ان يقرر الحجم الذي يجب ان تبلغه اشجاره تبعاً للبيئة الطبيعية . فاذا كان موقع البستان منخفضاً ودافئاً جداً ومعرضاً للرياح فلا يستحسن ان تنمو اشجاره باحجام كبيرة . واذا كان الموقع مرتفعاً وبارداً في الصيف واشجاره مغروسة على ابعاد واسعة ومروية يمكنه حينئذ تربية احجام اشجار كبيرة . لكنه يحذر من تربية الاشجار باحجام كبيرة جداً فيتعذر تسلقها لتقليمها وقطف ثمارها ورشها بالمواد الكيماوية مراراً عديدة . وفي الولايات المتحدة الأميركية حيث يبلغ حجم اشجار التفاح ضعفي حجم اكبر اشجار الزيتون في الشرق الأدنى قرر المسؤولون الرجوع الى تربية احجام متوسطة لسهولة العمل فيها وقلة نفقاتها .

التقليم وتوزيع النمو والانتاج - يسبب التقليم الجائر نمواً خضرياً ويقلل من انتاج الدواير (الفروع الثمرية) حاملة البزاعم الزهرية ، فهو لا يتبع إلا في الاشجار الحديثة اثناء تكوين هيكلها او في الاشجار القديمة الواجب تجديد حياتها . ولذلك يجب تخفيف التقليم بعد السنة الثالثة تدريجياً حتى تصبح الشجرة في حالة الاثمار .

وللتقليم الجائر تأثير سيئ في نمو الجذور ، اذ بازالة الفروع تنخفض مساحة

الفصل الرابع عشر

تربية اشجار التفاح وتقليمها

اذا تركت اشجار التفاح تنمو بطبيعتها دون ان تتناولها يد المزارع بالتقليم يتخذ كل صنف منها شكله الطبيعي الموروث . وبعد زمن يلاحظ ديبب الوهن في الاشجار والجفاف في الاغصان تدريجياً عاماً تلو الآخر ؛ والسبب في هذه الظاهرة هو محاولة الاشجار تكييف نموها تبعاً للبيئة بالتخلص من النمو الفاضل الذي لا طاقة لها على تغذيته . فيجب ان يرتكز التقليم اذن على هاتين الحقيقتين لتبقى اشجار التفاح قوية ومنتجة .

في حين تعمل الشجرة على التخلص من النمو الفاضل بطريقة طبيعية ومنظمة يقلم المزارع اشجاره أحياناً تقليماً خاطئاً اما لجهله طبيعة نمو الأصناف او لاغفاله اسس التقليم . فاذا أهمل مبادئ التقليم ياحق بأشجاره أضراراً جسيمة كأن يقصر حجمها ، او يربيبها على شكل خاطيء ، أو يحدث اختلالاً في التوازن بين النمو الحضري والاثمار ، او يزيل الفروع المثمرة عنها ، الى ما هنالك من الاخطاء التي يرتكبها كل دخيل على هذا العلم .

واهم اسس تقليم اشجار التفاح اربعة : اولاً - بناء هيكل طبيعي صحيح ومتين . ثانياً - تنظيم النمو الحضري وتوزيعه بالتساوي على جميع أجزاء الشجرة . ثالثاً - تنظيم الانتاج وتوزيعه في جميع انحاء الشجرة على توالي

الاوراق وتقل مقادير الغذاء والمنبهات النباتية (Hormones) المستوردة منها وبذلك ينخفض نمو الجذور نسبياً .

وللتقليم تأثير موضعي وتأثير عام في الشجرة . فإزالة الفروع او الدواير الضعيفة تؤثر في الموضع او الجانب الذي ازيلت منه . وفي التقليم الجائر كإزالة الاغصان الكبيرة مثلاً يتسع التأثير الموضعي وقد يشمل الجانب بأكمله او يعم جميع اجزاء الشجرة . يستنتج من هذا ان التقليم يجب ان يكون وسيلة لتوجيه قوى الشجرة في اتجاه معين او من جانب الى آخر او لتوفير القوى من سنة الى سنة كإزالة بعض الازهار او الدواير الثمرية او الثمار في السنوات الغزيرة الانتاج ليتحول الغذاء الى انتاج الاجزاء الخضرية والبراعم الزهرية . والتقليم الخفيف احد الاساليب لتفادي الانتاج غير المنتظم (الدوري) في اصناف التفاح ، وهو يزيد نسبياً مقادير الازوت والماء المتوفرة في الاشجار ويساعد على انعقاد الأزهار المخصبة وخاصة في الاصناف المتوسطة الانتاج مثل رد ديليش (استاركن) .

التقليم وتكوين الدواير الثمرية - تتكون اكثر براعم التفاح على رؤوس الفروع الصغيرة او الدواير المعوجة والقليل منها ينمو على رؤوس الفروع الطويلة في بعض الاصناف ؛ وقلما تتكون البراعم الزهرية على جوانب الفروع . يستدل من هذا ان الدواير تشرع بالنمو من البراعم الخضرية الجانبية الموجودة في عنق الاوراق في السنة الاولى لنمو الفروع ؛ وفي السنة الثانية يبدأ النمو ايضاً من احد البراعم الخضرية الجانبية في الدواير نفسها ؛ ويسير النمو الخضري ملتويًا هكذا سنة بعد سنة ليكون الدواير الثمرية ولهذا تبدو قصيرة عوجاء . وتسير الدواير على هذه الحال سنوات كثيرة الى ان يصبح نموها في السنة الثامنة ضعيفاً لا يصلح لانتاج ثمار كبيرة وجيدة . وقد ثبت نقصان

عدد الثمار ووزنها وانخفاض جودتها على الدواير الضعيفة (١٢) . فاذا كان قطر الدواير ستة مليمترات يعدل انتاجه بثلاث ثمرات ضعيفة ، واذا كان قطره ثمانية مليمترات ينتج معدل ست ثمرات ، واذا وصل قطره الى سنتيمتر واحد ينتج عشر ثمرات .

وإذ تتوقف كثرة الانتاج على عدد الدواير وقوتها فعلى المزارع ان ينتبه لإزالة الضعيف منها ليفسح المجال لتكوين دواير جديدة . وينصح تشجيعاً لانتاج الدواير ان يخفف التقليم كثيراً حتى لا يتعدى ازالة الدواير القديمة او الضعيفة او بعض الفروع المعارضة او المريضة .

التقليم وطبائع نمو الاصناف وثمارها - لا بد من كلمة تحذير للمزارعين الحديثي العهد بالتقليم وهي ان يعرفوا طبائع نمو اصناف اشجار التفاح المتنوعة وثمارها إذا شاؤوا تفادي الخسارة المادية . فالصنف رد ديليش مثلاً يكون باغصانه زوايا ضيقة وضعيفة تستوجب ازالة بعضها لفتح الشجرة . وافضل طريقة لمعرفة طبيعة نمو الصنف هي ملاحظة نمو الاشجار القديمة المفروسة في ارض المزارعين المجاورين .


ويجب ان ينتبه المزارع الى كيفية انتاج الصنف للبراعم الزهرية . فصنفا جوناثان وكولدن ديليش مثلاً تتكون اكثر براعمها الزهرية على رؤوس دواير وفروع قصيرة ، وفي بعض الاحيان على جوانب الفروع القصيرة الحديثة التكوين ؛ وبهذه الطريقة الاخيرة يبدأ الصنف كولدن انتاجه فتكون ثماره في هذه الحال صغيرة . اما الصنف روم بيوتي (ملكة لبنان) فيكون عدداً كبيراً من البراعم الزهرية على رؤوس الفروع الطويلة بالاضافة الى الدواير . ويكون الصنف ماكتنوش معظم براعمه الزهرية على دواير قصيرة . فاذا لم ينتبه المزارع الى

هذا الامر فقد يزيل معظم البراعم الزهرية اثناء التقليم الشتوي وبذلك يخفض الانتاج كثيراً .

استعمال ادوات التقليم

ان اقصى ما يحتاج اليه المزارع لتقليم الاشجار هو مقص ومنشار وفي بعض الاحيان موسى خاصة بالتقليم وسلم خشبية او معدنية خفيفة بثلاث قوائم . والمهم في هذه الادوات ان تكون متينة ويسهل استبدال قطعها اذا بليت . اما فيما

يتعلق باستعمالها فكثيراً ما شوهذ المزارع يسيء اليها كأن يمك المقص بعكس اتجاهه الصحيح ، او ينشر الاغصان الكبيرة فتتسخ من ثقلها ، او لا يستعين بيده اليسرى عند اجراء القطع . والافضل ان تمسك المقص بيدك اليمنى بحيث يصبح نصله العريض باتجاه جسمك ، وامسك الفرع الذي ترغب في ازالته بيدك اليسرى وابدأ الضغط على المقص واحن الفرع باتجاه القطع لمساعدة المقص ؛ نجد هذه العملية ان قطع الاغصان يجري بسهولة وسرعة . لا تحن الفرع بسرعة



(مجامع)

الشكل رقم ١٤ - كيفية قطع الاغصان الكبيرة : لتجنب تسخ الاغصان الكبيرة اثناء قطعها يجب نشرها اولاً من الاسفل الى نصف قطرهما كما يبدو في (١) من الشكل اعلاه ثم تنشر من الاعلى كما في (٢) عند حلقات الاندمال لازالتها .

تريد عن سرعة سير المقص لثلا ينشق الفرع قبل اتمام عملية القطع . لا تقطع

بالمقص فروعاً غليظة او اغصاناً ، ولا تلوه بمنة ويسرة بغية ازالة غصن ما فسرعان ما يتلف .

يلجأ الى استخدام المنشار حين يتعذر قطع الاغصان بالمقص ؛ فالجرح الناشئ عن استعمال المنشار لا يندمل بسهولة . ولا تختلف عملية النشر عن القطع بالمقص الا في الاغصان الكبيرة جداً بحيث يمكن سقوطها وتفسخها قبل اتمام عملية النشر . ويجب في هذه الحال نشر نصف قطر الغصن من الاسفل في مكان يبعد ثلاثين سنتيمتراً عن موضع القطع المناسب ثم ينشر الغصن من الاعلى في المكان المناسب عند حلقات الاندمال حتى يتم القطع (الشكل رقم ١٤) .

لقد اعتاد البعض قطع الفرع او الغصن وابقاء جزء يسير منه في الشجرة

وهذا خطأ (الشكل رقم ١٥) . اذا شئت ازالة الفرع باكماله فقصه من منشأه وسط حلقات الاندمال (Callus Tissue) او الانسجة المولدة وذلك ليم اندماله باسرع ما يمكن قبل جفافه او لجوء الحشرات اليه (الشكل رقم ١٦) . لا تقص من وراء هذه الحلقات او امامها بمسافة كبيرة ، ففي هذه الحالة لا يندمل الجرح لابتعاده عن حلقات الاندمال او لاختفاء الانسجة المولدة .



(كاريك)

يجب طلي جميع الجروح الكبيرة بطلاء يعرف باسم لانولين (Lanolin) قبل مرور ساعة على احداث الجرح بغية اندماله بسرعة ومنع تسرب الامراض او الحشرات الى داخله . تفضل هذه المادة على غيرها


الشكل رقم ١٥ - النشر الخاطيء : لم يندمل الجرح بعد قطع الغصن لان القص جرى بعيداً عن حلقات الاندمال .

لانها تحول دون جفاف الطبقة المولدة للخلايا وعرقلة نموها بالتسمم كما تفعل المواد الاخرى المستعملة لهذا الغرض .

مواعيد التقليم

لا شك ان افضل موعد لتقليم الاشجار هو بعد دخولها دور الاستراحة وقبل خروجها من دور الرقاد ، وذلك في فصل الشتاء . فلا ينصح بالتقليم في فصل

الصيف لأنه يقصّر الاشجار جداً ، ويطيّل مدة النمو الحضرى كثيراً ، ويجول دون تكوين البراعم الزهرية ، ويؤخر نضج الفروع الحديثة ويضعف مقاومتها للصقيع الحريفى . لم يجد الخبراء اى فرق في النمو بين الاشجار المقلمة في آخر الحريف أو الشتاء . اما التقليم الحريفى قد يقصّر مدة الاستراحة في الاشجار ويرغمها على البدء بالنمو المبكر في الربيع فتتضرر . والافضل في المواقع المعرضة للصقيع المبكر والمتأخر ان تقلم الاشجار في اواسط الشتاء قبل جريان العصارة في الانسجة والبدء بالنمو (شباط) . اما اذا تأخر التقليم كثيراً فتتوزع العصارة ويضيع جزء كبير منها مع الفروع المقلمة .



(كاربك)

الشكل رقم ١٦ - النشر الصحيح : بدأت حلقات الاندمال تطبق على الجرح الذي نتج من نشر الفصن الغليظ في الموقع الصحيح .

طرق تربية اشجار التفاح

يمكن اتباع بضع طرق في تربية هيكل شجرة التفاح ، وافضلها طريقتان : الاولى تربية هيكل الاشجار على الشكل القدحى (Vase Form) ، والثانية تربية



(الن)

الشكل رقم ١٧ - هيكل قدحى : شجرة ماكتنوش في صيف السنة السادسة بعد غرسها . لاحظ قرب هيكلها من الارض ونسوي توزيع الاغصان الاساسية .

هيكل الاشجار على شكل شبه الملك (Modified Leader Form) .
تتبع تربية الاشجار على الشكل القدحي في الاقاليم المنخفضة او الدافئة او
التي تغلب فيها الرياح الموسمية اثناء موسم الاثمار، اذ يرغب في هذه الحال تكوين
هيكل متوسط الحجم ومنخفض . وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً في الشرق
الادنى لملاءمتها احوال البيئة في بعض الاقاليم، وهي سهلة التطبيق انما لا يُنصح
باتباعها دون تمييز وخاصة في مرتفعات لبنان الغربية . ومع ان هذا الهيكل
يكون اشجاراً لا يقل انتاجها عن الاشجار المكونة على طريقة شبه الملك فهو
اقل منه متانة واصغر حجماً . ومن ميزات الهيكل المعروف بشبه الملك انشاؤه
اغصاناً رئيسية قوية تتفرع من الساق بعيدة بعضها عن بعض مكونة زوايا
مفتوحة ومتينة جداً . بينما في الشكل القدحي تتفرع الاغصان الرئيسية من رأس
الساق متقاربة بعضها من بعض وتكون غالباً زوايا ضيقة تجعلها عرضة للتفسخ في
حال الانتاج الغزير، فاذا سقط احد الفروع الثلاثة الرئيسية ضاع ثلث الشجرة .

تربية اشجار التفاح الحديثة

ان القصد من تقليم اشجار التفاح الحديثة النمو بين السنة الاولى والسنة
الخامسة من بعد الغرس هو اولاً تكوين هيكل متين يلائم احوال البيئة
الطبيعية ؛ وثانياً اعداد ذلك الهيكل تدريجياً لانتاج الثمار . يستدل من هذا ان
فترة السنوات الخمس الاولى يجب ان تتميز بنمو خضري تستكمل اثناءه الشجرة
تكوين هيكلها ، ولا يُرغب في تشجيع انتاج الثمار الا في المدة الاخيرة .

تربية الهيكل القدحي - قص رأس المطعوم بعد غرسه مباشرة على ارتفاع
يتراوح بين ٦٠ - ٦٥ سم عن سطح التراب وازل جميع البراعم المنخفضة الى
ارتفاع ٣٠ سم . وبعد سنة نمو اي في الشتاء الثاني انتخب ثلاثة فروع قوية
موزعة بالتساوي على ساق الشجرة لتكون الهيكل . قص كلاً منها بالتساوي



(الن)

الشكل رقم ١٨ - هيكل شبه الملك : شجرة استاركن في سنتها الثامنة . لاحظ ارتفاع الاغصان
الاساسية الثلاثة بالنسبة للرجل الواقف ، وتوزيعها السليم ، وزواياها المفتوحة ،
ووضع غصن شبه الملك في اعلاها .

على بعد ٤٠ سم من منشأها على الساق وازل ما تبقى من الاغصان؛ وفي حال ضعف نمو الشجرة يجب ان تقلم تقليماً جائراً كما تفعل في السنة الاولى لتقويتها . تصبح الشجرة بانتهاء نمو السنة الثانية بثلاثة اغصان رئيسية يتفرع من كل منها عدد من الفروع القوية المتساوية النمو تقريباً . وهذه نقطة ضعف في تربية الهيكل القديحي لتوزيعها الاغصان الثلاثة غالباً من موضع ضيق على الساق ، ولنموها باحجام متساوية . ربّ في الشتاء الثالث من الزرع غصنين على كل من الاغصان الرئيسية الثلاثة وازل الباقي . فاذا تفرع من احد الاغصان الرئيسية ثلاثة فروع ثانوية يزال المتوسط منها ويقصر الاثنان الباقيان الى طول ٤٠ - ٥٠ سم من منشأها شرط ان تقلم الاغصان الرئيسية والثانوية بطول متساوٍ لثلاث فروع احدها على الآخر ؛ ويخفف التقليم الجائر بعد اتمام نمو السنة الثالثة اي في الشتاء الرابع بحيث لا يتعدى ازالة الاغصان المعارضة والفروع الكثيرة الانخفاض ، وتقصر رؤوس الفروع المتشعبة من الاغصان الثانوية الى ثلثي طولها .

تأخذ الشجرة بانتهاء نمو السنة الرابعة شكلاً قديحياً (الشكل رقم ١٧) يمكن معه بعدئذ مسانرة طبيعة نمو ذلك الصنف . لا يرغب في هذه السنة تشجيع تكوين الدوائر الثمرية لان ذلك يحول دون استمرار النمو الحضري واطمئنان تكوين الهيكل ويعمل على تقصير الاشجار . وفي الشتاء الخامس ، اي بعد اتمام نمو اربع سنوات ، يعمل على ابقاء قلب الشجرة مفتوحاً بازالة الفروع الكبيرة المعارضة وخاصة في الاصناف التي تنمو بطبيعتها نمواً افقياً كثيفاً . ويستكمل الشكل الكروي المنخفض بارجاع رؤوس الفروع بالتساوي في جميع انحاء الشجرة ، كما تشجع في السنة الخامسة تربية الفروع والدوائر الثمرية باجراء تخفيف بسيط جداً كأن تقص رؤوس الفروع الصغيرة والنامية داخل الشجرة (الشكل رقم ٢٠) . ولا يجري تقليم بالمعنى الصحيح في السنة السادسة



الشكل رقم ١٩ - شجرة كولدن ديبشس في عامها الخامس قبل التقليم . لاحظ ان وضع الفروع الرئيسية خاطيء لانها تنوزع من موضع ضيق على الساق . (الن)

لتشجيع الاشجار على تكوين البراعم الزهرية ، فقلة التقليم تزيد هذه الامكانية باضعاف النمو الحضري .

تربية هيكل شبه الملك - ان هذا الهيكل اقرب الى الهيكل الطبيعي في اشجار التفاح ، ويختلف عن سابقه بابقاء غصن كبير في وسط الشجرة لمدة معينة ، ويزال بعد الفراغ من تكوين الهيكل ، واليك تفاصيل تربيته :


السنة الاولى - يشترط ان يكون حجم المطعوم المغروس للتربية كبيراً لا يقل قطره عن خمسة عشر مليمترآ وارتفاعه عن متر ونصف المتر. قص رأس المطعوم بعد غرسه مباشرة بارتفاع يتراوح بين ٨٥ - ٩٠ سم عن سطح الارض . لا تزال اي فرع من الفروع النامية اثناء فصل الصيف الا اذا كان نمو المطعوم قوياً جداً فيمكن ازالة الفروع الضعيفة جداً وابقاء ستة فروع قوية موزعة على جميع جوانب الشجرة وذلك بعد بدء النمو بشهر واحد على الاكثر.

السنة الثانية - في الشتاء الثاني الذي يلي الغرس انتخب اربعة اغصان قوية تتوزع من الساق في جميع الجهات بالتساوي على ان يبعد الفرع عن الآخر ١٥ سم او اكثر مكوناً مع الساق زوايا مفتوحة (الشكل رقم ١٨) ، لان الغصن ذا الزوايا الضيقة (الشكل رقم ٢٠ ب) لا يحتمل ثقل الانتاج الغزير لضعف التحامه (١٣) . انتخب الغصن الاعلى على الساق ليصبح شبه ملك وقص رأسه تحت البرعم الرئيسي مباشرة. واذا اخفق هذا الغصن في قيادة النمو لضعفه فيجب ان توجد بدلاً منه في السنة التالية. قص كلاً من الاغصان الرئيسية الثلاثة المراد تربيتها بطول يختلف عن الآخر لايجاد نمو متباين او غير متساوٍ بين الاغصان الرئيسية واطعف من شبه الملك . لا تقصر هذه الاغصان اقل من ٣٠ سم ولا تعبت بالشجرة في الصيف ، وشجع نموها القوي بالتعهد الصحيح من تسميد وسقي وحرث ورش بالمواد الواقية .



(الن)
الشكل رقم ٢٠ - الشجرة عينها في الشكل رقم ١٩ بعد اتمام عملية التقليم . لاحظ ان التقليم خفيف وذلك تشجيعاً لبدء تكوين البراعم الزهرية وانتاج الثمار .

السنة الثالثة - لا تقلم شبه الملك في الشتاء الثالث تقليماً عنيماً ليتمكن من مواصلة نموه القوي . ازل جميع الفروع الصغيرة المزاحمة لشبه الملك وخاصة الفروع المكونة زوايا ضيقة وغوياً ضعيفاً . شجع نمو غصن قوي في وسط شبه الملك مفتوحة زاويته ومتجهاً للخارج وذلك بتركه دون تقليم، وابقِ بالإضافة



(عن تشاندلر بنصرف)

الشكل رقم ٢٠ ب - الفرق في التركيب بين زاوية غصن مفتوحة واخرى ضيقة : مقطع طولي لساق شجرة تفاح في موقع توزيع الاغصان الاساسية بين الفرق في التركيب بين زاوية ضيقة واخرى مفتوحة . فالغصن الى اليمين ضعيف التركيب لان ضيق زاويته لم يسمح بتشابك الخلايا والتحامها الطبيعي مع الساق ؛ قابلها بالزاوية المفتوحة التي يكونها الغصن الى اليسار حيث يظهر بوضوح تشابك الخلايا سنة تلو الاخرى واتصالها السليم بالساق .

فرعين او ثلاثة فروع موزعة بالتساوي على شبه الملك وقص رؤوسها بقبايس مختلفة . ازل جميع الفروع النامية حديثاً على الساق لكي لا تراحم الاغصان

الاساسية . يجب تقليم رؤوس الاغصان الثانوية النامية على الاغصان الرئيسية في الهيكل فيبقى ثلثاها وتزال عنها الفروع الفائضة ويبقى لا اكثر من اثنين للتربية . ويصبح الهيكل مكوناً من الساق وعليه اربعة او خمسة اغصان اساسية موزعة بالتساوي بنمو متباين وعلى كل منها فرعان او ثلاثة وفي وسط هذه الكأس الى الاعلى ومنحرفاً الى احد الجوانب يرتكز شبه الملك وعليه غصن ثانوي قوي وفرعان او ثلاثة يتجه كل منها الى ناحية من الشجرة ويكون الجميع شكلاً هرمياً . السنان الرابعة والخامسة - خفف التقليم في السنة الرابعة حتى لا يتعدى ازالة الفروع المعارضة واترك الشجرة مفتوحة لاشعة الشمس . لا تقص الفروع القصيرة لتشجيعها على تكوين البراعم الزهرية . يخفف التقليم في السنة الخامسة ولا يتعدى ارجاع شبه الملك بقصه الى الغصن الثانوي الذي شجعت تربيته في السنة الثالثة وذلك لفتح داخل الشجرة وابقائها منخفضة اذ يفضل ان لا يزيد ارتفاعها في اية حال على ثلاثة امتار ونصف المتر . ازل أكثر الثمار عن الاشجار في السنين الرابعة والخامسة بعد الانعقاد مباشرة . لا يختلف التقليم من الآن فصاعداً في هذا الهيكل عن سابقه لان الشجرة توشك ان تدخل دور الاثمار .

تقليم اشجار التفاح المشمورة

ان افضل ما يمكن عمله لتشجيع الاثمار عند بلوغ شجرة التفاح السنة السادسة هو تركها بدون تقليم ، او تقييد التقليم بتخفيف بسيط كأن تزال رؤوس الفروع الداخلية او الفروع المعارضة والضعيفة . تتروك الاشجار على هذه الحال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتستكمل نمو دوابرها الثمرية ومن ثم يشرع المزارع بحفظ التوازن بين النمو الخضري والبراعم الثمرية بالتقليم الخفيف جداً كازالة الدوابر الضعيفة القديمة البالغ عمرها أكثر من ثماني سنوات لتجديدها . والى ان تبلغ الشجرة من العمر السنة الخامسة عشرة لا يستحسن اجراء اكثر

من تقليم خفيف بازالة بعض الفروع والاعضان لفتح الشجرة لانها اثناء هذه الفترة وخاصة عند بلوغها السنة العاشرة تبدأ فيها فترة من النمو لكسب حجم أكبر .

يلجأ المزارع بعد السنة الخامسة عشرة الى ازالة بعض الفروع الكبيرة والأغصان المرتفعة لحفض ارتفاع الشجرة وتجديد اجزائها لكي لا تهرم بسرعة ، ويستمر استبدال الأجزاء القديمة فيها بمقدار ما تنتجه من الاجزاء الحديثة لحفظ التوازن بين النمو والاثمار الى ان تبلغ الشجرة الخامسة والعشرين من عمرها (اي مدة عشر سنوات) . يجب حينئذ اجراء عملية تقليم جائرة بطريقة تدريجية لاستبدال الاعضان الكبيرة بنمو حديث وبتجديد حياة الشجرة . ومتى بلغت الخامسة والثلاثين أو الاربعين من عمرها يحسن قلعها .

اعلم دائماً أن التقليم الجائر لا يقصر الشجرة فحسب بل يخل بالتوازن بين النمو الحضري والاثمار ويقلل الانتاج . فيلجأ المزارع الى هذا التقليم فقط لتكوين هيكل الشجرة او تجديد حياتها بعد ان تهرم . ان افضل الاشجار إثماراً ما كانت منخفضة ومنتشرة افقيّاً على شكل دائرة لا تتلامس اغصانها مع الاشجار المجاورة على ان يبقى داخلها مفتوحاً حتى لا يوجب النمو الكثيف اشعة الشمس عنه وخاصة الاجزاء الموجودة في الجهة الشمالية من الشجرة .

الفصل الخامس عشر

تخفيف الثمار

سقوط الثمار الطبيعي

ان انتاج الثمار الغزير بانتظام لعمل مجهد جداً لقوى الاشجار لاستهلاكه مقداراً كبيراً من الاغذية المجهزة في الاوراق فلا يفيض الا القليل لاستخدامه في تقوية النمو الحضري . فاذا عجزت الشجرة عن تامين اجزائها بالمقادير الضرورية لجأت الى تخفيف ثمارها بالطرق الطبيعية كي لا يهزل جسمها ويتعرض للاصابة بالامراض والحشرات الفتاكة والزوال السريع . ويهدف تخفيف الثمار الى توزيع قوى الشجرة بالتساوي لتنظيم الاثمار وملافاة الضرر بالاشجار .

تشاهد أشجار التفاح أحياناً في موسم الازهار كأنها حلة بيضاء، ولو أخصبت جميع ازهارها وتحولت الى ثمار هلكت الشجرة في سنوات قليلة اذ يكفي اخصاب ١٥٪ من الازهار لانتاج الثمار الغزيرة جداً والتي يجب سقوطها او ازالة بعضها لاستمرار النمو الطبيعي اعواماً كثيرة . ويرجع السبب في سقوط الازهار والثمار الحديثة التكوين الى عوامل طبيعية عديدة . اولاً : تنفتح البراعم وقد تولد بعض الازهار ميتة لعدم حصولها على مقادير كافية من البرد في الشتاء الذي سبق إزهارها (راجع الفصل الثالث) . ثانياً : ان سبب سقوط اكثر الثمار بعد الانعقاد مباشرة هو عدم اكتمال الاخصاب في بويضاتها فنسقط

افواجاً ؛ فثمار الفوج الاول تسقط لانها لم تخصب قط ، وتحتوي الثمار التي تليها في السقوط على بويضة واحدة مخصبة، ثم تسقط الثمار المحتوية على بويضتين مخصبتين ثم ذات الثلاث بويضات . وقد تسقط الثمار ايضاً لانتلاف بويضاتها من عمل الحشرات فينتج من ذلك نقصان في المواد الهورمونية التي تنتجها البويضات المخصبة والضرورية لبقاء الثمار معلقة على الاشجار . ثالثاً : يلي السقوط الاول من الثمار ببضعة ايام سقوط طبيعي ناتج من تساقط الثمار في الحصول على المواد الغذائية والمنبهات الضرورية للنمو. وتعتبر هذه الظاهرة محاولة طبيعية من الشجرة لتخفيف ما لا تستطيع تغذيته من الثمار . ولذلك يعمل جميع ما يسبب نقصان الماء وخاصة في ايام القيظ الشديد او الرياح الحسينية في الربيع ، أو انعدام عنصر الازوت لقلته في التربة الخفيفة او الطينية الرديئة الانصراف على ارتفاع نسبة سقوط الثمار (راجع كيفية ملافاة هذا السقوط في الفصل الثامن عشر) .

اهداف تخفيف الثمار والازهار

تهدف عملية تخفيف الثمار بالطبيعة او باليد الى ازالة ما لا تستطيع الاشجار تغذيته وانماه . فيلجأ المزارع الى هذه الوسيلة للقضاء على الاثمار غير المنتظم (الدوري) في بعض الاصناف وللحصول على ثمار ذات حجم اكبر وطعم أذ ولون افضل ؛ كما يساعد تخفيف الثمار على تنشيط النمو الخضري ويخفف خطر تكسر الاغصان الكبيرة المثقلة بالثمار، ويرفع نسبة الثمار الصالحة للاسواق بإيصال مواد الرش الى جميع اجزائها ووقايتها من فتك الحشرات .

مواعيد تخفيف الثمار

تختلف مواعيد تخفيف الثمار تبعاً للاصناف . فيفضل أن تخفف ثمار الاصناف المبكرة النضج قبل السقوط الثاني المعروف بسقوط حزيران (June Drop) . اما

الاصناف المتأخرة النضج فيفضل تخفيفها بعد السقوط الثاني على ان لا يتعدى تاريخ التخفيف ثلاثين يوماً اعتباراً من ميعاد الإزهار الكامل لما في ذلك من خسارة في حجم الثمر ووزنه وضياح الوقت المناسب لانتاج البواعم الزهرية لتزايد الطلب على المادة الهورمونية بازدياد حجم الثمار . اما اذا كان القصد من تخفيف الثمار هو تنظيم الانتاج من سنة الى اخرى والمحافظة على التوازن بين النمو الخضري والثمار فمن الافضل اجراؤه مبكراً حتى ان البعض يفضل القيام بهذه العملية اثناء الإزهار بتعطيل بعض الأزهار عن طريق رشها بالمواد الكيماوية القلوية كما يبدو بالتفصيل في مكان آخر .

نسبة التخفيف


يخفف تخفيف الثمار في جميع حالاته واهدافه مجموع وزن المحصول، ويتوقف مقدار الخسارة في الوزن على درجة التخفيف. لذلك يجب ان ينظر الى التخفيف بعين الحذر وان يقوم به من كانت خبرته واسعة به . ويتوقف مقدار تخفيف الثمار على عمر الشجرة وصفها وقوة نموها وغزارة انتاجها ووفرة المواد الغذائية، وعلى قوة نمو كل غصن او فرع او دابر من الدوابر المراد تخفيف الثمار عنها . ولا يتسع المقام للتوسع في شرح هذا العمل هنا، انما يجب ان تركز نسبة الثمار المخففة على قاعدة قومية (الشكل رقم ٢١) . وذكرنا سابقاً وجوب إيجاد معدل ثلاثين ورقة لكل ثمرة من التفاح ، ولتقدير تطبيق هذا العمل اقترح البعض تخفيف الثمار على مسافة منظمة بين الثمرة والاخرى (Uniform Space) فيسهل العمل وتقل النفقات . ولانه لا يمكن ازالة كثير من الثمار الضعيفة بهذه الطريقة فتصبح النتيجة على عكس المرغوب يفضل تخفيف الثمار بالنسبة لما يستطيع كل فرع ان ينتجه على أن تعين المسافة بين الثمار بالنسبة للسنف والعمر وقوة نمو الاغصان والفروع والدوابر كأساس للتخفيف ؛ وتعرف هذه الطريقة بالمسافة المدرجة

(Graduated Space) (١٤) . ويفضل بموجب هذه الطريقة ازالة جميع الدوابر الضعيفة في ميعاد التقليم الشتوي . وفي الربيع تزال الثمار الضعيفة والمصابة والمشوهة ثم تحدد المسافة بين الثمار المتبقية من ١٥ - ٢٠ سم اذا لزم التخفيف على ان لا يبقى اكثر من ثمرتين في كل عنقود على الدابر الواحد ؛ وبقاء ثمرة واحدة هو افضل . كما يمكن تخفيض هذه المسافة بين الثمار في الفروع القوية الى عشرة سنتيمترات. وينصح ان لا يخفف اكثر من ثلث المحصول الغزير جداً وربع المحصول الغزير او اقل ويتوقف ذلك على حالة نمو الشجرة .


اساليب تخفيف الثمار وكيفيةها

لقد ذكرت في سياق البحث عدة طرق لتخفيف الثمار عن الاشجار . منها تقليم الدوابر والفروع الضعيفة في فصل الشتاء، وهي افضل وأوفر اساليب انتاج الثمار الجيدة وتنظيم توزيع انتاجها لكنها لا تكفي لتبديل عادة الانتاج الدوري غير المنتظم المستفحل في بعض الاصناف مثل اسنار كن .

ولقد توصل العلم حديثاً الى طريقة عملية أسهل من اقل نفقة من طريقة تخفيف الثمار باليد بتخفيف انعقاد الأزهار عن طريق تعطيلها في المواسم الكثيرة الازهار بالمواد القلوية . ولهذه الطريقة تأثيرها الكلي في الاثمار غير المنتظم او الدوري وتنظيم انتاج البراعم الزهرية سنة بعد اخرى لانها تحدد مقادير المحصول قبل عقد الثمار فلا تخسر الشجرة الغذاء والمادة الهورمونية التي تضع غالباً في الثمار المخففة بعد نموها بثلاثين يوماً أو أكثر. ترش الاشجار بعد اكتمال إزهارها وبدء سقوط التويجات بالمواد القلوية كمادة الكيتول (Elgetol) لتبطل عملية الاخصاب في بعض الازهار وتقل نسبة العقد فيعتدل المحصول وتوفر الأغذية الضرورية لانتاج البراعم الزهرية في ذلك الربيع . وبما ان هذا العمل خطر على الاثمار ودقيق في تفاصيله فلا ينصح المزارعون باللجوء الى استعماله



(٢)



(٣)

(كاستون ورجس)

الشكل رقم ٢١ - تخفيف الثمار : يجب تخفيف ثمار اشجار التفاح الغزيرة الانتاج لتحسين حجمها ولونها وطعمها . في (١) شجرة تفاح غير مخففة، وفي (٢) الشجرة نفسها مخففة من الخارج بطريقة المسافة المدرجة، وفي (٣) التخفيف من الداخل . لاحظ نسبة التخفيف .

بدون اشراف الخبراء لان لكل صنف موعداً ومقادير ومواسم خاصة لاستخدام هذه الطريقة (١٥) و (١٧) .

يجب ان يعمل بتخفيف الثمار باليد بانتهاء الدور الثاني من سقوط الثمار (في اوائل حزيران ؟) فقط في حالات الاثمار الغزير جداً او في حالة ضعف الاشجار لتقدم عمرها او لأسباب ناشئة عن سوء التغذية . وأفضل أسلوب للتخفيف هو معرفة نوع الثمار الواجب ازالتها والاماكن الواجب اجراء التخفيف فيها . فعلى المزارع ان يزيل أولاً جميع الثمار المصابة بالامراض والحشرات والمشوهة بسبب الاعراض الطبيعية ؛ ومن ثم يعمل على ازالة الثمار الضعيفة والناقصة الاخصاب كما يتبين من شكلها الذي يظهر من احد جانبي الثمرة غير كامل التكوين ، على ان لا يترك اكثر من ثمرتين في العنقود على الدابر والافضل ابقاء ثمرة واحدة . وبقليل من الانتباه يصبح المزارع بوقت يسير خبيراً بالثمار الواجب ابقاؤها لكي تكتمل فيها مظاهر القوة والنجاح .

يبدأ بعملية تخفيف الثمار داخل الشجرة اولاً فيزال المصاب منها والضعيف بوفرة ، ومن ثم يعتلي العامل الشجرة من داخلها وي طرح من اعلاها القليل من الثمار غير المرغوب فيها ، وبعدئذ يطوف على جوانبها من الخارج لتفريد الرديء والمصاب فتصبح اكثر الثمار خارج الشجرة نامية على اطرافها السفلى والقليل منها في الداخل . يجري التخفيف باليد او بمقص خصوصي معد لقطف الثمار .

مراجع الباب الثالث

- ١ ف . ر . كاردنر وف . س . برادفورد و . ه . و . هووكر - مبادئ انتاج الثمار - كتاب - ١٩٣٩ .
- ٢ . ه . كورلي وف . س . هوليت - الطرق الحديثة لانتاج الثمار - كتاب - ١٩٤١ .
- ٣ . تشاندلر - بساتين الاشجار المتساقطة الاوراق - كتاب - سنة ١٩٤٧ .
- ٤ ت . ن . هولدين وو . ا . بين - تجارب استخدام روث الحيوانات في تسميد التفاح . مجلة محطة تجارب ايدست مولنج «انكلترا» ص ٥٩ - ٨٥ من التقرير السنوي لسنة ١٩٣٩ .
- ٥ ف . ا . تايد جنس وم . ا . بليك - العوامل المؤثرة في استعمال الازوت من مصدري التترات والامونيا بواسطة اشجار التفاح - مجلة محطة التجارب الزراعية في نيو جرزي رقم ٥٤٧ - سنة ١٩٣٢ .
- ٦ و . تامس و . ب . ماك - مراقبة تغذية المحاصيل عن طريق تشخيص اعراض الاوراق . مجلة محطة التجارب الزراعية في بنسلفانيا رقم ٣٧٨ سنة ١٩٣٩ .
- ٧ ل . ه . داي - اصول التفاح والفرجل والكمثري في كاليفورنيا - مجلة محطة التجارب الزراعية ، جامعة كاليفورنيا رقم ٧٠٠ ، ايار سنة ١٩٤٧ .
- ٨ ج . ل . شلتر و . ه . و . ريتشي - زراعة الاشجار المثمرة كتاب - ١٩٤٠ .
- ٩ ف . س . هوليت و . ر . براد فيلد - اجاث في سقاية اشجار التفاح - نشرة الاشجار المثمرة . محطة التجارب الزراعية في اوهايو رقم ٥٤ سنة ١٩٣٨ .
- ١٠ ف . ج . فيمير وا . ه . هيندر كسن - اصول سقاية وتمهد البساتين - نشرة محطة التجارب الزراعية في كاليفورنيا رقم ٥٠ - ١٩٣٦ .
- ١١ ل . ل . كليبول - سقاية اشجار التفاح بطريقة الاثلام - وقائع جمعية الاشجار المثمرة في ولاية واشنطن سنة ١٩٣٢ .
- ١٢ س . و . النوود وج . ه . كورلي - مقارنة بين عدم التقليم والتقليم الخفيف والجائر في التفاح . مجلة محطة التجارب الزراعية في اوهايو رقم ٢٣ سنة ١٩٣٨ .
- ١٣ ل . ب . بانجر - تأثير طريقة التقليم على تكوين زوايا الاغصان في اشجار التفاح الحديثة . وقائع جمعية الاشجار المثمرة العلمية ص ٣٦ - ٣٨ مجلد رقم ٣٣ سنة ١٩٣٦ .
- ١٤ ه . ب . كاستون وج . ل . ريكس - طريقة توزيع الالباد في تخفيف الثمار - مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة ولاية ميشيغن - رقم ٢٨١ - سنة ١٩٣٧ .

- ١٥ ل. فيرنزول. ف. فرنكلين - تخفيف ثمار التفاح والذرايق برش ازهارها . جامعة ايداهو -
موسكو، ايداهو. النشرة الفنية المأخوذة عن وقائع جمعية الاشجار المثمرة في ولاية واشنطن
مجلد ٤٥ صفحة ١٧٤ - ١٨٢ سنة ١٩٤٩ . وكذلك نشرة الارشاد رقم ١٠٩ لجامعة
ايداهو سنة ١٩٥٠ .
- ١٦ و. و. بوكم - تطور نمو جذور اشجار رد ديلشس الحديثة وتأثير التربة ونوع التمهيد - مجلة
الابحاث العلمية لمحطة التجارب الزراعية في نبراسكار رقم ٩٥ سنة ١٩٣٧ .
- ١٧ ل. ب. بانجر و م. ب. هوفمان : تخفيف الثمار بالمواد الكيماوية - نشرة دائرة الزراعة العامة
الاميركية واشنطن رقم ٨٦ اذار سنة ١٩٥١ .

الباب الرابع

تعهد ثمار التفاح

لا مندوحة من التعرف الى طرق تعهد ثمار التفاح الحديثة اذا رغب المزارع
مسايرة التطور الاقتصادي العالمي وبيع ثماره بربح وافرة ؛ وسيشرح هذا
البحث كيفية تكوين ثمار التفاح ومراحل نموها ونضجها كأساس لفهم سيرة
حياتها وبالتالي للتعرف الى افضل اساليب القطف والتوضيب والتعبئة والتبريد.
يفرض المستهلكون والاسواق التجارية والحكومات على المزارع قيوداً
وشروطاً وانظمة يتوجب عليه الاعتراف بها والعمل على تطبيقها اذا رغب النجاح،
فلا يسعه بعد الآن مثلاً ان يبيع سوى الاصناف التي يرغب فيها المستهلكون،
موضبة بالطرق التي تتطلبها الاسواق التجارية، وذلك تبعاً للانظمة والقوانين
الحكومية . فهل يستطيع المزارع بيع ثماره في الاسواق التجارية العالمية
دون تنظيفها من السموم القتالة، وتعبئتها في صناديق غير الصندوق الموحد
وباسلوب مخالف للانظمة التجارية والقوانين الحكومية ؟ سنبحث هذه الامور
جميعاً باسهاب وتفصيل على ضوء العلم الحديث حياً بمصلحة المزارع، وشركات
التصدير، واصحاب البرادات، فنطلعهم على احدث التطورات في هذا الميدان
الحيوي .

الفصل السادس عشر


تكون ثمار التفاح

اختلف العلماء في حقيقة تكون ثمرة التفاح ؛ فاعتقد بعضهم انها تتكون بانتفاخ رأس الحامل (العنق) في نقطة اتصاله بالزهرة ، اي ان الثمار تشبه في تركيبها الحشب الذي يكون الساق، وتعرف هذه بالنظرية الساقية (Receptacular Theory). ويميل البعض الآخر الى اعتبار ثمرة التفاح جزءاً من الزهرة فهي تتكون من التحام الاجزاء السفلى لاعضاء التناسل بعضها ببعض (الكأس والتويج والميسم والمتاع) مكونة كأساً تتوسطها الامتعة الخمسة (الشكل رقم ١) ، وليس انتفاخ تلك الكأس الا نتيجة للاخصاب وافراز المواد المنبهة الضرورية لتكوين الثمرة ، وتعرف هذه بالنظرية العضوية (Appendicular Theory) وهي الاصح . وهذه الحقيقة على جانب كبير من الاهمية من الوجهة العملية وخاصة في ما يتعلق بحفظ الثمار اذ يسبب اختلاف التركيب الطبيعي والكياوي في الاعضاء التناسلية تبايناً في مسلكها في البراد (١) .

نمو ثمار التفاح - يبدأ نمو الثمار حين اخصاب البويضات في الزهرة ، وقد تبين ان الاخصاب امر ضروري لانتاج بعض انواع المنبهات (Hormones) الدافعة لانتفاخ الكأس المكونة من التحام النصف الاسفل من اجزاء الزهرة بعضها

ببعض . وهكذا يتوقف استمرار نمو الثمرة وعدم سقوطها الطبيعي واكتمال تكون شكلها ولونها وطعمها على نسبة نجاح عملية الاخصاب ، او عدد البذور المخصبة ، وبالتالي على مقدار المنبهات المنتجة . ومن الادلة القاطعة على اهمية المنبهات التي تنتجها البذور المخصبة في اكتمال نمو الثمار ان جانب الثمرة الذي لا ينجح فيه اخصاب البذور لا يكتمل نموه فيما بعد وبذلك يتشوه شكل الثمار ولونها ويبتذل طعمها (الشكل رقم ٢٢) .

يتم نمو ثمار التفاح على مرحلتين : فالمرحلة الاولى تبدأ بعد اكتمال الاخصاب بانقسام الخلايا، ويستمر هذا الانقسام لمدة تقرب من ستة اسابيع . غير انه بانتهاء فترة انقسام الخلايا تبتدىء المرحلة الثانية من نمو الثمار باكتسابها الحجم والشكل الطبيعيين اللذين يختص بهما



(بمعنى) الصنف من قبل تمدد الخلايا او الشكل رقم ٢٢ - اهمية اخصاب البذور في اكتمال شكل الثمار الطبيعي : ثمرة تفاح لم ينجح اخصاب بويضات الجانب الايمن فيها فلم تتكون فيه البذور ولم يكتمل شكله . اهمية المناخ الملائم ووفرة الاغذية وطول موسم النمو في اكتمال انقسام الخلايا وشكل الثمار ولونها وطعمها الطبيعي. وخلافاً لما ذكر فقد تصاب الثمار اثناء هذه المرحلة باعراض طبيعية سببها ارتفاع درجة الحرارة او انخفاضها الكلي مما يدعو الى تقصير مدة حفظها في البراد وجعلها غير صالحة للاكل ، وسيأتي بحثها فيما بعد .

نضج ثمار التفاح - يكتمل تكوين الثمرة بانتهاج مرحلة تمدد الخلايا، وتحتوي اغلبية لبها على خلايا برونشيمية صغيرة بالقرب من القشرة وكبيرة الى الداخل مملوءة بالعصارة والمواد الغذائية، وتلتصق اطراف جدرانها بمادة البروتوبلاكتين الصلبة، ويفصل الخلايا بعضها عن بعض فراغات خلوية يختلف حجمها تبعاً لدرجة النمو وحالته، وهي ضرورية لتبادل الغازات اثناء عملية تنفس الثمار.

تحصل الثمرة على جميع موادها الغذائية من الاوراق المجاورة لها او من الاوراق النامية على الفروع القريبة منها. ولكنها لا تتغذى من اوراق نامية على الجانب الآخر من الشجرة (٢). ويكثر تخزين المواد النشوية في المرحلة الثانية فيبدأ تجمعها في الخلايا الخارجية ويتابع ازديادها في الخلايا تدريجياً الى الداخل حتى تكوّن لا اقل من ٤٪ من وزن الثمرة قبل نضجها بشهر واحد. وجدير بالذكر انه لدى اكتمال تمدد الخلايا وانتهاء فترة تخزين المواد الغذائية تتكون عند عنق الثمرة حلقة انفصال تمنع دخول الماء والمواد الغذائية اليها من الاوراق. ويتعذر بعدئذ على الثمرة ان تكتسب حجماً او تصلح ما قد يتفجر من خلايا. وتحصل الثمرة على الحرارة الضرورية لاعمالها الحيوية من تحلل المواد النشوية بمساعدة التنفس الطبيعي وذلك بامتصاص غاز الاوكسجين واخراج غاز ثاني اوكسيد الكربون تماماً كما يجري في جسم الانسان. وتعتبر سرعة هذا التنفس مقياساً هاماً في تحديد حياة الثمرة. اما بعد حدوث الانفصال الطبيعي فتتخف سرعة التنفس تدريجياً الى ان تبلغ الثمرة اول درجة في النضج وهي ما تزال على الشجرة او بعد قطفها. ثم يلاحظ ان سرعة التنفس تأخذ فجأة بالازدياد إذ طرأ على حياة الثمرة تبديل طبيعي وكيمائي فبدأت بالنضج بتحول النشاء الى سكر تدريجياً من داخل الثمرة الى خارجها، وبتحول البروتوبلاكتين الى مادة البلاكتين، فتصبح جدران الخلايا رقيقة جداً وتضيق الفراغات بينها فتزداد

الثمرة ليناً ويتغير لونها من الاخضر القاتم الى الاصفر وتقل نسبة حموضتها. وتعرف هذه الفترة من حياة الثمرة بـ « ذروة الحيوية » (Climacteric). ويلبها فترة هبوط في سرعة التنفس عندما تأخذ الثمرة تدريجياً في الانحلال فيتحول السكر الى ماء وغاز وتموت الثمرة موتاً طبيعياً اذا لم تعثرها الامراض الفطرية او الاعراض الطبيعية.

والقشرة واللون والفجوة والعنق والحوض والكأس والصدأ .

الشكل : يتغير شكل الصنف من اقليم الى آخر بتأثير المناخ او الري فيكون اكثر استطالة في المناطق الباردة الملائمة له في الاسبوع الستة الاولى من زمن النمو (٢) و (٣). ويوصف شكل ثمار التفاح بالاسماء الآتية : مستدير، ومستدير مخروطي، ومستدير مفلطح، ومستدير مستطيل، ومستطيل، ومستطيل مخروطي، ومخروطي، ومفلطح مخروطي، ومفلطح (الشكل ٢٣) . ولهذه الاشكال اهمية كبرى في توضيب الثمار ونظام تعبئتها في الصناديق .

الحجم : بينما يتأثر حجم ثمار الصنف بالوراثة والبيئة وطرق التعهد وجد ان وفرة المنبهات المنتجة في الاوراق وبالتالي مساحة الاوراق هي عامل مباشر في تحديد حجم الثمار. اما في ما يتعلق بكيفية تعبئة الثمار في الصناديق فقد حددت جمعية الاشجار الاميركية قطر الاصناف كما هو مبين في الجدول الخامس .

الجدول الخامس - اصناف التفاح وقطر ثمارها المعترف به من قبل جمعية الاشجار الاميركية (٤)

الصف	قطر الثمار ملم	الصف	قطر الثمار ملم
استار كن ديليش	٧٣ - ٨٢	بلونيوت	٨٠ - ٨٦
جوناثان	٦٩ - ٧٦	بن ديفيس	٦٩ - ٨٢
ماكتوش	٧٠ - ٨٨	كيج ديفيد	٦٩ - ٨٢
وايناب	٦٩ - ٧٦	ونتر بنانا	٨٠ - ٨٨
نورثرن اسباي	٨٠ - ٨٨	كولدن ديليش	٧٨ - ٨٨

القشرة : تتكون قشرة ثمار التفاح من ثلاث طبقات من الخلايا الخارجية، وهي الطبقة الجلدية المحتوية على مادة الكيتين الذي يتولد في الطبقة الثانية ويعمل على منع نتح الماء من الثمار؛ ويغشي هذه الطبقة الشمع الذي تفرزه


الفصل السابع عشر

تركيب ثمار التفاح

يتضح مما سبق بحثه ان تكون ثمار التفاح يتأثر بالوراثة والبيئة وطرق التعهد ولذلك لا ترجى مطابقة جميع صفات الصنف الطبيعية والكيميائية مطابقة تامة في جميع المواقع والاقاليم بما يستبعد مطابقة الاوصاف التالية لها تماماً .

الاصناف الخارجية

تعتبر في تصنيف ثمار التفاح الصفات الخارجية التالية : الشكل والحجم




(هيدريك)

الشكل رقم ٢٣ - بعض اشكال ثمار التفاح : (١) مستدير (٢) مفلطح (٣) مستطيل (٤) مخروطي (٥) مستطيل مخروطي (٦) مستدير مفلطح (٧) مستدير مخروطي (٨) مستدير مستطيل .

الخلايا بمقادير وافرة في المواقع الجافة حيث تصبح الثمار برافة ؛ و أحياناً يكسو الغبار الدقيق الغشاء الشمعي . اما في الطبقة الثالثة فتتولد الخلايا التي تضيء على الثمرة لونها الطبيعي . وفي التصنيف توصف القشرة بأنها جلدية او حساسة ، سميكة او رقيقة ، ملساء او خشنة ؛ نقاطها بارزة او مستترة ، كبيرة او صغيرة ، عديدة او قليلة ، بيضاء او رمادية .

اللون : يشغل لون الثمار دوراً هاماً في تصنيفها ، ولذلك وجب التدقيق في كيفية تكوينه والعوامل المؤثرة في انتاجه . فلثمار التفاح لوان اساسيان ثابتان هما الاخضر والاصفر ، ويعلوها غالباً لون غشائي وهو الاحمر على اشكاله ودرجاته المتفاوتة .

يركّب اللون الاخضر من مادة الكلوروفيل الموجودة في الاوراق ؛ اما اللون الاصفر فيكون



اللون الاصفر فيكون
من مادة الكاروتين
وكلاهما متوفران في
خلايا القشرة على شكل
شباك تعرف بالكرومو
بلاستيدس ، وقلما يوجد
الكاروتين محلولاً في عصارة
الخلية . اما المادة الحمراء
فمصدرها صبغ

الانثوسيانين المتنوع ، ويقدر ان الصبغة المسببة للون الاحمر في التفاح هي مادة الايديابين (Idein) المحلولة في عصارة الخلية القشرية ؛ يتكون هذا الصباغ بتأثير اشعة الشمس من مادة الكروموجين ومصدرها السكر ؛ وعلى عكس

الثمار الاخرى لا يتكون اللون الاحمر في التفاح الا بوجود الاشعة فوق البنفسجية . يتضح بما ذكر ان جميع العوامل التي تحول دون وصول اشعة الشمس مباشرة الى الثمار والعوامل المسببة لنقصان الغذاء ، وخاصة مادة السكر ، تحول دون انتاج اللون الاحمر بمقادير وافرة . وقد يكون اللون الاحمر باهتاً بسبب توزيع المادة السكرية على الثمار في المواسم الغزيرة الانتاج ؛ كما يحول دون انتاج اللون الاحمر ايضاً اضافة الاسمدة الازوتية والحيوانية بكثرة ، والري الدائم ، والأتربة الثقيلة ، والعطش ، وانخفاض مساحة الاوراق او زيادتها ، وتكاثف الضباب او الدخان ، والمواقع المكشوفة كثيراً التي ترتفع فيها درجة الحرارة ، وكذلك المواقع الظليلة الكثيرة الغيوم .

وقد وضعت لاهمية اللون الاحمر في الاسواق التجارية انظمة تحدد بموجبها مساحته على الثمار ، فالاصناف واينساب وكنج ديفيد واسوبس اسبترنبرك وجوناثان وما كنتوش واستاركن يجب ان يغطي اللون الاحمر ٥٠٪ من سطح الثمرة في النخب الاول و ٢٥٪ في النخب الثاني ؛ والاصناف رد ديلشس وروم بيوتي ونورثون اسباي واستيمن واينساب ورد جيون ورد استراخان ٣٣٪ للنخب الاول و ١٥٪ للنخب الثاني على اقل تقدير .

الفجوة : وهي طرف الثمرة الذي يقع فيه العنق ، ويستعان بها في التمييز بين الاصناف فتكون عميقة او سطحية او متوسطة ، واسعة او ضيقة ، ذات زوايا اضلاعها حادة او منفرجة .

العنق : يصل الثمرة بالفرع او الدابر ، ويستعان به في التمييز بين الاصناف اذ قد يكون طويلاً او متوسطاً او قصيراً ، دقيقاً او غليظاً ، مستقيماً او معقوفاً .

الحوض : هو طرف الثمرة الذي ينتهي بالزهرة (الكأس) ، ويستعان به في التمييز بين الاصناف فيكون عريضاً او ضيقاً او متوسطاً ، عميقاً او سطحيماً ،

مدبذباً او املس .

الكأس : هي كل ما تبقى من اطراف الزهرة العليا فتكون مفتوحة او مقفلة او نصف مقفلة .

الصدأ : هو ظاهرة غير طبيعية تعتري بعض الاصناف في اتجاه الفجوة فتظهر الثمرة كأنها صدئة ، وتكثر خاصة في المواقع الرطبة .

اوصاف أجزاء ثمار التفاح الداخلية

اللب : يحتوي لب ثمرة التفاح على ثلاث صفات تميز جودته ، وهي كيفية تركيب خلاياه ، وطعمه ، ورائحته . ويختلف تركيب اللب في اصناف التفاح؛ فبعضه لين او صلب ، خشن او ناعم ، وذلك للتلين في سماكة جدران الخلايا ومقدار ما عليها من مادة البروتوبكتين . وتركيب لب ثمرة التفاح يجعلها من افضل الثمار للنقل ، ويرجع السبب في ذلك لكبر الفراغات بين الخلايا وامتلأها بالغاز مما يجعلها دون تمزقها بسرعة لدى الصدمات الطارئة على عكس الحال في ثمار الدراق . وكذلك فاللب الذي يحتوي على مقادير فائضة من الماء اثر الري الحاطي ، لا يصلح للتخزين في البراد وقتاً طويلاً لتسرب الماء احياناً الى الفراغات بين الخلايا فتختنق الثمرة لانعدام التنفس الطبيعي وسرعان ما تعتريها بعض الاعراض الطبيعية وتصبح غير صالحة للاستعمال .

الطعم : يتكون الطعم في الثمار من ثلاث مواد رئيسية هي اولاً السكر وكثورته من الكلو كوز والفروكتوز (سكر الثمار) وقليل من السوكروز ، ويتراوح مجموع هذه السكاكر بين ١٠ - ١٤٪ ؛ ثانياً الحوامض واكثرها حامض الملتيك ولا تزيد نسبته عن ١٪ في اكثر الاصناف حموضة بعد تمام نضجها ؛ ثالثاً المواد الحريفة . وتتوقف جودة الطعم على نسبة ما تحتويه الثمار من هذه المواد الثلاث والاحوال الطبيعية التي تكونت في خلالها . وقد ثبت

ان افضل المواقع لتكوين طعم لذيذ هي المرتفعة حيث المناخ بارد في موسم تكوين الثمار ونضجها ويتراوح معدل درجة الحرارة في شهر النمو بين ١٥-٢٠ درجة مئوية؛ ولكل صنف معدل خاص يوافق تكوين ثماره. فاذا ارتفعت الحرارة عن ٣٠ درجة مئوية في الصيف فترة قصيرة وخاصة في شهر آب او المنخفض المعدل عن ١٥،٥ درجة مئوية تصاب الثمار باعراض طبيعية ويتكون فيها طعم ردي .

ان جميع اعمال التعهد التي تهدف الى زيادة مساحة الاوراق بالنسبة للثمار كالنقب العميق ، وتوفير المواد الغذائية ، والتقليم الصحيح ، وتخفيف الثمار ، والحصول على مقادير متوسطة من الماء تساعد جميعها على صنع اكبر كمية من السكر والحصول على الذ طعم (٢) . فاذا صغر حجم الثمار عن حجم الصنف الطبيعي او لم تستكمل الثمار بلوغها قبل قطفها يتدنى طعمها . فالثمار الكبيرة بالنسبة لحجم الصنف الطبيعي التي اكتمل نموها واصبحت جدران خلاياها دقيقة لدنة فعند الضغط عليها في الفم تنفجر وتسيل منها العصارة بكثرة تشعر الآكل بلذتها ؛ اما الثمار الصغيرة الحجم بالنسبة لحجم الصنف او الثمار غير الناضجة فتكون جدرانها سميكة لا تنفجر غالباً بسهولة ولا تسيل عصارتها بل تقفز خلاياها في الفم من مكان الى آخر محتفظة بالقليل من العصارة ولا تشعر الآكل بلذتها .

الرائحة العطوية - ان رائحة الثمار ونكهتها الطيبة هي نتيجة تكوين بعض الاملاح العضوية ، منها املاح امل فورميت ، وامل اسيتيت ، وامل كبرويت ، وامل كبريليت . ومع ان انتاج هذه المواد يختلف تبعاً للاصناف فالمناخ يتحكم كثيراً في تكوينها . ويعتبر معدل الحرارة البالغ ٦٥ درجة ف (١٨ درجة مئوية) في الصيف افضل بيئة لتكوين هذه الاملاح .

جودة الصنف - يعتبر تركيب اللب والطعم والرائحة الصفات الثلاث الاهم في تمييز الاصناف بعضها عن بعض ، فيقال عنها : رديئة ، متوسطة ،

جيدة ، جيدة جداً ، او ممتازة .

قيمة ثمار التفاح الغذائية والصحية

لا يمتاز على ثمار التفاح من حيث القيمة الغذائية والصحية بين جميع انواع الفاكهة سوى الموز . فتحتوي عصارة كل كيلوغرام من التفاح على وجه التقريب على ما يلي :

مليغرام	غرام		
٢،٢٠	١٣١	نياسين	مواد سكرية
٠،٣٣	٣،٥	ثيامين	مواد زيتية
٠،١٧	٢،٦	ريبوفلافين	مواد زلالية
١٠٠٠ وحدة عالمية	٨٨	فيتامين آ (A)	فوسفور
» ١٠٠٠	٥٣	» بي (B)	كلس
» ١٠٠٠	٣	» سي (C)	حديد
» ٢٠٠٠	٣٩،٥ مليغرام	» جي (G)	حامض الاسكوربيك

انه بالإضافة الى قيمتها الغذائية فثمار التفاح لها تأثير كبير في طبيعة مجاري المضم وحالتها وفي حالة العيون لان فيتامين جي (G) يقي العيون شر العمى من مرض بلاكرا (Pellagra) وهذا الفيتامين موجود في التفاح بكثرة غير مألوفة في سائر الاثمار، ولذلك قيل عند الغربيين: «تفاحة واحدة في اليوم تكفي لابعاد الطيب عن القوم .»

الفصل الثامن عشر

قطف ثمار التفاح

ان قطف ثمار التفاح في المواعيد المناسبة وبالطرق الصحيحة امر بالغ الاهمية بالنسبة لمدة حفظها في البراد وبيعها في الاسواق . فاذا تركت ثمار الاصناف المتنوعة لتتضج بطبيعتها على الاشجار وجد من الاصناف ما تنضج ثماره بدون انتظام في مواعيد متفاوتة ، ومنها ما تنضج ثماره بالتساوي في آن واحد ، ومن الاصناف ما تسقط ثماره ابان النضج ، ومنها ما لا تسقط ثماره حتى لو اكتمل نضجها .

وتعتبر صفة سقوط الثمار ابان النضج ضارة جداً لان الثمار الساقطة تتخدش وترتض ولا تصلح للتبريد كما ان التقاطها يلزم المزارع زيارة اشجاره مراراً عديدة بما يزيد في اتعابه ونفقاته . وقد وجد مؤخراً انه يمكن ملافاة هذه الظاهرة السيئة عن طريق رش الثمار بالمواد الكيماوية الخاصة . ومن ذلك ثبت انه عند بلوغ الثمار اول درجة في النضج تتكون حلقة انفصال في طرف العنق حيث يتصل بالعصن وبانتهاء تكوين هذه الحلقة تسقط الثمار . وتسير هذه العملية بسرعة متفاوتة في الاصناف ؛ فالصنف روم بيوتي مثلاً تم فيه عملية الانفصال ببطء وتمكن الثمار من البقاء معلقة على الاشجار بعد انتهاء الانفصال بمدة طويلة . اما الصنف ماكتوش فنستكمل عملية انفصاله في مدة قصيرة

وتسقط ثماره في مواعيد متفاوتة . ولتلافي السقوط يجب رش الثمار بمادة نفتالين اسيتيك آسيد (Naphthaleneacetic Acid) او مادة نفتالين اسيتاميد (Naphthaleneacetamide) بمعدل خمسة الى عشرة اجزاء منه في مليون جزء من الماء او ما يعادل غراماً واحداً الى غرامين لكل الف لتر من الماء وذلك عند بدء نضج الثمار او بدء سقوطها فتتوقف عملية الانفصال خلال يومين لمدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع تبعاً لصف التفاح (٥) ؛ والهلم في الامر ان تصل مادة الرش الى عنق الثمرة وليس الى الثمار وحسب . وتوجد هذه المادة في الاسواق باسماء تجارية متنوعة .

هذا وتعتبر مواعيد القطف ووسائله ، وطبائع العامل ، وكيفية اجراء القطف والتفريغ اموراً اساسية في المحافظة على الثمار سليمة من الخدوش والرضوض .

تحديد موعد القطف

ان تحديد موعد قطف ثمار التفاح امر شاق اذ انه مرهون بطبيعة الصنف والموقع والموسم وغزارة الانتاج ودرجة النضج وخبرة المزارع . ولموعد بلوغ الثمار او نضجها اهمية كبرى في الاصناف المرغوب حفظها في البراد ؛ فالقطف المبكر حتى اسبوعاً واحداً قد يمنع اكتمال نضجها ولونها وطعمها وقد يعرضها للاصابة باعراض طبيعية مثل النقرة المرة وقمر التفاح وهي في البراد . كما ان قطف الثمار المتأخر اسبوعاً واحداً لا يقصر مدة تبريدها فحسب بل يعرضها للسقوط ويسبب ظهور اعراض طبيعية فيها اثناء التبريد مثل عرضي الجوف المائي والانفصال الداخلي (راجع الفصل الثاني والثلاثين) .

ويتأثر موعد القطف قليلاً بتاريخ بدء النمو والازهار اذ قد يبدأ الموسم متأخراً في بعض السنين ومبكراً في غيرها متأثراً بالعوامل الطبيعية . الا انه

يجب ان يذكر أن تأثير ارتفاع الحرارة في موسم النمو على موعد نضج ثمار التفاح قليل جداً . هذا وقد تنضج ثمار شجرة غزيرة الانتاج من صنف معروف قبل ثمار شجرة اخرى من الصنف نفسه قليلة الانتاج في الموسم عينه وذلك ببضعة ايام فقط . كما ان موعد قطف الثمار يتوقف على درجة النضج المرغوبة اذ ان من الثمار ما يجب بيعها في الاسواق المحلية وهذه يجب ان يكتمل نضجها على الاشجار قبل قطفها ؛ اما اصناف الثمار المرغوب في تبريدها فيجب ان تصل الى درجة البلوغ فقط ؛ ويعنى بالبلوغ (Maturity) اكتمال نمو الثمرة بحيث اذا قطفت يمكنها ان تستكمل نموها ونضجها (Ripeness) بعد القطف فتصبح صالحة للاكل . وعلى هذا يعتبر البلوغ والنضج درجتين متفاوتتين من النمو لكل منهما اهميتها في التبريد والاستهلاك .

وافضل طريقة لتحديد موعد القطف هي المستوحاة من خبرة المزارع والمبنية على ملاحظاته المحلية الدقيقة . ويستدل المزارع على اقتراب بلوغ الثمار اول درجة في النضج من ملاحظته الاداة الاربعة التالية :

١- سهولة الانفصال عن الاغصان - باكتال تكوين حلقة الانفصال في رأس العنق يصبح قطف الثمرة سهلاً بليتها باليد قليلاً الى اليمين ؛ وتعتبر هذه افضل الوسائل للتعرف الى النضج .

٢- تغير اللون - ان افضل دليل على اقتراب بدء النضج في ثمار التفاح هو التغير الذي يطرأ على اللون الاخضر الاساسي الذي يصفراً في جميع الاصناف ، كما ان اللون الاحمر في بعض الاصناف يبرز بوضوح ويعشاه . ولا يعتبر عدم اكتمال اللون الاحمر دليلاً على عدم النضج اذ في كثير من المواقع ولاسباب طبيعية لا يكتمل اللون الاحمر ، كما انه في مواقع اخرى قد يكتمل اللون قبل ان تبدأ الثمرة بالنضج . ولذلك يعتبر تغير اللون الاخضر القائم الى

الاصفرار اصح دليل على بدء النضج وخاصة اذا بدأ لون الثمرة براقاً بعد مسحها باليد .

٣ . **طعم الثمار** - ان المزارع المتمرس يستطيع تحقق بدء النضج من طعم الثمرة ، اذ ان الثمار الفجة يكون طعمها نشويماً وحبوضتها حادة وهذا يعني انها يجب ان لا تقطف قبل مرور بضعة ايام . ويعتبر زوال النشاء وازدياد السكاكر والمواد الصلبة الاخرى أمراً هاماً في تحديد موعد القطف؛ ويمكن تحديد نسبة هذه المواد بآلة الرفرراكتوميتر اليدوية (Hand Refractometer) .

٤ **عدد ايام النمو** - من المعروف ان كل صنف من ثمار التفاح يتطلب عدداً معروفاً من الايام لاكتمال نموه ونضجه . ويبدأ قياس موسم النمو من تاريخ اكتمال الازهار (راجع الجدول السادس) .

الجدول السادس - عدد الايام الضرورية لاكتمال نضج ثمار بعض اصناف التفاح

الصف	عدد الأيام	الصف	عدد الايام
كرافنشتين	١١٠ - ١١٥	اسوبس اسبترزبرك	١٤٥ - ١٥٠
ماكتوش	١٢٥ - ١٣٠	نورثون اسباي	١٤٥ - ١٥٥
ونتر بنانا	١٢٥ - ١٣٠	روم بيوتي	١٦٠ - ١٦٥
جواناثان	١٤٠ - ١٤٥	استين واينساب	١٦٠ - ١٦٥
كولدن دبليشس	١٤٠ - ١٤٥	يلونيوتن	١٦٠ - ١٦٥
رد دبليشس	١٤٥ - ١٥٠	واينساب	١٦٥ - ١٧٠

لا يمكن الاعتماد الكلي على زمن النمو لانه يتأثر قليلاً بالاحوال الجوية وطرق التعمد . كما لا يُنصح بالاعتماد على الآلة الضاغطة المصنوعة خاصة لمعرفة نضج ثمار التفاح لانها لا تصدق في كثير من الاحيان بسبب اختلاف تركيب خلايا

الاصناف ، والفوارق الطبيعية في حالة الخلايا من موسم الى آخر . فسرعة تتابع ظهور دلائل النضج نرى ان الافضل ان يكشف المزارع على اشجاره مرتين في الاسبوع ابان النضج ويفحص جميع الادلة بدقة منتبهاً الى سرعة ازدياد الحجم في الايام الاخيرة . لا يمكن التقيد بمواعيد ثابتة تنضج فيها اصناف التفاح في جميع الاقاليم الا انه يمكن قسمها بحسب تتابع نضجها في لبنان الى اربع فئات :

الاصناف المبكرة - يبدأ نضج ثمارها بين ١٠ تموز و ١٥ آب وفقاً للموسم: رد استراخان، كرافنشتين، رد جيون؛ ويعتبر صنف كرافنشتين افضل الاصناف المبكرة في العالم .

الاصناف المتوسطة - يبدأ نضج ثمارها غالباً بين ١ - ١٥ آب: ماکنتوش، بيزكوود (سان باري) ، وكوكس اورانج ، وونتر بنانا .

الاصناف المتأخرة - يبدأ نضج ثمارها غالباً بين ١ - ٢٠ ايلول: يلوبلفلور، جواناثان، كولدن دبليشس، رد دبليشس (استاركن) ، ، استين واينساب ، اسوبس اسبترزبرك .

الاصناف المتأخرة جداً - يبدأ نضج ثمارها غالباً من متوسط شهر ايلول فصاعداً وقد يمتد الى اوائل تشرين الاول : رينيت دي كندا (شتوي) ، نورثون اسباي ، روم بيوتي (ملكة لبنان ؟) ، يلونيوتن ، واينساب ، وكنج ديفيد .

اعداد العمال وادوات القطف


عندما يشعر المزارع باقتراب موعد القطف عليه ان ينتخب العمال الذين يعتمد عليهم في القطف بعدد كافٍ لانجاز عمله في اقصر مدة ممكنة . ولا يكفي ان يكونوا من ذوي الخبرة في القطف بل يجب ان ينتخبهم ليني العريكة

كيفية قطف الثمار

لأجل الحؤول دون سقوط الثمار أثناء عملية القطف يجب ان يحمل العامل القفة معلقة الى صدره ويبدأ قطف الثمار الدانية من الخارج أولاً ثم من الداخل . وبعدئذ يضع السلم بالقرب من خارج الشجرة بحيث لا تتركز على الاغصان ويتسلقها لقطف الثمار المرتفعة ؛ ثم يغير وضعية السلم ليتمكن من قطف الثمار المرتفعة داخل الشجرة .

إذا اجري القطف باليد فالأفضل احاطة الثمرة باصابع اليد اليمنى وعطفها الى اليمين بتؤدة ووضعها بحفة ولطف في القفة المعلقة الى الصدر ؛ فالثمار التي لا تقطف بسهولة يجب تركها لا كتمال نضجها . لا تضغط باصابع يدك بشدة على الثمار فالاصناف ذات القشرة الحساسة مثل ونتر بنانا ، واستيمن ، وما كنتوش تظهر آثار الضغط عليها بعد ساعات قليلة من القطف . لا تلوي عنق الثمرة ولا تمزقه ، وتجنب كسر الدوابر او الاغصان الشمرية . واذا جرى القطف بالمقص الخاص فيجب ان تمسك الثمرة باليد اليسرى خوفاً من السقوط . حذار ان ترمي الثمار في القفة لئلا تتخدش او ترتض . لا تملأ قفة القطف اكثر من سعتها ، وعند تفريغها اقترب من صندوق الجمع واحن جسمك باتجاهه حتى تلامس قفة القطف اطرافه وافتح قعرها وافرغها بهدوء ولطف . لا تملأ صناديق الجمع فوق حافتها العليا كي لا تسقط منها الثمار ويبقى نقلها سهلاً . انقل صناديق الجمع حالاً الى مركز التعبئة او الى البراد للحفاظ الموقت .

لطفاء ينفذون توصياته ولا يلجأون الى الحشونة في قطف الثمار ونقلها وتفريغها . واهم ادوات القطف هي القفف المبطنه والمقصات والصناديق المبطنه والسلام . وافضل قفف القطف ما كان منها مصنوعاً من المعدن الخفيف على شكل



(نَجَّار)

الشكل رقم ٢٥ - أحدث نموذج للسلم قطف متين صنع من المعدن الخفيف ولا يزيد وزنه على عشرة كيلوغرامات .

اسطواني مستدير يناسب صدر العامل ولا يتسع لأكثر من اثني عشر كيلوغراماً من الثمار ، على ان يكون مبطناً عند حافته العليا بالقماش ، وقعره من القماش المتين فيمكن فتحه بسهولة لتفريغ الثمار منه ؛ وله علاقتان مصنوعتان من القماش يلبسهما العامل في كتفيه . يمكن قطف الثمار بواسطة مقصات خاصة مدورة الرأس ، والافضل قطف الثمار باليد . ان حجم صناديق جمع الثمار اكبر من الصناديق العادية قليلاً ، كما انها مبطنه بالقش المعطى بالحيش لاجتناب تلف الثمار بخدشها او جرحها . اما افضل كبلوغرامات .

السلام فهو ما كان مصنوعاً بثلاث أرجل من الخشب او المعدن الخفيف المتين (الشكل رقم ٢٥) .

الفصل التاسع عشر

توضيب ثمار التفاح وتعبئتها

تتطلب القوانين الصحية العالمية والاسواق التجارية من مزارع التفاح ان يتقيد بانظمة خاصة اذا رغب عرض ثماره للبيع محافظة على مصلحة المستهلكين وصحتهم . منها انه لا يمكنه بيع ثماره في الاسواق العالمية ما لم تكن خالية من مواد الرش السامة المستخدمة في مكافحة الحشرات والامراض . كما انه يترب عليه بيع ثماره معبأة في صناديق معروفة الحجم والوزن . وقد شيدت المستودعات الكبيرة في الاقاليم المشهورة بوفرة انتاجها وجودته تجهز باحدث المعدات والاساليب لغسل الثمار وتنجيفها وتلميعها وانتخابها وتحديد حجمها ولفها وتعبئتها .

اختلف المسؤولون في كيفية تنفيذ اعمال التوضيب والتعبئة وذلك باختلاف الاقاليم . ففي ولاية كاليفورنيا حيث المناخ دافئ تقطف ثمار التفاح وترسل حالاً الى البراد دون غسلها وتوضيبها بطريقة منظمة بل يكفي بنبد الثمار المصابة بالحشرات والجروح والرضوض كيلا تضر بغيرها اثناء الحفظ الموقت . وعند الحاجة اليها تغسل وتعبأ وتباع . فميزة هذه الطريقة ان لدى صاحب الثمار متسعاً كافياً من الوقت لتوضيب الثمار بنفقات اقل لتوفير اليد العاملة ، كما يمكنه اجراء التعبئة في فصل الشتاء البارد دون ان تتعرض الثمار للحرارة

المرتفعة كما هي الحال في الصيف ، ويمكنه ان يتأكد من جودة الثمار المباعة . وعليه يجب ان تتوفر مساحات التبريد الضرورية في ذلك الاقليم بتكاليف قليلة اذ تتطلب هذه الطريقة مساحات اكبر للتبريد . ومن سينتجها ان على المزارع دفع نفقات جزء من الثمار لا يمكنه تعبئته في الصناديق وكان الافضل بيعه حالاً في الاسواق المحلية . اما في ولايتي واشنطن واوريجون حيث تقطف الثمار في مناخ بارد فيلجأ المزارعون الى غسل الثمار وتوضيبها وتعبئتها حال قطفها ثم حفظها في البراد . وهذه الطريقة توفر مساحات التبريد ونفقاتها وتجعل الثمار جاهزة للبيع حين الطلب ، وتسمح ببيع الثمار غير المرغوب فيها طازجة (٦) . وفي انتخاب انسب الطريقتين يؤخذ بعين الاعتبار اتساع مساحات التبريد ووفرة المصانع المعدة للتوضيب وغزارة انتاج الموسم وطبيعة مناخ الاقليم ووفرة اليد العاملة وجودة الثمار . هذا ويعتقد ان طريقة ولاية كاليفورنيا هي الانسب لاحوال لبنان اذا توفرت مساحات التبريد الضرورية .

تنظيف ثمار التفاح

ضرورة الغسل - ان اكثر المواد المستعملة في وقاية ثمار التفاح من اضرار الحشرات والامراض وخاصة مادة زرنبيخات الرصاص لمواد سامة جداً ولذلك يجب ازالتها عن الثمار قبل تعبئتها في الصناديق وبيعها للاستهلاك . اما قولهم انه لا يبقى ادنى اثر لمفعول مادة زرنبيخات الرصاص بعد انقضاء زمن يسير من رشها على الثمار فلا اساس له من الصحة لان اشعة الشمس لا تنقص من فعالية هذا السم الزعاف وكذلك المطر والرطوبة لا يزيلان خطره . لقد ثبت في اعظم المختبرات الكيماوية والصحية العالمية انه يبقى اثرها حتى بعد غسل الثمار غسلأ عادياً . لهذا السبب وضع قانون في الولايات المتحدة الاميركية يحدد بموجبه الحد الاعلى لما يمكن بقاؤه من المواد السامة في الكيلوغرام الواحد من الثمار

المستخدمة لالتصاق مادة زرنبيخات الرصاص على الثمار ، والزيت المعدنية المستعملة للوقاية من الحشرات القشرية تزيد في صعوبة تنظيف الثمار . ولا بد من القول ان غسل الثمار لا يؤثر في حالتها ومدة حفظها في البراد .



(النودوموريس)

الشكل ٢٦ - ثمرتا تفاح مشوهتان بسبب بقاء آثار مادتي الزرنبيخ وحمض الكلورور على القشرة . ان لم تنظف (نشطف) ثمار التفاح جيداً من حامض الكلورور بالماء القراح فقد (١) يشوه حوض الثمار (الزهرة) لبقاء آثار الزرنبيخ في حالة محلوله او (٢) قد تتكون بقع كبيرة منخفضة بنية اللون طريضة الملمس لبقاء حامض الكلورور على قشرة الثمرة .

آلات التنظيف والتجفيف - لقد استنبط المهندسون آلات عديدة لتنظيف


الثمار اهمها ثلاث (أ) آلة الغسل بالتعويم (Flotation Machine) (ب) آلة الغسل بالرش (Spray Machine) و(ج) آلة الغسل بالفرشاة (Underbrush Machine). وتعتبر الآلة الأخيرة أفضلها لأنها تنظف الثمار من السم بتسييرها على عدد وافر من الفراشي الناعمة المتحركة السابجة في حمام مليء بمحلول حامض الكلورور بنسبة واحد بالمئة . ومنه تنقل الثمار الى مغطس من الماء القراح حيث يزال الحامض ، وللتأكد من زواله تعرض الثمار لرذاذ من الماء (دوش) مسلط

المعدة للبيع وهو ١١٠. قمحة من الرصاص (او ٧١ جزء من مليون) ؛ و ٥٥. قمحة من الزرنبيخ (او ٣٦ جزء من مليون) ؛ و ١٠٧. قمحة من الفلورين (او ٧ جزء من مليون) ؛ و ١٠٧. قمحة من د.د.ت. (او ٧ جزء من مليون) (٧) ، وذلك محافظة على الصحة العامة وتلافياً لاحداث التسمم البطيء لآلاف المستهلكين الابرياء .

وسائل الغسل - ظهر بالاختبار ان مسح الثمار برقعة جافة او مبللة لا يكفي لازالة المواد السامة وخاصة ما يتبقى منها في حوض الثمرة وفجوتها . كما ان الغسل بالماء القراح يزيل منها جزءاً يسيراً فقط . و افضل وسائل الغسل هي اضافة ١٪ من حامض الكلورور او ما يعادل ثلاثة ليترات من هذا الحامض التجاري (عيار ٢٠ بومي) في ١٠٠ لتر من الماء الفاتر (٤٠ درجة مئوية) . توضع ثمار التفاح في هذا المحلول وتغسل لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق ثم ترفع وتغسل بالماء القراح حالاً وتجفف . وكلما غسل مقدار من الثمار يساوي خمسة آلاف كيلوغرام يجب تجديد المحلول والماء القراح . يُفضّل وضع قليل من الكلس في الماء القراح بعد غسل (نشطف) الفواكه كيلوغرام من الثمار محافظة عليها من تأثير الحامض اذ ان بقاء آثار منه عليها يسبب تشويهاً (الشكل ٢٦). وفي الاقاليم التي تتراكم فيها المواد السامة على الثمار لكثرة الرش المتأخر في الصيف والتصاق المواد السامة بالثمار يلجأ المزارعون الى عملية الغسل المزدوج (Tandem Washing) بمحلول الحامض اولاً ومحلول القلي ثانياً وغسل الثمار بالماء القراح وتجفيفها (٨) .

لوحظ ان الاصناف تختلف من حيث صعوبة غسلها وذلك يرجع الى الاختلاف في احجام الثمار وتركيب قشرتها ومقدار ما عليها من المادة الشمعية وتاريخ قطفها . و احياناً تتأني الصعوبة من نوع المواد المستعملة في الرش ؛ فالمواد

من رشاشات معلقة ومنه تسير الى مركز التجفيف واخيراً الى آلة تصنيف الحجم او التلميع (الشكل ٢٧). واذا ان آلة التجفيف ضرورية جداً ولا يوجد آلة للتجفيف مع اكثر انواع آلات الغسل وجب الانتباه الى التوصية بطلبها عند تقديم طلبات الشراء .



(النورود وموريس)

الشكل رقم ٢٧ - آلة غسل بالفريشة (Underbrush Machine) لتنظيف ثمار التفاح من مواد الرش السامة .

التوضيب


يقسم توضيب ثمار التفاح الى ثلاث عمليات اساسية :

اولاً - الانتخاب باليد (Grading) لازالة الثمار المصابة : يجري هذا العمل قبل تنظيف الثمار اذا رغب في حفظها حالاً دون توضيب وتعبئة منظمة في الصناديق. اما اذا رغب في تنظيف الثمار وتوضيبها وتعبئتها قبل تبريدها فيجب اجراء هذه العملية بانتهاء التنظيف مباشرة اذ انه بعد خروج الثمار من آلة التجفيف او التلميع الى درج آلة تحديد الحجم يقف العامل المختص ويزيل بسرعة كل ثمرة

مصابة بالحشرات والامراض والاعراض الطبيعية والحدوش والرضوض . كما انه يزيل الثمار التي لا تدخل احد الانتخاب الثلاثة المعترف بها كأن يكون لونها غير مكتمل التكوين ، او انها تجاوزت درجة النضج ولا يمكن حفظها في البراد، أو لان شكلها غير عادي بالنسبة للصف او ان حجمها كبير او صغير جداً. ويبدو من طبيعة هذا العمل الدقيق انه يتطلب خبرة ومراناً وسرعة اذ يتوقف عليه نجاح تعبئة الثمار وتصريفها .

ثانياً - تحديد حجم الثمار لتنظيم التعبئة : يمكن القيام بهذا العمل باليد او بواسطة الآلات الخاصة . اما اجراؤه باليد فيتطلب خبرة وسرعة ودقة في العمل ولكنه يفضل على الآلة لانه لا يسبب رضوضاً للثمار . واذا اجريت عملية تحديد الحجم بالآلة (Sizing Machine) بعناية فائقة أمكن تقادي احداث الرضوض وتخفيض النفقات كما يجري العمل بسرعة متناهية . وهذه امور خطيرة في إعداد الثمار للتبريد والبيع . وقد ابتكر المهندسون انواعاً عديدة من الآلات لهذا الغرض يحدد بواسطتها حجم الثمار بالنسبة لوزنها او قطرها (الشكل رقم ٢٨). وتعرف الاسواق التجارية بالاحجام بالنسبة لعدد الثمار في الصندوق الواحد، وهذه الاحجام هي: ٦٤ و٧٢ و٨٠ و٨٨ و١٠٠ و١١٣ و١٢٥ و١٣٨ و١٥٠ و١٦٣ و١٧٥ ومن هذه الاحجام ما تلائم تعبئة الاشكال المفلطحة وهي ١٧٥ و٨٨ وما تبقى في صالحه للاشكال المستديرة والمخروطية والمستطيلة . واكثر الاحجام المرغوبة في الاسواق التجارية هي ١١٣ و١٢٥ و١٣٨ ثمرة في الصندوق الواحد .

ثالثاً - تحديد نسبة اللون في الاصناف الحمراء : يجب ان تصنف الاصناف الحمراء بالنسبة لمقدار اللون الاحمر فيها ، وقد وضعت انظمة تحدد نسبة اللون الاحمر في كل من الانتخاب الثلاثة المعترف بها في دوائر التصدير . تجرى هذه العملية على يد خبير باللون ابان تعبئة الثمار في الصناديق .



الشكل رقم ٢٨ - آلة تحديد حجم غاز التفاح داخل مثلث اعد لتوزيع الفاكهة . تسير الغاز بموجب هذه الطريقة على جانبي متعرجين غير متوازيين فتسقط كل ثمرة في الموضع الذي يناسب قطرها .

التعبئة

لوازم التعبئة - تتكون لوازم التعبئة من الصندوق الموحد والورق المضلع وورق التغليف (اللف) وورق الدعاوة .

١ - الصندوق الموحد : يجهز هذا الصندوق من خشب شجر الشوح غير المستعمل ، كما يجب أن يكون الخشب سليماً ونظيفاً . وقد حدد حجم الصندوق من الداخل بارتفاع ٦ ، ٢٦ سم وعرض ٢٩ ، ٢ سم وطول ٤٥ ، ٧ سم على ان يضع كما يلي : تجهز قطعة واحدة سمكها ثمانية عشر مليمتراً لكل من الرأسين ؛ وقطعتان سمك كل منهما عشرة مليمترات لكل من الجانبين ؛ وقطعتان سمك الواحدة سبعة مليمترات لكل من القعر والغطاء ، فاذا صنعت هاتان القطعتان من خشب اسك يتعذر ايجاد الانتفاخ اللازم عند تعبئة الصندوق . كما يلزم للصندوق ٣٢ مسماراً طول كل منها اربعة سنتيمترات يثق كل اربعة منها في كل من الجوانب الثمانية على ان يترك فراغ مقداره نصف سنتيمتر بين اللوحين في الجوانب والقعر والغطاء ، وفراغ مقداره نصف سنتيمتر بين الالواح وحافة الصندوق وذلك لتهوئة الثمار .

٢ - الورق المضلع : يجب ان يغلف (يبطن) كل صندوق من داخله بالورق السميك المضلع (كرتون خاص) لوقاية الثمار من الرضوض اثناء النقل . ويقدر لزوم ثلثي المتر المربع لكل صندوق من هذا النوع من الورق .

٣ - ورق التغليف (اللف) : يجب ان يكون الورق الذي تغلف به الثمار ناعماً ومشبعاً بالزيت المعدنية الحالية من الرائحة كما يكون خارجة لماعاً ومطبوعة عليه تسجيلية المصدر (الماركة) باللون الصحيح بحسب درجة النخب ؛ ويستعمل اللون الازرق للنخب الاول ، واللون الاحمر للنخب الثاني ، واللون



(الن)
 الشكل رقم ٢٩ - مشهد عام داخل مثلث تم التجهيز منه لتوضيح الفاكهة . لاحظ نظام العمل : تسير الصناديق الفارغة من الطابق العلوي الى عامل التعبئة على حزام متحرك ؛ وتسير الثمار على آلة تغذية الحزم تقطع اسام النامل ؛ واثناء التجهيز يوضع الصندوق على حزام متحرك (حزام المتحركة) ليصل الى عامل يستعد لاقفاله .

الاصفر للنخب الثالث . وكذلك لكل حجم من حجوم الثمار ورق خاص به كما هو مبين ادناه :

الاجسام	سم
٨٠-٦٤	تتطلب ورقاً من حجم ٢٨×٢٨
١١٣-٨٨	» » » » ٢٥,٥×٢٥,٥
١٢٥-١٨٠	» » » » ٢٣×٢٣
الصغيرة جداً	» » » » ٢٠×٢٠

٤ - ورق الدعاوة : يجب أن تطبع لوحتان من الورق بحجم رأس الصندوق (٢٩×٢٧ سم) احدهما باللغة العربية والاخرى بلغة اجنبية ويكون لونهما بحسب درجة النخب كما ذكر سابقاً . تلتصق كل منهما على أحد رأسي الصندوق وتحتوي على اسم مصدر الثمار او تسجيلته الخاصة ، واسم مرفق التصدير ، ونوع الثمار ، وصفها ، ودرجة النخب ، وعدد الثمار في الصندوق ووزنها الصافي ، وعبارة « انتاج لبنان » أو أي بلد آخر مصدر.

عمال التعبئة - يفضل ان يكون هؤلاء من خيرة الاشخاص الجيدين في التعبئة اذ يتوقف عليهم الكثير من نجاح اعمال التعبئة والمحافظة على جودة الصنف اثناء النقل والتبريد والبيع ، وانخفاض نفقات العمل . كما يجب ان يرتدوا ثياباً خاصة نظيفة وان يكونوا اصحاء الاجسام ايديهم خالية من الامراض المعدية ؛ وان يكونوا سريعى الحركة لطيفي المزاج . يستطيع العامل الواحد منهم اعداد ١٢٥ صندوقاً في ثماني ساعات عمل ، واقصى ما يمكن تعبئته على يد عامل ماهر هو ٣٢٥ صندوقاً في عشر ساعات عمل وهذا يعتبر رقماً قياسياً في التعبئة .

الجدول السابع - اصول تعبئة ثمار التفاح في الصناديق (٤)



عدد الثمار في الصندوق	عدد الطبقات	عدد الاسراب	عدد الثمار ترتيب موقع الثمار في	عدد الثمار في الطبقة	عدد الثمار في الصندوق	اسراب الطبقة
٢-٢	٤	٨	١٦	٣-١	٦٤	الكبيرة من
٢-٢	٤	٨	١٦	٤-٢	٦٤	جميع الاشكال
٢-٢	٤	٩	١٨	٣-١	٧٢	»
٢-٢	٤	٩	١٨	٤-٢	٧٢	»
٢-٢	٤	١٠	٢٠	٣-١	٨٠	»
٢-٢	٤	١٠	٢٠	٤-٢	٨٠	»
٢-٢	٤	١١	٢٢	٣-١	٨٨	الاصناف المفاطحة
٢-٢	٤	١١	٢٢	٤-٢	٨٨	الكبيرة
٢-٣	٥	٧	١٨	٥-٣-١	٨٨	الاصناف المستطيلة
٣-٢	٥	٧	١٨	٤-٢	٨٨	» » الكبيرة
٢-٣	٥	٨	٢٠	٥-٣-١	١٠٠	الاصناف
٣-٢	٥	٨	٢٠	٤-٢	١٠٠	المتوسطة
٢-٣	٥	٩	٢٣	٥-٣-١	١١٣	من جميع
٣-٢	٥	٩	٢٢	٤-٢	١١٣	الاشكال
٢-٣	٥	١٠	٢٥	٥-٣-١	١٢٥	»
٣-٢	٥	١٠	٢٥	٤-٢	١٢٥	»
٢-٣	٥	١١	٢٨	٥-٣-١	١٣٨	»
٣-٢	٥	١١	٢٧	٤-٢	١٣٨	»
٢-٣	٥	١٢	٣٠	٥-٣-١	١٥٠	الاصناف
٣-٢	٥	١٢	٣٠	٤-٢	١٥٠	الصغيرة من
٢-٣	٥	١٣	٣٣	٥-٣-١	١٦٣	جميع الاشكال
٣-٢	٥	١٣	٣٢	٤-٢	١٦٣	»
٢-٣	٥	١٤	٣٥	٥-٣-١	١٧٥	الاصناف المفاطحة
٣-٢	٥	١٤	٣٥	٤-٢	١٧٥	الصغيرة فقط
٢-٣	٥	١٤	٣٨	٥-٣-١	١٨٨	الاصناف الصغيرة
٣-٢	٥	١٤	٣٧	٤-٢	١٨٨	من جميع الاشكال
٣-٣	٦	١١	٣٣	٥-٣-١	١٩٨	» »
٣-٣	٦	١٢	٣٦	٥-٣-١	٢١٦	» »

اساليب التعبئة - يجب ان تكون الثمار الجاهزة للتعبئة من صنف وحجم وشكل ونخب ولون واحد موضوعة في وعاء نظيف سهل المنال . تكفي العامل الحخير نظرة واحدة يلقيها على الثمار لتحديد افضل اسلوب لتعبئتها ؛ فهناك اساليب متنوعة تحددها الانظمة لتعبئة كل حجم وشكل من الثمار، واليك بعضها: اولاً - يجب ان تغلف كل ثمرة بفردا بالورق الناعم المشبع بالزيوت المعدنية لان التغليف (ا) يحافظ على الثمار من الرضوض اثناء النقل (ب) يمنع الامراض الفطرية من الانتشار بسرعة من ثمرة الى اخرى (ج) يساعد على تساوي درجة الحرارة في الثمار (د) تمتص اوراق التغليف الغازات الناتجة من تنفس الثمار وبذلك تحول دون اصابها بعرض قمر التفاح وهي في البراد (هـ) وتظهر الثمار في حلة جميلة عند عرضها للبيع .

ثانياً - يجب ان تعبأ الثمار في طبقات الصندوق صفوفاً منجرفة (Diagonal) لا يوضع بعضها فوق بعض مباشرة وذلك لتفادي الرضوض ولان الثمار ترتكز في مواقع افضل ولا تتعرض للاختلاط . وهذا يعني وضع الثمار في الفراغات المكونة بينها في الطبقات .

ثالثاً - يجب ان تعبأ الثمار بحسب الاصول المبينة في الجدول السابع تماماً مع اعتبار المقاييس التالية كأساس لتحديد الحجم بالنسبة لعدد الثمار في الصندوق (١٢) :

عدد الثمار في الصندوق	قطر الثمار (مليمتر)	عدد الثمار في الصندوق	قطر الثمار (مليمتر)
١٢٥-١١٣	٧٦٤٢	٦٤	٩٢٤٢
١٣٨-١٢٥	٧٣٤٠	٧٢	٨٩٤٠
١٥٠-١٣٨	٦٩٤٨	٨٠	٨٥٤٨
١٧٥-١٧٣	٦٦٤٦	٨٨	٨٢٤٦
١٨٨-١٧٥	٦٣٤٤	٩٦-١١٣	٧٩٤٤
٢١٦-٢٠٠	٦٠٤٢		



(الن)

الشكل رقم ٣٠ - كيفية تغليف ثمار التفاح بالورق المشبع بالزيت المعدنية المكورة . تابع كل حركة من ١ الى ٥ وراجع تفاصيل كيفية التعبئة .

يلاحظ انه قد يكون عدد الثمار في الصناديق متساوياً ولكن يختلف ترتيب الاسراب في طبقاتها تبعاً لشكل وحجم وعدد الثمار في الطبقة . كما قد لا يكون عدد الثمار في الصندوق مطابقاً تماماً لنتيجة ضرب عدد الطبقات في عدد الثمار في كل طبقة وذلك لاختلاف ترتيب الاسراب في الطبقات ؛ وفي مثل هذه الحال يمكن اخذ متوسط العددين ، فالصندوق حجم ١١٣ قد يحتوي على ١١٥ ثمرة او ١١٠ ثمار تبعاً لطريقة التعبئة ولذلك اعتبر متوسط الرقمين . واهم عامل في تعبئة الثمار هو ترتيبها في اسراب الطبقة ، ويتبين من الجدول اعلاه انه يمكن تعبئة اكثر ثمار التفاح في الاسراب المكونة من ٢ - ٣ او ٣ - ٢ من الثمار في كل سرب . اما الاحجام الكبيرة فيجب تعبئتها بطريقة ٢ - ٢ والصغيرة جداً غير المذكورة بطريقة ٣ - ٣ ثمرات في كل سرب . مثلاً على ذلك اذا بدأت تعبئة صندوق ١٦٣ وازعماً في السرب الاول ثلاث ثمرات وفي السرب الثاني ثمرتين (٢ - ٣) تسع كل طبقة ٣٣ ثمرة ويكون عدد الثمار الحقيقي في الصندوق ١٦٥ ثمرة . اما اذا وضعت في السرب الاول ثمرتين وفي السرب الثاني ثلاثاً (٢ - ٣) فتسع كل طبقة ٣٢ ثمرة ويصبح عدد الثمار الحقيقي في الصندوق ١٦٠ ثمرة ، ومعدلها ١٦٣ ثمرة تقريباً .

رابعاً - يجب ان لا ينقص الوزن الصافي للثمار المعبأة في الصندوق الواحد عن ١٧ كيلوغراماً ولا يزيد وزن الصندوق الفارغ على اربعة كيلوغرامات ، ويجب ان لا ينقص مجموع وزنه بعد التعبئة عن ٢١ كيلوغراماً ولا يزيد على ٢٣ كيلوغراماً .

كيفية التعبئة - يختلف الاشخاص في كيفية تعبئة الثمار . وبما انه يجب تغليف كل ثمرة بمفردها فالانسب اتباع الطرق التي تتطلب اقل عدد من الحركات اليدوية . ويفضل ان توضع الثمار في وعاء على ميسنة العامل واوراق اللف على

واحد باتجاهك قليلاً (الشكل رقم ٣٢) وابدأ بتعبئة الطبقة الاولى واضعاً ثمار السرب الاول في الطرف الاقرب لجسمك وبالنظام الواجب اتباعه كما هو




(ان)

الشكل رقم ٣٢ - عاملة توضع الثمار في وضع صحيح : تجلس العاملة على كرسيها وامامها جهاز لوضع ورق التغليف وصندوق التعبئة .

مبين في طرق التعبئة . تم تعبئة السرب الاول والثاني وهلم جرا الى ان تستكمل تصفيف ثمار الطبقة الاولى ثم أعد الكرة في الطبقة الثانية الى ان يتم عدد طبقات الصندوق . لا تترك فراغاً بين آخر الطبقة والصندوق . يجب الضغط قليلاً في الاحجام المتوسطة على الاسراب عند انتهاء الطبقة لتأخذ الثمار مركزها الطبيعي . احرص على جعل الطبقة العليا مرتفعة عن حافة الصندوق سنتيمترًا

ميسرته في وضع يناسب رفعها بسرعة لتظهر التسجيلة للعيان . ضع اصابع يدك اليسرى على ورقة اللف وارفعها الى مستوى صدرك وفي اللحظة نفسها تناول بيدك اليمنى ثمرة وارفعها وضعها في وسط الورقة جاعلاً اتجاه عنقها الى كفك اليمنى . اطبق يدك اليسرى على الثمرة وبيدك اليمنى اتم عملية اللف ثانياً ما يزيد من الورقة الى جانب الثمرة . ضع الثمرة بيدك اليسرى في الصندوق على جانبها حيث ثبتت الورقة متأكدًا ان عنق الثمرة في اتجاه معاكس لجسمك . راجع العمل مبتدئاً بيدك اليسرى وهكذا دواليك (الشكل رقم ٣٠) . يستطيع العامل بعد التمرين ان يتم هذه العملية في ثابنتين او ثلاث ثوان على الاكثر ويتوقف ذلك على حجم الثمار وخبرته .



(اوختر)

الشكل رقم ٣١ - الطرق الثلاث في تعبئة ثمار التفاح في الصناديق : (١) ثلاث ثمار في كل سرب وهذا يستعمل لثمار الصغيرة الحجم فقط (٢) وثلاث ثمار في السرب الاول وثمرتان في السرب الثاني (٣ - ٢) او بالعكس (٣ - ٢) وهذه الطريقة تشمل جميع الاحجام المتوسطة (٣) وثمرتان في كل سرب وتستعمل لثمار الكبيرة جداً .

ضع الصندوق المبطن بالورق الخاص بحيث يصبح احد رأسيه قريباً من جسمك

الفصل العشرون

تبريد ثمار التفاح

اكتشف العلماء امكان تمديد اجل ثمار التفاح عن طريق حفظها في الاماكن الباردة ، على ان هذا العمل لا يساعد على اطالة موسمها فحسب بل ينظم توزيعها في الاسواق التجارية ويتيح لاصحابها الحصول على اسعار فضلى . وبرغم سلامة هذه النظرية فهي ليست سهلة التطبيق بالدرجة التي تتبادر للقارئ اذ تعترضها صعوبات جمة كما يتضح من البحث التالي :

لو سمح لثمار التفاح ان تستمر في حياتها الطبيعية بعد قطعها فسرعان ما تظهر عليها علامات التلف ويعاجلها الفناء إما (أ) لاصابتها بالأمراض الفطرية (ب) او لاصابتها بالاعراض الطبيعية (ج) او لانحللها الطبيعي تدريجياً مما يسبب تلاشيها . ويمكن السيطرة على هذه العوامل عن طريق حفظ الثمار في مكان بارد بقصد ابطاء عملية التنفس أو إيقافها ومنع انتشار الامراض ، وهذا معناه تبريد الثمار الى درجة متدنية تقارب الصفر مئوياً او ٣٢ فهرنهايت . ولقد ظهر بعد الاختبار الطويل ان بعض اصناف ثمار التفاح تصاب باعراض طبيعية اذا حفظت على درجة متدنية كهذه لاسباب تتعلق بطبيعة الصنف ونوع المناخ الذي تكوّنت فيه و كيفية تعهدها في البستان مما يسبب تلفها ويجعل من المفضل حفظها بدرجة عليا . والمعروف ان حفظ ثمار التفاح في البراد على درجة



(معلوف)

الشكل رقم ٣٣ - صناديق تفاح معبأة حسب الاصول في طريقها الى الخارج . لاحظ كيفية تسيّف الصناديق على العربة ، ونوع العربة ، وطريقة رفع الصناديق الى مستودع الباخرة .

ونصف السنتيمتر في وسط الطبقة وستيمتراً وربع السنتيمتر على اطرافها ، فهذا ضروري جداً للمحافظة على الثمار من الاختلاط والرض اثناء النقل . اما اذا زاد ارتفاع الطبقة او قل عن ذلك فتصاب الثمار باضرار بالغة ابان تسيّف الصناديق في السيارات او القاطرات او البواخر واثناء نقلها الى الاسواق . ضع الورق المضلع الواقي والحشبتين عليه واقفل الصندوق بدقّة واحزم رأسه بالاسلاك المعدنية الخاصة (سمك مليمتر ونصف) محافظة عليه من التفكك . الصق على رأسه اوراق الدعارة وضعه في الموقع المعد له على ان يرتكز على جنبه دائماً .

مرتفعة (اي اكثر من ٤٠ درجة ف) لا يعجل في فنائها فحسب بل يتيح للامراض الفطرية الانتشار بسرعة وعطها . فلصياتها وجد ان افضل درجة لحفظ ثمار التفاح في البراد هي التي يبلغ فيها مجموع الحسارة الناتجة عن الاصابة من كل من الاعراض الطبيعية والامراض الفطرية والانحلال الطبيعي الحد الأدنى . واذا اخذت بالاعتبار طبيعة الاصناف واختلاف سرعة تنفسها بالاضافة الى ما تقدم تبين ان الطريقة المثلى في التبريد هي حفظ كل صنف من ثمار التفاح بمفرده بدرجة تلائم طبيعته وتراعي مدى تعرضه للاصابة بالامراض الفطرية والاعراض الطبيعية .

تأثير العوامل الطبيعية في مدة تبريد ثمار التفاح

لو تركت ثمار التفاح بعد قطفها في الاماكن الدافئة بدون تبريد لهلك اكثرها في فترة قصيرة من الزمن لاسباب عديدة اهمها ارتفاع الحرارة ؛ بينما لو حفظتها في البراد على درجة تتراوح بين الصفر ودرجتين فوق الصفر مئوية (٣٢ - ٣٦ ف) لأمكن حفظها سليمة بين شهرين وعشرة اشهر ، ويتوقف ذلك « أ » على صفات الاصناف « ب » والعوامل الطبيعية الطارئة اثناء نمو الثمار وبعد قطفها « ج » او بعد حفظها في البراد .

تأثير صفات الاصناف

اذا صرف النظر عن جميع العوامل التي تسبب عطب الثمار يتبين ان مقدرتها على الصمود في البراد تتوقف الى حد بعيد على صفاتها الطبيعية . فالاصناف المبكرة الصيفية باستثناء صنف او اثنين لا يمكن حفظها سوى فترة قصيرة جداً في البراد . وتفاوت مدة تبريد الاصناف الشتوية ما بين اربعة اشهر وعشرة ،

ينتج هذا التفاوت في مدة الحفظ من التباين في التركيب الطبيعي والكميائي، واليك مثلاً : ان الاصناف الصيفية هي سريعة التنفس والاصناف الخريفية بطيئة ، ولهذا الامر صلة وثقى بمدة التبريد لان الاصناف السريعة التنفس هي سريعة الانحلال والهلاك معاً . وكذلك يؤثر التركيب الطبيعي في مدى تعرض الاصناف للاصابة بالاعراض الطبيعية ؛ فبعضها لا يصاب بفتنة معروفة من هذه الاعراض بينما غيرها معرض للاصابة بها ؛ فيمكن حفظ ثمار الصنف جوناثان في البراد اكثر من ستة اشهر انما تعرضها للاصابة بعرض بقعة جوناثان يوجب بيعها في الاسواق قبل انتهاء مدة تبريدها بشهرين .

تأثير العوامل الطبيعية في الثمار قبل تبريدها

كما ان للعوامل الطبيعية اثرآ فعالاً في تكوين الثمار ونموها كذلك لها علاقة مباشرة بمدة حفظها في البراد . ويمكن تصنيف هذه العوامل الى فئتين : العوامل الطبيعية المؤثرة في الثمار ابان نموها على الاشجار وهي : درجة الحرارة ، والموسم ، ومقادير الماء ، وحجم الثمار ، ونقصان عنصر الفوسفور ؛ والعوامل المؤثرة بعد القطف وقبل التبريد وهي : درجة النضج ، وكيفية القطف ، والتعبئة ، وسرعة ادخال الثمار الى البراد .

درجة الحرارة اثناء النمو - ان لدرجة الحرارة اثناء نمو ثمار التفاح على اشجارها اثرآ كبيراً في مدة حفظها في البراد ؛ من ذلك تبين انه اذا تكونت ثمار بعض الاصناف في صيف معدل درجة حرارته اقل من ٦٠ ف تصاب باعراض طبيعية منها الانحلال الداخلي الذي يصيب الصنف يلونبوتن ، والجوف البني الذي يصيب الصنف ماكتوش . وتفسير ذلك انه قد تمتلى الفراغات بين

الخلايا بالماء فتختنق الثمرة لعدم تمكنها من التنفس وينتج من ذلك اصابتها بهذا النوع من الاعراض الذي يحدث فقط في صيف حرارته منخفضة جداً ولذلك عرفت باعراض «تنفس الحرارة المتدنية» (Low Temperature Respiration). كما ان الحرارة المرتفعة وخاصة في البلاد الجافة صيفاً والقليلة الغيوم تسبب عارض الجوف المائي الذي يصيب الاصناف رد ديليشس ، وجوناثان ، وروم بيوتي ، وواينساب ، وكنج ديفيد ، واستيمن واينساب .

الموسم - يختلف الطقس بين موسم وآخر ولذلك ينتظر ان تزداد او تقل اصابة ثمار التفاح بالاعراض الطبيعية وتختلف مدة التبريد تبعاً للموسم . وبات من الثابت ان تقل الاعراض الطبيعية في الموسم الذي لا تتعرض الثمار خلاله لدرجة حرارة مرتفعة او منخفضة جداً ، كما يساعد على ذلك ظهور الغيوم الظليلة وقلة الرطوبة .

كثرة الماء - لا تسبب كثرة استعمال مياه الري اضراراً بالغة لجذور الاشجار ونموها فحسب بل تعرض الثمار للاصابة بالاعراض الطبيعية ، فيصاب مثلاً اكثر اصناف التفاح باستثناء الصنف رد ديليشس بعرض النقرة المرة الذي تأكد ان كثرة الري تشجع ازدياده ، وهو يشكل خطراً كبيراً في الاقاليم الكثيرة المياه . واكثر ما تصاب به الاصناف كرافنشتين ونورثون اسباي واستيمن واينساب .

حجم الثمار - من الثابت ان حياة الثمار الكبيرة الحجم اقصر من حياة الثمار الصغيرة من الصنف نفسه، ويرجع السبب في ذلك الى ان الثمار الكبيرة تكون جدران خلاياها غالباً رقيقة جداً حتى ان ضغط العصارة في الخلايا يسبب انتفاخها فتمتلي الفراغات بين الخلايا وتضعف بذلك عملية التنفس فتختنق الثمرة ويقصر اجلها في البراد مما يساعد على ازدياد الاعراض المعروفة بالجوف المائي ،

والنقرة المرة ، وبقعة جوناثان . ولذلك لا ينصح بتشجيع انتاج ثمار كبيرة الحجم وخاصة في الاشجار الحديثة او السنوات الحفيضة الانتاج .

نقصان عنصر الفوسفور - يسبب نقصان عنصر الفوسفور النضج المبكر بثمار التفاح ويعرضها للاصابة بعرضي اللب البني والجوف البني (٢) . اما الفئة الثانية من العوامل الطبيعية المؤثرة في حياة الثمرة في البراد فهي درجة النضج ، وكيفية القطف ، وسرعة ادخال الثمار الى البراد .

درجة النضج - لقد ذكر ما لدرجة النضج من اهمية في وقاية ثمار التفاح من الاعراض الطبيعية وفي اطالة مدة تبريدها . فاذا قطفت الثمار قبل اوان قطافها بأسبوع واحد ولم تبلغ بعد الدرجة الاولى من النضج يزداد تعرضها للاصابة بعرض النقرة المرة وعرض قمر التفاح وخاصة اذا كثرت لونها الاخضر ؛ وقد تذبل في البراد لعدم قدرتها على اكمال نضجها الطبيعي . وكذلك اذا قطفت الثمار بعد فوات ميعاد نضجها بأسبوع واحد يزيد تعرضها للاصابة بعرضي الانحلال الداخلي والجوف المائي وتنقص مدة حفظها في البراد حتى ولو لم تصب بهذه الاعراض .

كيفية القطف والتعبئة - ان عدم المحافظة على سلامة الثمار حين القطف ، واثناء النقل ، والتعبئة ، ووقايتها من الحدوش والرضوض الناتجة عن الاهمال في القطف ، او اسقاطها الى الارض ، او ثقبها بواسطة الفروع او الاعناق ، او تفريرها في الصناديق بخشونة ، او سقوط الصناديق اثناء النقل او التسنيف يسمح بدخول الامراض الفطرية كالفنن الازرق الى داخلها الذي يمتد باكبور خسارة عن تلف ثمار التفاح من اي مرض او عرض آخر اذ يدخل الى لبها ويتغذى به فيعدهم . هذا مع العلم انه لا يمكنه الدخول الى لب الثمار من القشرة السليمة . وبما انه يستطيع النمو في البراد بدرجة حرارة منخفضة ولا تشل

حركة نموه سوى بدرجة ٣٢ ف (اي بدرجة صفر مئوية) ، وإذ لا يرغب أحياناً في حفظ الثمار بهذا المستوى لاسباب فنية لذلك وجبت وقاية الثمار من اضراره مهما كلف الامر ، وفضل الطرق هي المحافظة على سلامة قشرة الثمرة .

ينبغي الاحتراس من خلط الاصناف عند التعبئة اذ ان لكل صنف مدة محدودة للحفاظ في البراد ؛ ويجب الانتباه ايضاً الى عدم خلط الثمار غير الناضجة والناضجة اذ يسبب ذلك تبايناً في حالة الثمار عند عرضها في الاسواق وقد يهترى بعضها ويذبل البعض الآخر .

سرعة ادخال الثمار الى البراد - لقد اصبح معلوماً انه اذا قطف ثمار التفاح وهي بالغة اول درجة النضج ووضعت في غرفة تساوي درجة حرارتها درجة حرارة البستان ترتفع سرعة التنفس فيها ويقصر اجلها اكثر منه في بقائها على الشجرة . اما اذا قطف الثمار وحفظت في البراد في بدء دخولها ذروة الحيوية فيطول تبريدها لان التنفس يكاد يتوقف وتصبح حيويتها بطيئة جداً . وقد استدل البعض على ان ثمار التفاح المحفوظة بدرجة ٥٠ ف تنفس بسرعة تساوي ثلاثة اضعاف مقدرتها على التنفس وهي محفوظة بدرجة ٣٢ ف (اي بدرجة صفر مئوية) فترتفع سرعة التنفس هذه الى تسعة اضعاف اذا تركت الثمار بدون تبريد بدرجة ٨٦ ف . وهذا يعني ان كل يوم تترك فيه الثمار خارج البراد بدرجة ٨٦ ف بعد قطفها يساوي ١٩ يوماً من حفظها فيه بدرجة ٣٢ ف . ولذلك تخسر الثمار من امكانية حفظها في البراد ١٩ يوماً مقابل كل يوم تتأخر فيه ببقائها خارجاً بعد القطف (٥) . واذا تذكرنا ان سرعة التنفس في ثمار التفاح تزداد كثيراً بعد القطف مباشرة بغض النظر عن ارتفاع درجة الحرارة شعرنا باهمية ادخال الثمار الى البراد حال قطفها . زد على ذلك انه اذا دخلت الامراض الفطرية الى لب الثمار وهي خارج البراد وتمكنت من البدء في النمو

فلا يمكن ايقافها اذ تستطيع النمو ببطء في البراد ولو انخفضت الحرارة فيه الى درجة ٣٢ ف (١١) . ولقد اقتنع الكثيرون بما تقدم ووافقوا على فائدة ادخال الثمار الى البراد قبل غسلها وتوضيها وتعبئتها في المواقع الدافئة على ان تجري هذه العمليات فيما بعد في الايام الباردة . والامر الهام هو سرعة ادخال الثمار الى البراد دون ان تتأخر خارجة اكثر من يومين بعد القطف .

تأثير العوامل الطبيعية اثناء التبريد

ثمة ثلاثة عوامل هامة يجب بحثها اثناء حفظ الثمار في البراد وهي : درجة الحرارة ، ونسبة الرطوبة ، وتجمُّع الغازات الناتجة من تنفس الثمار .

درجة حرارة البراد - تتجمد ثمار التفاح اذا ما هبطت درجة الحرارة في البراد الى ٢٨ درجة فهرنهايت وتصبح غير صالحة للتبريد ؛ فحين اخراجها منه يذوب الصقيع وتنحل الثمار حالاً لانفجار خلاياها واندلاق محتوياتها في الفراغات وبذلك تصبح الثمرة جساماً هامداً . وقد وجد ان افضل درجة لحفظ ثمار التفاح اطول مدة بدون ان تتأثر حيويتها هي ٣١ - ٣٢ ف . وحتى زمن قريب كانت هذه الدرجة تعتبر ضرورية جداً لوقاية الثمار من اضرار الاصابة بالعفن الازرق وعرض قمر التفاح اللذين يصيبان اكثر الاصناف اذ يمكن ان ترتفع نسبة الاصابة بهما ارتفاعاً مفاجئاً اذا حفظت الثمار في البراد بدرجة اعلى مما ذكرنا . وقد اشغل العلماء ارتفاع نسبة اصابة بعض اصناف ثمار التفاح ببعض الاعراض الطبيعية بحفظها بهذه الدرجة المتدنية ، ثم اكتشفوا ان افضل طريقة لملافاة تلك الأضرار هي تبريد الأصناف المعرضة للاصابة على درجة ٣٥ - ٣٦ ف . وقد ثبت ان الثمار المرشوشة والمقطوفة بعناية بعد بلوغها الدرجة الاولى في النضج والمغلقة باوراق مشبعة بالزيوت المعدنية قلما تصاب بالامراض الفطرية او بعرض قمر التفاح ، ولذلك يمكن حفظها في براد درجة حرارته ٣٦ ف بدون ضرر او

خسارة ، ولكن هذا يقصر اجلها . اما اذا لم يمكن السيطرة على هذه العوامل فالأفضل حفظ الثمار بدرجة ٣٢ ف وعندئذ يجب على صاحبها ان يتوقع ظهور اعراض طبيعية في بعض الأصناف تسبب له خسارة كبيرة . فالأفضل تبريد كل صنف على حدة وبمعدل حرارة مناسبة لطبيعته . فيجب اذن حفظ الأصناف المعرضة للاصابة بالأعراض الناشئة عن « التنفس بالحرارة المنخفضة » بمعدل ٣٦ درجة ف ، اما سائر الأصناف وهي الأكثرية فالأفضل حفظها بمعدل ٣١ - ٣٢ درجة ف .

نسبة الرطوبة - اذا حفظت ثمار التفاح في غرفة حرارتها طبيعية يظهر بعد وقت قصير انكماش او تجعد في القشرة نتيجة لتبخر الماء منها، وقد تزداد هذه الظاهرة حتى تذبل الثمار وتجف . وتختلف ثمار التفاح بسرعة ذوبها تبعاً للأصناف ، فالأصناف التي تكون أكثر من سواها معرضاً للذبول هي التي تصاب بالصدأ او تشقق القشرة ؛ واكثرها تعرضاً هو الصنف كولدن ديليشس .

اما اذا حفظت ثمار التفاح في البراد على درجة ٣٢ ف فان عملية الذبول تستمر ببطء الا اذا رفعت نسبة الرطوبة الى ٨٥ ٪ وبذلك يمكن المحافظة على صلابة الثمار وطعمها ووزنها ومنظرها . وبما انه بارتفاع درجة الحرارة يزداد الذبول وجب رفع نسبة الرطوبة في غرف التبريد الى ٩٠ ٪ اذا حفظت الثمار على درجة ٣٥ - ٣٦ ف .

تجمع الغازات - تتكون وتتجمع مقادير لا يستهان بها من الغازات اثناء عملية تنفس ثمار التفاح في البراد، فيجب ازلتها بتغيير الهواء بين آونة واخرى . ويعمل تجمع غاز الاثلين على اسراع عملية النضج ، واذا زاد غاز ثاني اوكسيد الكربون عن نسبة ١٢ ٪ من هواء غرف التبريد لمدة طويلة يسبب اصابة الثمار بعرض قمر التفاح ، وتفضل والحالة هذه المحافظة على نسبة الاوكسجين الطبيعية

في غرف التبريد لان انخفاضه الى اقل من ٢ ٪ يسبب اختناق الثمار ويصبح طعمها اشبه بطعم الحمر .

الهواء المكثف - يتبين من البحث السابق ان نسبة الاوكسجين الى ثاني

او كسيد الكربون امر هام في حفظ ثمار التفاح في البراد . وقد اجري العلماء الابحاث في هذا الصدد لايجاد افضل نسبة لحفظ ثمار التفاح محاولين التخلص من اضرار الاعراض الطبيعية، فاكتشفوا بعد جهد اميرين هامين : اولاً امكان حفظ ثمار التفاح في براد درجة حرارته ٣٦ ف دون ان تصاب باعراض طبيعية مدة لا تقل عن مدة حفظها في براد درجة حرارته ٣٢ ف اذا استعملت النسب الصحيحة من هذين الغازين . ثانياً اختلاف نسبة الاوكسجين عن نسبة ثاني اوكسيد الكربون اللازم استعمالها في غرف التبريد تبعاً للأصناف . وعلى هذا الاساس شيد في انكلترا اكثر من مائتي براد بالهواء المكثف لحفظ ثمار التفاح . وبموجب هذه النظرية تخفض نسبة الأوكسجين وترفع نسبة ثاني اوكسيد الكربون في غرف التبريد بحسب طلب الأصناف . فالصنف ماكتوش مثلاً الذي لا يحفظ اكثر من شهرين في البراد العادي يمكن حفظه لمدة سبعة اشهر في براد مكثف بالهواء درجة حرارته ٤٠ ف على ان تخفض نسبة الاوكسجين في غرفة البراد الى ٥،٢ ٪ وثاني اوكسيد الكربون الى ٥ ٪ فقط . ويحفظ الصنف يلونيوتن بنسبة ١٠ ٪ من الاوكسجين و ١٠ ٪ من ثاني اوكسيد الكربون . ويشترط حين حفظ ثمار التفاح بهذه الطريقة ان تقطف ناضجة وتدخل الى البراد حال قطفها .

وتدل احداث الابحاث الاميركية ان وضع ثمار التفاح في غرف تحتوي على نسبة تتراوح بين ٢٥ - ٣٥ ٪ من ثاني اوكسيد الكربون لمدة يومين ثم حفظها في البراد العادي بدرجة ٣٢ ف يمنع اصابها بالأعراض الطبيعية المسببة عن انخفاض درجة الحرارة في الصيف .

وسائل التبريد

لا يتسع لنا بحث تطور اساليب تبريد التفاح منذ البدء بهذا العمل ، ونكتفي بالتنبؤ انه بينما نرى البعض يحفظ ثماره في البلاد الشديدة البرودة في برادات طبيعية بسيطة يستعمل البعض الآخر البرادات الآلية على انواعها، ولا يحتمل ان يقف التطور في بناء البرادات عند هذا الحد بل سيتبعه انقلاب في تصميم الآلات وكيفية التبريد لأن الوسائل المستعملة الى الآن ليست كاملة ولا مرضية .

ونظرياً التبريد الآلي بسيطة اذا انها تهدف الى امتصاص الحرارة من مستودع التبريد عن طريق تبخر الغازات . فالمعروف مثلاً انه اذا جعل غاز الامونيا سائلاً بواسطة آلات الضغط واطلق سراحه يرجع الى طبيعته حالاً، وفي اثناء تغييره من سائل الى غاز يحتاج الى الحرارة التي يمتصها من محيطه وبذلك يخفض درجة حرارة الاشياء المحيطة به . فاذا ضغط هذا الغاز وحول الى سائل وسيّر في انابيب خاصة مجتازة غراً معدة للتبريد يتبخر الغاز في الانابيب عند وصوله الى الغرف ويرجع الى حالته الطبيعية كغاز وبذلك يلتقط الحرارة الموجودة فيها . وقد استعمل المهندسون هذه النظرية كنقطة انطلاق وتباروا في ابتكار اساليب التبريد، فمنهم من استخدم غاز الفريون او غاز ثاني اوكسيد الكربون بدلاً من غاز الامونيا . واستعمل بعضهم الانابيب الملتوية وسيّر الهواء عليها بدلاً من الانابيب المعلقة، الى آخر ما هنالك من طرق التبريد المتنوعة . واهم اساليب التبريد ثلاثة: التبريد بواسطة الانابيب المعلقة ، والتبريد بواسطة الهواء المدفوع ، والتبريد بالهواء المكثف .

التبريد بواسطة الانابيب المعلقة : يسير الغاز بهذه الطريقة من الآلة الضاغطة ماراً بواسطة الانابيب المعلقة في غرف التبريد فيلتقط الحرارة منها ويرجع الى

خزان الغاز . ومن سيئات هذه الطريقة ان الثلج كثيراً ما يتجمع خارج الانابيب فتضعف مقدرتها على التبريد وتنخفض درجة الرطوبة لتجمد الماء . وكذلك يصعب تغيير الهواء في غرف التبريد بدون ادخال هواء مرتفع الحرارة من الخارج . ويعتبر سقف الغرفة افضل موقع لتعليق انابيب التبريد لان الهواء البارد ينحدر الى اسفل الغرفة بتساوي وانتظام .

التبريد بواسطة الهواء المدفوع : يسيل الغاز المضغوط في انابيب ملتوية ومتجمعة في صندوق من المعدن اشبه بخزان الماء في السيارات يعلق في اعلى احد جوانب غرفة التبريد وهناك يتحول السائل الى غاز ويحدث البرودة . ولكي توزع البرودة من الصندوق وتنتشر في غرفة التبريد تسيّر مراوح خاصة تدفع الهواء البارد من خلال تلك المواسير فتتخفض حرارته وينتشر في جميع أنحاء الغرفة ويخرج منها عن طريق آخر . وهناك نوعان من الآلات التي تؤمن هذه الطريقة يعرف احدهما بالانابيب المرطبة (Wet Coil) والآخر بالانابيب الجافة (Dry Coil) . فالنوع الاول هو الافضل لتبريد الثمار لمحافظة على درجة الرطوبة الضرورية دون ان يسبب جفافاً . فبطريقة الانابيب المرطبة يسيل ماء مذوب فيه قليل من الملح على سطح الانابيب ليمنع تجمع الثلج عليها ، كما ان الهواء البارد يتربط ، وهذا عمل ضروري لحفظ الثمار من الذبول ونقص الوزن . اما النوع الثاني فلا يستحسن استعماله في تبريد الثمار لانه يسبب ذبولها ونقصان وزنها اذا لم تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على نسبة الرطوبة .

التبريد بالهواء المكثف : تبرد هذه الغرف بواسطة الانابيب المعلقة فقط، وهي اذاً لا تعتبر من هذه الناحية اسلوباً جديداً في خفض الحرارة انما تختلف في كيفية اجراء التبريد لاختلاف بناء غرفها من الداخل عن بناء غرف التبريد العادية اذ يجب محافظتها على ضبط نسبة غاز الاوكسجين الى غاز ثاني اوكسيد

الكربون لثلا يتسربا منها الى الخارج . ولذلك يجب تلبس جدران هذه الغرف من الداخل بالمعدن الخاص وهكذا تصبح كثيرة النفقة . وللحصول على النسبة الموافقة للصف المخزون فيها يسمح لغاز ثاني او كسيد الكربون الذي يتولد نتيجة لتنفس الثمار بالتجمع في الغرفة الى النسبة المرغوبة وبذلك تنخفض نسبة غاز الاوكسجين ايضاً . وللتأكد من صحة هذه النسبة يعلّق على خارج جدار غرفة التبريد مقياس يتصل بداخلها بانبوب ويعرف هذا المقياس باسم كثاروميتر (Katharometer) . وهناك طريقة افضل للحصول على النسبة المرغوبة وهي ادخال الاوكسجين وثاني او كسيد الكربون الى الغرفة بالنسبة الملائمة بواسطة آلات معدة خصوصاً لهذا العمل وهي توضع خارج الغرفة .

كيفية تبريد الثمار

حالة الثمار - يترب على المسؤول عن تبريد ثمار التفاح ان يتأكد من صحة توضعها ودرجة نضجها ومعرفة اصنافها وذلك باجراء كشف عام قبل ادخال الثمار الى البراد وتدوين ملاحظاته في دفتر خاص ليستعين بها على تقدير موعد اخراج الثمار. ان هذا الفحص ضروري ايضاً لتحديد المسؤولية اذا تلفت الثمار لسبب ما قبل او ان اخراجها .

حالة غرفة التبريد - يجب ان تكون الغرفة خالية من روائح المواد المحفوظة وخالية من الامراض الفطرية، ولذلك ينصح ان تبخر فارغة بواسطة غاز ثاني او كسيد الكبريت وتجري تهويتها ثم يدخل اليها غاز الاوزون المحافظ على نظافة الغرفة من الامراض والمساعد على احتفاظ الثمار برائحتها وطعمها الطبيعيين اثناء التبريد . لا ينصح ان يحفظ في البراد اي نوع من المأكولات مع ثمار التفاح لان رائحة الثمار القوية تؤثر في طعمها وقد تسبب تلفها .

التبريد الاولي Pre-Cooling - ان ادخال ثمار التفاح الى غرف التبريد الدائمة مباشرة خطأ ينجم عنه ضرر كبير . ويرجع السبب في ذلك الى احتفاظ الثمار التي تدخل البراد لاول مرة بمقدار كبير من الحرارة لا يمكن خفضها بالسرعة المرغوبة ، فكثيراً ما يتطلب انخفاض الحرارة فيها الى ٣٢ درجة ف من اسبوع الى عشرة ايام وهذا يقصر مدة حفظ الثمار في البراد. كما ان ادخال الثمار الى غرفة التبريد يرفع حرارتها وهذا يسيء الى حالة الثمار الموجودة في الغرفة . فالانسب ادخال الثمار المعبأة الى غرفة خاصة لكي يجري تبريدها في مدة لا تتجاوز اربعين ساعة ثم تنقل الى غرفة التبريد الدائمة بعد ان تكون انخفضت حرارتها كلياً الى درجة ٣٢ ف .

وثمة طريقة خاصة لحفض درجة الحرارة بسرعة ولتقدير ما يلزم الثمار من البرودة . فاذا افترضنا وجوب تبريد ١٨٠٠٠ كيلوغرام من ثمار التفاح من ٨٢ درجة ف الى ٣٢ درجة ف (اي صفر) فان تذيب كل كيلوغرام من الثلج يتطلب اتفاق ٢٨٨ وحدة حرارية (B. T. U.) وكل درجة بمقياس فهرنهايت تساوي ١٤٨٠ من الوحدة الحرارية ، فتصبح المعادلة كما يلي :

$$٨٢ - ٣٢ = ٥٠ \text{ درجة ف مقدار الانخفاض .}$$

$$٥٠ \times ١٨٠٠٠ \times ١٤٨ = ٥٦٢٥ \text{ كيلوغراماً من الثلج وهي الكمية الضرورية}$$

$$٢٨٨ \text{ لحفض الحرارة من } ٨٢ \text{ درجة ف الى } ٣٢ \text{ درجة ف . اضع}$$

الى ذلك ٣٠٪ من هذا الوزن للحرارة التي تتولد اثناء تنفس الثمار، تصبح كمية الثلج الحقيقية الضرورية لحفض درجة الحرارة الموجودة في الثمار الى ٣٢ درجة ف هي ٧٣١٢ كيلوغراماً من الثلج او ما يساويها من البرودة .

تستيف صناديق ثمار التفاح - يجب ان تنقل الصناديق المعبأة بالثمار الى البراد بلطف لثلا تتكسر لدقة خشبها وثقلها، فاذا انكسرت ترتض الثمار وتخدش

وتصبح غير صالحة للتبريد . توضع الصناديق في غرفة التبريد الدائمة على الواح من الخشب ترتفع عن الارض بضعة سنتيمترات وتستف على جنبها بعضها فوق بعض حتى سقف الغرفة على ان يتروك فراغ بمقدار بوصة الى جوانب الصندوق الاربعة لتسهيل تغيير هواء الغرفة وتساوي حرارتها . كما انه يجب ترك بمرات واسعة بين مجموعات الصناديق للسماح بالتنقل اثناء اجراء الكشف عليها .

غرف التبريد الدائمة - تنقل ثمار التفاح بسرعة من غرفة التبريد الاولي الى غرف التبريد الدائمة وتستف كما ذكر آنفاً . واهم الامور الواجب ملاحظتها في البراد هي ثلاثة : (١) الحرارة (٢) والرطوبة (٣) والتهوية .

(١) الحرارة - تتوقف درجة الحرارة الواجبة لتبريد ثمار التفاح على اصنافه وعلى نوع الاعراض الطبيعية التي تصاب بها في البراد ، وعلى مدة تبريدها . وقد ثبت ان درجة ٣١ - ٣٢ ف هي الفضلى لحفظ اكثر اصناف التفاح اطول مدة ممكنة . فيها تحفظ الثمار من انتشار الامراض الفطرية وتضان من الاصابة ببعض الاعراض الطبيعية مثل قمر التفاح ، وبقعة جوناثان ، والانحلال الداخلي ، وبها تحتفظ الثمار بطعمها الطبيعي . اما اذا رغب في حفظ الثمار مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فيمكن استخدام درجة ٣٦ ف . وكذلك الاصناف التي تصاب باعراض طبيعية لحفظها في البراد بدرجة ٣٢ ف يجب استخدام درجة ٣٦ ف في تبريدها . ومن هذه الاصناف جوناثان وماكتوش ويلونبوتن واحياناً كولدن ديليشس وروم بيوتي وونتر بنانا .

من الامور الواجب الانتباه اليها عدم ارتفاع الحرارة وهبوطها المفاجيء لان ذلك يقصر مدة حفظ الثمار . ولتحقق تساوي درجة الحرارة يجب وضع عدة مقاييس لها في اطراف الغرفة ووسطها والكشف عليها لا اقل من مرتين في

اليوم وتسجيل القراءة . كما يحذر من ابقاء ابواب الغرفة مفتوحة عفواً او وضع اي نوع آخر من الثمار والمحاصيل الزراعية او غيرها من المأكولات في الغرفة نفسها .

(ب) الرطوبة - يضر الهواء المشبع بالرطوبة بالثمار لانه يسبب نمو الامراض الفطرية ؛ وكذلك يسبب انخفاض نسبة الرطوبة جفافاً في الثمار فينقص وزنها . فالثمار المحفوظة على معدل ٣٢ درجة ف يفضل ان تكون نسبة الرطوبة في غرفتها ٨٥٪ ، واذا كانت درجة الحرارة ٣٦ ف وجب رفع الرطوبة الى ٩٠٪ ، ويعمد بعض المزارعين الى تشريب خشب الصناديق بالماء قبل تعبئتها لانها اذا ادخلت جافة تمتص من الرطوبة في غرف التبريد . والافضل وضع المقاييس الصحيحة للرطوبة ورش ارض الغرف بالماء او وضع الاكياس المبللة في الممرات اذا لم يمكن المحافظة على الرطوبة عن طريق الهواء الرطب .

(ج) التهوية - يجب تهوية الغرف من الغازات والروائح وادخال غاز الاوزون اليها محافظة على طعم الثمار ومنعاً لنمو الامراض الفطرية .

الكشف على الثمار - يجب الكشف على درجة الحرارة والرطوبة مرتين في اليوم على اقل تقدير . كما يجب الكشف على حالة الثمار مرتين في الشهر في بادىء الامر ومرة في الاسبوع في آخر مدة التبريد للتثبت من عدم تلفها ولتقدير ما تبقى من مدة حفظها . وبهذه المناسبة يمكن التأكيد انه كلما طالت مدة الحفظ في البراد قصرت مدة عرض الثمار في الاسواق ؛ فبينما يمكن عرض الثمار المحفوظة ثلاثة اشهر في البراد لمدة عشرين يوماً في الاسواق لا يمكن عرضها اكثر من اسبوع واحد اذا حفظت ثمانية اشهر دون ان تلف .

اخراج الثمار من البراد - قبل اخراج الثمار من غرف التبريد يجب رفع الحرارة تدريجياً ثم نقل الثمار الى غرف التبريد الاولي حيث ترتفع الحرارة الى

هذا وقد تفاوتت مدة الاصناف كما ذكر سابقاً فتتقص مدة حفظ صنف طويل الامد وتزداد مدة حفظ صنف متوسط الامد تبعاً لنوع المناخ والتربة وطريقة التعمد، ولذلك يجب ان لا ينظر الى هذه المجموعات انها غير قابلة للتغيير الا اذا كانت هذه الاصناف مغروسة في اقليم واحد وبإشراف شخص مسؤول .

٥٠ درجة ف وتبقى النار فيها الى ان تدفأ بعض الدفء ثم تنقل الى الخارج .
بهذه الطريقة يمنع تكاثف الرطوبة على النار بسبب تغيير درجة الحرارة المفاجيء .

مدة تبريد ثمار التفاح

يصعب التدقيق في تقدير مدة حفظ اصناف ثمار التفاح المتنوعة في البراد لاختلاف طبيعتها من اقليم الى آخر ولتنوع مناخ الاقاليم وطرق التعمد ومدى تعرض الثمار للاصابة بالاعراض الطبيعية من موسم الى آخر . انما يمكن اعطاء فكرة تقريبية عن مدة حفظ الاصناف بنسبة بعضها الى بعض في احوال طبيعية :

المجموعة الاولى : الاصناف التي تحفظ مدة قصيرة :

رد استراخان (لا يمكن حفظه مطلقاً) . رد جيون .

المجموعة الثانية : الاصناف التي تحفظ مدة قصيرة الى متوسطة (من شهرين

الى اربعة اشهر) :

كرافنشتين ، ماكتوش ، بيزكود (سان باري او ممشح كبير) .

المجموعة الثالثة : الاصناف التي تحفظ لمدة متوسطة (اقصاها ستة اشهر) :

يلو بلفلور ، كنج ديفيد ، جوناثان ، ونتربنانا .

المجموعة الرابعة : الاصناف التي تحفظ مدة طويلة (خمسة الى سبعة اشهر) :

كوكس اورنج (ممشح صغير) ، اسبترنبرك ، استيمن واينساب ، رد ديليشس

(استاركن) ، ونورثون اسباي .

المجموعة الخامسة : الاصناف التي تحفظ مدة طويلة جداً (سبعة الى

عشرة اشهر) : رينيت دي كندا ، روم بيوتي ، يلونيوتن ، كولدن ديليشس ،

واينساب .

الباب الخامس

اصناف التفاح

يكشف هذا البحث عن سر كثرة اصناف التفاح، وكيفية نشأتها وتطورها، ويقدم اوصاف اهمها تجارياً . ولا يسعنا الا الاعتراف بان جزءاً نظرياً غير يسير من البحث صعب الادراك وضع لاعتباره ضرورياً بالنسبة لاكتشاف اصناف جديدة؛ غير ان وصف الاصناف المدرجة امر لا مندوحة منه نسبة لبعض الاصناف المجهولة حتى الآن في الشرق الأدنى، وهي اصناف يجب ادخالها وغرسها في المواقع غير الصالحة لنمو الأصناف الحاضرة وقتئذ في هذا البلد. فقد ادخلت اوصاف اصناف تلائم المواقع الكثيرة الارتفاع والباردة صيفاً، وأصناف تلائم المواقع الدافئة، واخرى تلائم الأسواق المحلية الصيفية او الأسواق التجارية العالمية. وجدير بالذكر اننا جمعنا اوصاف تسعة عشر صنفاً من التفاح من هنا وهناك وذلك لأول مرة لفقدانها بكامل تفاصيلها من قبل وصهرناها في بوتقة موجزة بعد التدقيق في صحتها. ولا يغرب عن البال انه يتعذر موافقة هذه الاوصاف تمام الموافقة للأصناف المزروعة في مواقع متنوعة لما لاختلاف البيئة من تأثير فيها.

مراجع الباب الرابع

- ١ ل. ه. مكديانيس - تركيب ثمار التفاح وثمار تفاحية اخرى - مجلة التجارب الزراعية جامعة كورنيل . نيويورك مذكرة رقم ٢٣٠ سنة ١٩٤٠ .
- ٢ و. ه. تشاندر - نباتين الاشجار المتنافسة الاوراق - كتاب - ١٩٤٧ .
- ٣ ف. ر. كاردر وف. س. براد فورد و. ه. و. هووكر - مبادئ انتاج التمار - كتاب - سنة ١٩٣٩ .
- ٤ ي. س. اوختر و. ه. ب. ناب - زراعة اشجار البساتين والاشجار الصغيرة - كتاب - سنة ١٩٣٧ .
- ٥ ج. ه. كورلي وف. س. هوليت - الطرق الحديثة لانتاج التمار - كتاب - سنة ١٩٤١ .
- ٦ ف. و. الن - رسائل خاصة مع المؤلف سنة ١٩٥٠ .
- ٧ س. و. النود وموريس وسلفر - ازالة بقايا مواد الرش عن ثمار التفاح . مجلة محطة التجارب الزراعية في اوهايو رقم ٥٨٤ سنة ١٩٣٧ .
- ٨ و. س. هاو - بقايا مواد الرش وكيفية ازلتها عن ثمار التفاح - مجلة محطة التجارب الزراعية في ولاية فرجينيا رقم ٣٠٢ سنة ١٩٣٦ .
- ٩ ه. ه. بلاج وت. ج. ماني وب. س. بيكيت - امراض التفاح العارضة في البراد - مجلة محطة التجارب الزراعية في ولاية ايوا رقم ٣٢٩ سنة ١٩٣٥ .
- ١٠ ج. و. لويد وس. و. ديكر - العوامل المؤثرة في تبريد صناديق التفاح - مجلة محطة التجارب الزراعية في ولاية الينوي رقم ٤١٠ سنة ١٩٣٤ .
- ١١ ي. ل. أوفر هولسر وب. د. موزس - تبريد الثمار الطازجة ودرجات الحرارة في سيارات النقل واماكن الحفظ - مجلة محطة التجارب الزراعية في ولاية كاليفورنيا رقم ٤٩٦ سنة ١٩٣٠ .
- ١٢ ف. و. الن - زراعة التفاح في كاليفورنيا - النشرة الارشادية رقم ١٧٨ تاريخ ايلول ١٩٥١ .

الفصل الحادي والعشرون

منشأ اصناف التفاح

اسم شجرة التفاح العلمي - شجرة التفاح من الفصيلة الوردية (*Rosaceae*) والقبيلة التفاحية (*Pomideae*) الجامعة لاشجار التفاح والكمثرى والسفرجل والاكيدنيا . واسم التفاح العلمي الذي تعترف به حالياً أكثر الهيئات المعنية في انكلترا واوروبا هو بيوس مالس (*Pyrus malus*)؛ الا ان الابحاث النباتية الحديثة احدثت انشقاقاً في صفوف العلماء ، فعلماء النبات يعتبرون التفاح والكمثرى (الاجاص) من جنس واحد ولا يزالون متمسكين بهذا الاسم ؛ ولكن هنالك كثيرين من علماء الاشجار المثمرة وخاصة في اميركا يرون تبايناً في التركيب النباتي بين التفاح والكمثرى ويؤيدون وضعها في جنسين منفصلين وهم يطلقون على التفاح اسماً مختلفة ؛ وفي طبيعتهم علماء دائرة الزراعة في الولايات المتحدة الاميركية الذين تبنوا الاسم مالس سلفسترس وهو الأصل البري المعروف في اوروبا باسم مالس كوميونس ؛ وكذلك اعتبر متحف ارنولد النباتي ان الاسم الصحيح هو مالس بوميليا، كما اعتبر العالم الزراعي الأميركي الشهير وليم تشاندلر ان الاسم مالس دوميستكا (*Malus domestica, Borkh.*) هو الافضل ؛ ويميل اكثر الذين يبررون فصل التفاح عن الكمثرى نباتياً الى ان الاسم الاخير هو الاصح من الوجهة العلمية الحديثة .

انواع اشجار التفاح - تقدر الأنواع الموجودة في الجنس مالس (*Malus*) باكثر من خمسين نوعاً ولا قيمة علمية او تجارية لأكثرها ، وتعتبر الانواع التالية المصدر الرئيسي لألوف من اصناف التفاح الموجودة حالياً في العالم : النوع مالس سلفسترس (*Malus sylvestris, Mill*) وهو النوع نفسه المعروف بمالس كوميونس (*Malus communis, L.*) ؛ مالس بوميليا (*Malus pumilia, Mill*) ؛ ومالس كوروناريا (*Malus coronaria, Mill*) ؛ ومالس دوميستكا (*Malus domestica, Borkh.*) ويطلق هذا الاسم على الاصناف المكثر في البساتين ؛ ومالس فيرجينا (*Malus virginiana*) ؛ ومالس بكانا (*Malus baccata, L.*) او التفاح السيبيري . اما الأصناف البلدية فليست بوية الأصل بل هي اصناف انحدرت من النوع مالس دوميستكا وضعفت صفاتها بالتهجين مع الانواع الربيثة . هذا ولم يذكر علماء النبات وجود التفاح البري في لبنان وسوريا الا انه يجب اعادة النظر في هذا الزعم للتأكد من صحته لأن اشجار التفاح البري وجدت في فلسطين في حالتها الطبيعية قوية النمو متينة البنية وذات اوراق جلدية صغيرة لامعة ، ثمارها صغيرة قليلة اللب كثيرة البذور لا تؤكل ، وتصدر اشجارها فسائل بكثرة وتتجانس مع بعض اصناف التفاح التجارية .

منشأ الأصناف - يقدر العلماء وجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف صنف من التفاح نامية في البساتين والاحراج ويتعذر معرفة منشأها بل جلها من بذور نبتت في الأحراج كالأصناف النامية في الأحراج الأميركية التي قام بغرسها المهاجرون الأميركيون ؛ وافلها نشأ من بذور نبتت عفواً في البساتين واصلها هو الصنف كولدن ديليشس . ولقد اعتقد العلماء منذ امد قريب ان اصناف التفاح لا تنشأ الا من البذور ، ولكن بطل هذا الاعتقاد لما ظهرت اصناف واشباه اصناف في البساتين على اشجار مطعمة ، فلقت هذا الامر انظار الكثيرين من

المزارعين والعلماء الذين بدأوا بمراقبة نمو الأشجار المطعمة بحثاً عن اصناف جديدة ذات صفات جيدة كما أنهم عمدوا الى الطرق العلمية للوصول الى هذه الغاية . يُستدل من هذا البحث ان هنالك ثلاث طرق تنشأ بواسطتها اصناف التفاح الجديدة : اولاً الاصناف التي تنشأ نتيجة لظهور طفرة في الاجزاء الخضرية . ثانياً الاصناف التي تنشأ من البذور بطريقة طبيعية . ثالثاً الاصناف التي تنشأ عن تأصيل البذور بالطرق العلمية .

الاصناف التي تنشأ نتيجة لظهور طفرة في الاجزاء الخضرية - ينسدر
ان تطعم شجرة تفاح من صنف معروف بالبرعم وينتج من ذلك صنف جديد لان صفات الخلية الخضرية ثابتة لا تتغير الا في ظروف غير طبيعية ، فاذا شذت الطبيعة فقد ينتج شبه صنف جديد لا يختلف عن اصله كثيراً . ولتفسير هذه الظاهرة لا بد من ايضاح ما يحدث في الخلية الخضرية من تطور . سبق ذكر احتواء خلية التفاح الخضرية على اربعة وثلاثين قصبياً (كروموزوم) تحمل جميع صفات الصنف الموروثة ؛ ينقسم اثناء النمو وتكاثر الخلية الخضرية الطبيعي كل قصب (صبغية) من هذه القضبان طولاً الى نصفين متساويين يحمل كل منهما صفات الصنف كاملة ضمن مجموعة مكونة من اربعة وثلاثين قصبياً وتسير كل مجموعة من القضبان بعد الانقسام الى احد قطبي الخلية ويتكون بينهما جدار فاصل ، ويتم انقسام الخلية الى خليتين متماثلتين تحملان من القضبان العدد الاصلي نفسه والصفات الاصلية التي يتميز بها الصنف وذلك نتيجة لانقسام القضبان طولاً . فاذا أخذت برعمة من هذه الشجرة وطعمت ينتج منها شجرة تحمل صفات الصنف الاصلية .

ويندر ان لا يتم تكوين الجدار الفاصل بين هاتين الخليتين بعد انقسام القضبان فتبقىان خلية واحدة في داخلها ضعف العدد الطبيعي من القضبان فينتج من ذلك خلية خضرية تختلف صفاتها قليلاً عن صفات الصنف النامية عليه . فاذا

صدف ان الخلية سببت تكوين غصن او برعمة وطعمت هذه البرعمة في شجرة تفاح يتكون صنف يشبه الصنف الاصلي ويكون اقوى نمواً منه ، وتكون اوراقه وثماره اكبر حجماً من الصنف الاصلي . كما يحدث ان لا ينفصل ابان انقسام القضبان جزء يسير من احدها بل يبقى ملتصقاً باحد النصفين فيصبح بذلك احد نصفي الخلية اكبر من الآخر وتتكون باكتمال تكوين الجدار الفاصل خليتان تحتويان على عدد شاذ من القضبان وتختلفان بعض الاختلاف عن الصنف الاصيل . فاذا صدف ان تلك الخلية كونت غصناً او برعمة وطعمت هذه البرعمة في شجرة تفاح يتكون صنف يختلف قليلاً عن الصنف الاصلي وغالباً ما يكون ذلك في اللون . وتدعى جميع الظواهر الناتجة من الشذوذ في انقسام الخلايا الخضرية طفرات (Mutations) وفيما يلي بعض اصناف التفاح التي ظهرت الطفرات على اشجارها :

الصف	الطفرة
رد ديليشس	استاركن، رتشا-رد، شوتويل ديليشس، دبل رد ديليشس.
كرافنشتين	بانكس ، تريبل رد كرافنشتين ، كريمزن كرافنشتين .
جوناثان	جونا - رد ، بلاكجون .
ماكتوش	بلاكماك .
نودوثون اسباي	رد اسباي .
استين واينساب	استيا - رد ، بلاكستين ، اسكارليت استيا - رد .
يورك اميريل	كولورا ، يوركنج .

يجدر بالذكر ان حصول هذه الطفرات امر نادر جداً ، وقد ينتج من طريق هذا التغيير البطيء اصناف جديدة لا يمكن التعرف اليها واستغلالها الا بالملاحظة الدقيقة والكشف المستمر على اشجار البساتين في جميع انحاء البلاد .

الاصناف التي تنشأ من البذور بطريقة طبيعية - قل ان تفرس بذرة تفاح وينتج منها شجرة تشبه الشجرة التي انتجتها، ولهذا يمكن اعتبار كل بذرة مصدراً لاصنف جديد . وسببه ان الانقسام في الخلايا الجنسية قبل الاخصاب هو على عكس طريقة الانقسام في الخلايا الحضرية . فبدلاً من ان ينقسم القضيبي مستطيلاً ويكون قضيبين مستطيين متساويين في جميع الصفات يجري انقسام اختزالي في خلايا حبيبات اللقاح والبويضات الجنسية وينتج من ذلك خلية تحمل سبعة عشر قضيباً فقط اي نصف صفات ذلك الصنف ؛ بمعنى ان القضيبان المتجمعة ازواجاً في الخلية الجنسية تبعد بعضها عن بعض عند الانقسام ويسير نصف القضيبان بكاملها الى احد جوانب الخلية والنصف الثاني الى الجانب الآخر المقابل وتتكون بعد اكتمال الجدار الفاصل خليتان تحمل كل منهما نصف عدد القضيبان او نصف صفات الصنف وتندمج بعد التلقيح محتويات احدي هذه الخلايا من حبيبات اللقاح الحاملة سبعة عشر قضيباً مع خلية من البويضات تحمل ايضاً سبعة عشر قضيباً وينتج من ذلك بذرة تحمل اربعة وثلاثين قضيباً . وبما ان التلقيح في التفاح يحدث غالباً بين شجرتين من صنفين تصبغ البذرة الجديدة حاملة لصفات نصفها يشبه احد الصنفين والنصف الثاني يشبه الصنف الآخر . فاذا غرست نتج منها صنف جديد لا يشبه كثير الشبه احد الصنفين الاصليين . وهذا التلقيح المختلط بين اصناف التفاح سبب على طول المدى وجود صفات متباينة جداً في جنين بذرة التفاح اذ يستحيل تصنيفها بطريقة طبيعية ولذلك يندر ان يكون الصنف الجديد ذا ثمار جيدة الصفات . والاصناف التجارية المعروفة التي نشأت من بذرة هي : ماكتوش ، بيزكوود (سان باري) ، كوكس اورنج ، كولدن ديليشس ، جوناثان (من بذرة اسبتزنبوك) ، رد ديليشس ، نورثون اسباي ، استيمن واينساب (من بذرة واينساب) ، وكنج ديفيد .

يندر حدوث عدم تكوين الجدار الفاصل بعد انقسام النويين في الخلية الجنسية والا فان احدي الخليتين الجنسيين تحمل بعد الانقسام غير المباشر عدد القضيبان الكامل المختص بالصف وتحمل الاخرى العدد الاختزالي اي سبعة عشر قضيباً وينتج من ذلك الاخصاب تكوين بذرة تحمل واحداً وخمسين قضيباً . وهذا هو مصدر الاصناف الثلاثة الجنس التي تكون غالباً حبيبات اللقاح فيها عقيمة ، ومنها الاصناف كرافنشتين ، رينيت دي كندا ، استيمن واينساب ، وواينساب .

الاصناف التي تنشأ عن تأصيل البذور بالطرق العلمية - ان العلماء رغبة منهم في الحصول على صفات مفضلة في اصناف معينة من التفاح عمدوا الى ادخال هذه الصفات الى تلك الاصناف عن طريق تأصيل البذور بواسطة الطرق الوراثية . ولما كانت هذه العملية شاقة ويتطلب نمو اشجار التفاح متسعاً كبيراً من الوقت لم يوفق هؤلاء في ايجاد اصناف كثيرة لكنهم استطاعوا انتاج بعض الاصناف الجيدة ومنها الصنف كورتلند الذي نتج من اخصاب ماكتوش x بن ديفيز وذلك في محطة التجارب الزراعية في ولاية نيويورك سنة ١٨٩٨ . وكذلك الصنف لاكستون بيرمين نتج من اخصاب وستر بيرمين x كوكس اورنج بين في انكلترا .

الفصل الثاني والعشرون

وصف بعض اصناف التفاح

ان الاصناف الصالحة للاسواق التجارية العالمية والمحلية قليلة جداً بالنسبة لمجموع الاصناف المعروفة، وهي تختلف كثيراً بين بلد وآخر بحسب نجاحها الاقليمي. ويجب في تحديد الاصناف المرغوب انتخابها للفرس في اي بلد او اقليم اعتبار (ا) ملاءمتها للبيئة (ب) توسيع موسم الانتاج عن طريق غرس الاصناف المبكرة والمتأخرة جداً (ج) تنوع الاصناف حسب ذوق المستهلكين (د) مسافات النقل ومدة الحفظ في البراد (هـ) طلب الاسواق المحلية والعالمية. بناء على ما تقدم أوردت صفات تسعة عشر صنفاً من الاصناف العالمية الصالحة للزرع في الشرق الأدنى وخاصة لبنان. ويجدر بالذكر ان عدداً قليلاً جداً منها لم يتعرف اليه المزارع اللبناني. وتختلف جميع الاصناف المذكورة بعضها عن بعض من حيث بيئة الزرع وموعد الإزهار ومقدار الانتاج وجودته وكيفية استهلاكه وموعد نضجه ومدة حفظه في البراد، فانتخب ما يلائم بينك وذوق المستهلكين وطلب الاسواق (راجع الجدول الثامن). وقد قسمت الاصناف من حيث موعد نضج ثمارها الى مبكرة ومتوسطة ومتأخرة ومتأخرة جداً، واليك أفضلها بالنسبة الى لبنان :

الاصناف المبكرة والمتوسطة النضج - ان أفضلها صنف كرافنشتين العالمي الموافق غرسه في المواقع المتوسطة الارتفاع من ٧٠٠ - ١١٠٠ متر عن سطح البحر. والصنف ماكتوش الواجب غرسه في المناطق العالية جداً فقط على ان لا يقل ارتفاع موقع زراعته عن ١٥٠٠ متر عن سطح البحر. وكلاهما صنفان صيفيان يصلحان للاسواق المحلية وخاصة للمصايف ولا يمتاز عليهما صنف لنكهة الطعم والمنظر الجذاب اذا لامت البيئة نموها.

الاصناف المتأخرة - ان أفضلها كولدن ديليشس، ورد ديليشس، واسوبس اسبزنبرك، ويلونيوتن، واستين واينساب، وتؤثر زراعة جميعها تقريباً في المناطق المتوسطة البرودة من ٨٠٠ - ١٢٠٠ متر وهي صالحة للاسواق الخارجية لتحملها مشاق النقل البعيد والتبريد الطويل الامد. وتمتاز بلونها وطعمها وشكلها عن أكثر الاصناف الاخرى.

الاصناف المتأخرة جداً - ان أفضلها الصنف نورثرن اسباي المغروس في المرتفعات مع الصنف ماكتوش ويزهر متأخراً وموسم نموه الصيفي متوسط وثماره متميزة ويمكن حفظه في البراد مدة طويلة. والصنف واينساب هو من أفضل الاصناف التجارية العالمية ويغرس في المناطق المتوسطة البرودة ويحفظ في البراد مدة طويلة جداً.

ان أفضل سياسة يمكن اتباعها في لبنان هي غرس أقل عدد من الاصناف المذكورة في أكبر مساحة ممكنة من الارض مع وجوب اضافة الاصناف جوناثان وروم بيوتي وونتر بنانا للاخصاب بمعدل يتراوح بين ١٥ - ٢٥٪ في كل بستان. كما يجب زراعة الاصناف التي تنجح في مواقع خاصة، مثلاً على ذلك الصنفان روم بيوتي وكنج ديفيد وهما أفضل الاصناف للفرس في البقاع لعدم سقوط ثمارها بسهولة من جراء الرياح الشديدة والملاءمة للبيئة الدافئة صيفاً

لنمو أشجارهما. وتزرع الاصناف الصفراء مثل يلو بلفلور، ويلونبوتن، وونتر بنانا، وكولدن ديلبشس بنجاح في المرتفعات العالية من قضاء مرجعيون بدون سقي .

يتوقع بعد انقضاء فترة من الزمن ان تصبح نسبة الاراضي المغروسة من أصناف التفاح المشهورة في لبنان كمايلي : استاركن ديلبشس ٣٠٪، كولدن ديلبشس ٣٠٪، كرافنشتين ٨٪، جوناثان ٦٪، روم بيوتي ٦٪، ونتر بنانا ٦٪، واينساب ٤٪، ماكتوش ٣٪، نورثون اسباي ٢٪ من أصناف الأكل و٥٪ فقط من اصناف العصير والتجفيف والاصناف الاخرى . وبذلك تصبح ٨٠٪ من المساحة المغروسة تفاحاً في لبنان تمثل فقط خمسة أصناف تجارية.

الجدول الثامن - اوصاف اشجار وثمار بعض اصناف التفاح التجارية

مدة حضانة الشتلات (البراد)	الثمار					الاشجار					اسم الصنف
	لونها	حجمها	شكلها	عدد الايام لتضجها	تأثيرها بالواد الكيماوية	الاثمار عادة	بده اثمارها (سنة)	حجمها	قوة ثمرها	شكلها	
١ -	احمر	متوسط الى كبير	مستدير، مفلطح	١١٥-١١٠	لا تأثر	سنوي	٨-٦	متوسط كبير	قوي	عمودي منشتر	١ - كرافنشتين
٣ -	احمر	متوسط الى كبير	مستدير	١٣٠-١٢٥	لا تأثر	سنوي	٦-٤	كبير	قوي	منشتر	٢ - ماكتوش
٤ -	اصفر	كبير	مستدير مخروطي	١٣٠-١٢٥	لا تأثر	غالب سنوي	٦-٤	متوسط	متوسط	منشتر	٣ - ونتر بنانا
٣ -	احمر	صغير	مستدير مخروطي	١٤٥-١٤٠	تأثر	سنوي	٦-٤	متوسط	متوسط	منشتر	٤ - جوناثان
٧ -	اصفر	متوسط الى كبير	مستطيل مخروطي	١٤٥-١٤٠	شديدة التأثر	غالب سنوي	٦-٤	متوسط	متوسط	منشتر	٥ - كولدن ديلبشس
٥ -	احمر	متوسط الى كبير	مستطيل مخروطي	١٥٠-١٤٠	لا تأثر	غالب سنوي	٨-٥	كبير	قوي	عمودي منشتر	٦ - رد ديلبشس
٥ -	احمر	متوسط الى كبير	مستطيل	١٥٥-١٤٥	تأثر	غالب سنوي	٨-٦	كبير	قوي	عمودي منشتر	٧ - اسويس استرنبرك
٥ -	احمر	كبير	مستطيل مخروطي	١٥٥-١٤٥	تأثر	غالب سنوي	١٤-١٠	متوسط كبير	متوسط	عمودي منشتر	٨ - نورثون اسباي
٥ -	احمر	متوسط الى كبير	مستدير مخروطي	١٦٥-١٦٠	لا تأثر	سنوي	٦-٤	كبير	قوي	منشتر	٩ - استين واينساب
٦ -	احمر	كبير	مستدير مخروطي	١٦٥-١٦٠	لا تأثر	سنوي	٦-٤	متوسط كبير	متوسط	منشتر	١٠ - روم بيوتي
٧ -	اصفر	متوسط الى كبير	مستدير مفلطح	١٦٥-١٦٠	تأثر	دوري	١٠-٨	متوسط	متوسط	عمودي منشتر	١١ - بلونبوتن
٧ -	احمر	متوسط	مخروطي	١٧٠-١٦٠	تأثر	غالب سنوي	٨-٦	متوسط	متوسط	منشتر	١٢ - واينساب

رد جوون

Red June

اسم الصنف : رد جوون .

اسماء اخرى : كارولينارد جوون .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، موطنه ولاية نورث كارولينا سنة ١٨٤٨ .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ذات اغصان منتشرة وقصيرة وغليظة . غزيرة

الانتاج غير المنتظم (دوري) . تزهر مبكرة . حيوية حبيبات اللقاح جيدة ، لا تخصب ذاتها . تنمو في اترية متنوعة في الاماكن الدافئة . تقاوم الأمراض . من عيوبها عدم نضج ثمارها في آن واحد ولذلك يجب قطفها ثلاث دورات على اقل تقدير .

اوصاف الثمار : حجمها صغير ، شكلها مستدير بيضاوي او مستطيل ، ثمارها

متساوية الحجم والشكل . عنقها طويل دقيق . الفجوة صغيرة سطحية ضيقة . كأسها

كبيرة مقفلة ومفتوحة نادراً . حوضها صغير سطحي ذو اضلاع منفرجة الزوايا .

قشرتها رقيقة ، حساسة ، ملساء ، لماعة ، صفراء اللون اساسياً ومغشاة بالاحمر القاتم ؛

نقاطها عديدة وصغيرة جداً ، باهتة اللون ، غير بارزة . لبها ناعم ، ابيض ، غض ،

عصيري ، حاد الحموضة .

جودة الصنف : جيد الى جيد جداً .

مدة التبريد : قصيرة جداً .

بدء موسم النضج : مبكر جداً . اواسط تموز .

الاستعمال : للمائدة .

قيمه التجارية : ان ثماره صغيرة لكنها جذابة ولذيذة . تنتج للاستهلاك

المحلي فقط .

ملاحظات : تنجح زراعته في المواقع الدافئة فقط . يتوجب تشجيع زراعته في

جنوب لبنان وفي المواقع المنخفضة في جبل لبنان . كما يفضل تطعيمه على اصول متوسطة

الحجم ، وغرسه مع اصناف اخرى تزهر في موعد ازهاره .

رد استراخان

Red Astrachan

اسم الصنف : رد استراخان .

اسماء اخرى : استراخان روج .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، موطنه استراخان على بحر قزوين .

اوصاف الشجرة : شجرته كبيرة ، قوية ، مرتفعة ، كثيفة . انتاجها غزير ،

منتظم في بعض المواقع . تزهر مبكرة . حبيبات اللقاح قوية الحيوية ، اخصابها

مختلط . تنمو في اترية متنوعة . تحتاج الى مقادير برد اكثر من المتوسط لانها دور

الاستراحة . تقاوم الصقيع . مقاومتها للأمراض معتدلة . من عيوبها قصر اجلها .

اوصاف الثمار : حجم الثمار من وسط الى كبير ، غير منتظم . شكلها مستدير

مفلطح ، مضلع الجوانب غير متساوي . العنق دقيق مقوس . الفجوة عميقة ، عريضة ،

زوايا اضلاعها حادة . الكأس كبيرة ، مفتوحة او مقفلة . الحوض سطحي ، ضيق ،

جعدي ، زوايا اضلاعه منفرجة . القشرة رقيقة ، ملساء ، حساسة ، لونها الاساسي

صفراوي - خضراوي مغشى بالاحمر القاتم او الاحمر القاتم ، يغشاه غبار شمعي

كثيف زرقاوي . النقاط كثيرة ، بيضاء . اللب ابيض تتخلله بعض البقع الحمراء ،

ناعم ، عصيري ، عطري ، حاد الحموضة .

جودة الصنف : جيد - جيد جداً .

مدة التبريد : غير صالح للتبريد .

بدء موسم النضج : ٥ - ٢٥ تموز . لا ينضج بالتساوي .

الاستعمال : للمائدة وللطبخ .


قيمه التجارية : لا يصلح الا للاستهلاك المحلي لعدم صلاحه للنقل او الخزن

في البراد . وميزته الوحيدة انه مبكر جداً في النضج ولذلك تظفر ثماره باسعار جيدة .

ملاحظات : ان شجرته قوية وغزيرة الانتاج ، يصلح غرسها في المواقع الباردة

فقط لتطلبها البرد بمقادير اكثر من المتوسط . إذا زرع في مواقع غير ملائمة لا تتلون

ثماره جيداً بل يبقى فيها اثر من اللون الاخضر .



كرافنشتين

كرافنشتين

Gravenstein

اسم الصنف : كرافنشتين .

اسماء اخرى : بانكس ، كرافنشتين تريبل رد ، وكرميزن كرافنشتين وجميعها طفرات من براعه أشد منه احمراراً .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ . هو صنف قديم جداً وجد في المانيا .

اوصاف الشجرة : كبيرة ، قوية جداً ، عمودية ومنتشرة . اغصانها كبيرة ، متينة ، مفتوحة ، ثمر وهي حديثة . انتاجها منتظم (سنوي) . تزه مبكرة . حبيبات اللقاح ثلاثية الجنس ، عقيمة ، اغصانها مختلط ويجب زرع الصنف جوناثان بالقرب منها . تكفيها مقادير متوسطة من البرد . لا تقوى على البرد الشديد ؛ المواقع الملائمة لنموها قليلة ولا تزرع فوق ١٢٠٠ متر . يفضل زرعها في الاتربة الحضية الرملية الجيدة الانصراف . معرضة للاصابة بمرض اللفحة النارية ، وهي تصاب بلفحة الشمس ، وثمارها تسقط بغير انتظام ، لا تتحمل الرياح الشديدة ، واغصانها صعب .

اوصاف الثمار : حجمها وسط الى كبير ، شكلها مستدير ، مفلطح عند الفجوة ، غير منتظم ذو زوايا . العنق قصير جداً وغلظ وعميق في الفجوة . الفجوة اضلاعها حادة الزوايا ، متوسطة ، ضيقة ، صدئة . الكأس كبيرة مفتوحة او مقفلة . الحوض غير منتظم ، واسع ، مجعد ، زوايا اضلاعه حادة . القشرة رقيقة ، حساسة ، خشنة الملمس ، لونها الاساسي اصفر يرتقالي مغشى بخطوط متقطعة حمراء فاتحة ، طفراته مغشاة كلياً بالاحمر القاتم ؛ النقاط قليلة ، صغيرة ، باهتة . اللب اصفر ، صلب ، ناعم ، عصيري منعش ، قليل الحموضة ، عطري جداً ذو ثمار لذينة النكهة . من عيوبها اصابتها بعرض النقرة المرة في البراد ، وصعوبة قطف الثمار دون اسقاط غير الناضج منها .

جودة الصنف : جيد جداً الى ممتاز .

مدة التبريد : قصيرة الى متوسطة اقصاها ثلاثة اشهر .

بدء موسم النضج : ٢٥ تموز الى ١٠ آب . ينضج بعد ١١٠ - ١١٥ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : افخر الاصناف المبكرة للمائدة .

قيمه التجارية : يعتبر أفخر صنف مبكر للاسواق المحلية وللتنقل الى مسافات بعيدة . وإذا غرس في مواقع ملائمة ينتج ثماراً قل ان تضاهى . له مستهلكون خصوصيون يترقبون موعد نضج ثماره .

ملاحظات : كثير التأثر بالمواقع والاثربة الخاصة . تصاب ثماره وهي ما تزال في البراد بعرض النقرة المرة او استبنن وخاصة إذا لم يقطف في الوقت المناسب . سيصبح افضل صنف صيفي مبكر في لبنان لامكان زرعه في الاماكن الدافئة الى ارتفاع ١١٠٠ متر على ان يغرس بالقرب منه صنف جوناثان بكثرة بالاضافة الى الاصناف الاخرى لتأمين اخصاب ازهاره .

ماكتوش

Mc. Intosh

اسم الصنف : ماکتوش .

اسماء اخرى : بلاك ماك .



منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في ولاية اونتاريو ، كندا سنة ١٨٧٠ .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ، مستديرة ، منتشرة ؛ اغصانها الجانبية كثيرة ودقيقة . انتاجها غزير ، منتظم (غالباً سنوي) . تزهر مبكرة . حبيبات اللقاح قوية الحيوية ، ثنائية الجنس ، لا تخصب ذاتها . تتطلب مقادير كبيرة من البرد لانها فترة استراحتها ، وتفضل صيفاً كثير البرودة وهي تقاوم الصقيع شتاءً . تنمو في جميع الاتربة . من عيوبها عدم انتظام نضج ثمارها ، وتعرضها للاصابة بمرض التبقع بكثرة .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف بين وسط وكبير ، قطرها من ٧٠ - ٨٩ ملم . متساوية . شكلها مستدير الى مستدير مفلطح . عنقها قصير ودقيق . الفجوة كبيرة ، واسعة ، مثلثة ، غالباً صدئة . الكأس صغيرة ، مقللة ، او مفتوحة قليلاً . الحوض صغير ، ضيق ، اضلاعه قائمة . القشرة رقيقة ، حساسة ، ملساء ، تقشر بسهولة عن اللب ، صفراء اللون اساسياً مغطاة بالاحمر الفاتح ومخططة بالاحمر القاتم البنفسجي ؛ يغشى اللون غبار شمعي ليلكي . النقط صغيرة ، بيضاء او صفراء . اللب ابيض ناصع ، احياناً مخطط بالاحمر ، صلب غض جداً ، كثير العصير ، عطري ، مسكي ، قليل الحموضة . من عيوب الثمار سقوطها احياناً قبل النضج ، واصابتها بعرض الجوف البني وهي ما تزال في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً الى ممتاز .

مدة التبريد : قصيرة الى متوسطة . اقصاها اربعة اشهر .



ماكتوش

بدء موسم النضج : ١٥ - ٢٠ آب . ينضج بعد ١٢٥ - ١٣٠ يوماً من تاريخ
الازهار الكامل .

الاستعمال : افخر اصناف المائدة .

قيمته التجارية : يعتبر افخر تفاح في حينه ويجوز على اعلى الاسعار في الاسواق
التجارية المحلية ولا يزااحمه بها اي صنف آخر لجرودة طعمه ولونه ونكهته الغريبة ،
وهو يحق الذئثمار التفاح دون استثناء .

ملاحظات : اشجاره قوية النمو تقاوم اشدة درجات البرد في الاصقاع الشمالية
ولذلك لا يفرس في لبنان الا في المرتفعات من ١٥٠٠ متر فما فوق حيث يتعذر
غرس غيره من الاصناف . ويجب ان يفرس في لبنان كصنف صيفي لعدم تحمله
مشاق النقل البعيد وتعذر حفظه أكثر من شهرين في حالة صالحة للبيع .

بيز كود نون سوتش

Peasgood Non - Such

اسم الصنف : بيز كود نون سوتش .

اسماء اخرى : سان باري دي بيز كود او ممشح .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في استامفورد ، انكلترا سنة ١٨٥٨ .

اوصاف الشجرة : شجرته كبيرة ، قوية ، منتشرة عمودية . انتاجها غزير جداً ومنتظم . تزهر مبكرة في وسط موسم الازهار . حبيبات اللقاح قوية الحيوية ، ثنائية الجنس ، وتخصب ذاتها كما تخصب سواها . تفضل المواقع الباردة المرتفعة ما بين ١٠٠٠ - ١٣٠٠ متر . وتفضل الاتربة الحفيفة وتناثر بالأتربة الثقيلة . مقاومتها للأمراض جيدة .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف كبير ، قطرها من ٦٥ - ٩٥ ملم . شكلها مستدير مفلطح أو منبسط ، ثمارها غير منتظمة الحجم . العنق قصير وغلظ . الفجوة متوسطة الى واسعة ، زوايا اضلاعها حادة صدئة . الكأس كبيرة مفتوحة . الحوض سطحي ، مستدير ، زوايا اضلاعه منفرجة . القشرة حساسة ، ملساء ، لونها الأساسي اصفر فاتح ، ممشح بخطوط حمراء قرمزية . النقط قليلة ، غير بارزة ، بيضاء . اللب اصفر ، غض ، زبدي ، عطري ، قليل الحموضة .

جودة الصنف : جيد .

مدة التبريد : متوسطة . ثلاثة اشهر .

بدء موسم النضج : ١ - ١٥ آب : لا ينضج بانتظام .

الاستعمال : لأجل الطبخ والمائدة .

قيمه التجارية : تفضل قيمته التجارية في الاسواق المحلية والمناخية ، يدرار باحاً وافر لكون حجمه .

ملاحظات : ان انتاج الاشجار الغزير المنتظم و كبر حجم الثمار ونضجها في موعد الاصطيفات صفات تجعل هذا الصنف مرغوباً لدى المزارعين والمستهلكين . يجب ان لا يلتبس بالصنف سان باري الاصيل ذي الكأس المقفلة والحوض العميق واللبن الابيض .

كوكس اورنج بينين

Cox's Orange Pippin

اسم الصنف : كوكس اورنج بينين .

اسماء اخرى : اورنج دي كوكس .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة غرسها كوكس من كولنبروك لون ، انكلترا سنة ١٨٥٠ .

اوصاف الشجرة : شجرته متوسطة القوة ، عمودية ، أغصانها دقيقة ، كثيفة ، انتاجها غزير منتظم . تزهر مبكرة في وسط الموسم قبل بيز كود . حبيبات اللقاح قوية الحيوية ، ثنائية الجنس . تتطلب مقادير متوسطة من البرد . تنمو في أتربة جيدة الانصراف .

يكثر فيها الرمل . من عيوبها تعرضها لمرض التبقع والرمد . أوراقها شديدة التأثر بمواد الرش وخاصة بمحلول الكلس والكبريت وكبريتات النحاس .

اوصاف الثمار : حجمها متوسط ، قطرها ٧٠ - ٧٩ ملم . منتظم . شكلها مستدير مخروطي . العنق قصير ، غلظ ، لحمي . الفجوة واسعة ، سطحية ، صدئة . الكأس صغيرة ، نصف مقفلة . الحوض واسع ، عميق ، قليل الصدأ . القشرة رقيقة جلدية ، ملساء ، لونها الاساسي اصفر ملطخ بالأحمر الباهت ممشح بخطوط حمراء دقيقة قد يملوها بعض الصدأ . النقط غير بارزة . اللب غض ، صفراوي اللون ، عصيري ، مبرغل ، حاد الحموضة والحلاوة ، عطري بمسك . من عيوبها اصابته بالنقرة المرة وهي ما تزال في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً الى ممتاز .

مدة التبريد : طويلة (أكثر من المتوسط) .

بدء موسم النضج : أواخر آب الى أوائل ايلول .

الاستعمال : للمائدة .

قيمته التجارية : يعتبر من الأصناف التجارية الجيدة ويتحمل مشاق النقل والحفظ وثماره مرغوبة في الاماكن التجارية الكبيرة لاعتدال حجمه . تعتبر ثماره أفخر تفاح في انكلترا .

ملاحظات : يجب ان تغرس أشجاره في المناطق الملائمة له وهذه محدودة ولا يمكن التعرف اليها الا بالاختبار ؛ فاذا اكتشفت تلك المواقع قل ان تمتاز عليه ثماره ؛ ويصبح في المواقع غير الملائمة رديء الطعم قليل الانتاج . تفضل المواقع الشاخحة . يميز عن المشح بحجمه الصغير ونضج ثماره المتأخر عنه قليلاً . وهو مغروس في لبنان انما يسمى بمشحاً لصعوبة تمييزه عنه .

يلو بلفلور

Yellow_Belleflower

اسم الصنف : يلو بلفلور .

اسماء اخرى : لينوس بين .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، وجد في ولاية نيويورك سنة ١٨١٧ .
اوصاف الشجرة : حجم شجرته كبير ، نموها قوي جداً وهي حديثة ، عمودية ، منتشرة ، اغصانها ليّنة . انتاجها غزير ، وغالباً غير منتظم . تزهر في وسط الموسم . حيوية حبيبات اللقاح وسط ، ثنائية الجنس ، عقم ذاتي . تتطلب تربة خصبة جيدة الانصراف . تفضل المواقع الساحلية الدافئة المعرضة لأشعة الشمس وتتطلب مقادير قليلة من البرد لانها استراحتها . من عيوبها تعرضها لمرض صدي الاوراق ، وفوما بوماي .
اوصاف الثمار : حجمها كبير ، قطرهما من ٧٦ - ٨٢ ملم . شكلها مستطيل مخروطي ، مضلع ، دقيق بانجاه الكأس ، جوانبه غير متساوية . العنق طويل ، دقيق . الفجوة كبيرة ، عميقة ، زوايا اضلاعها حادة . الكأس مقفلة . الحوض عميق ، صغير ، ضيق ، منحرف ، مدبذب . القشرة ناعمة ، لونها صفراوي ليموني عليه غشاء خفيف من الأحمر الفاتح في الجانب المعرض للشمس . النقاط بيضاء ، كبيرة قرب الفجوة . اللب صفراوي ، صلب ، ناعم ، عصيري جداً ، عطري جداً ، لذيذ عند النضج .

جودة الصنف : جيد .

مدة التبريد : متوسطة .

بدء موسم النضج : ١٥ آب الى ١٠ ايلول .

الاستعمال : للطبخ والعصير .

قيمته التجارية : افضل ثمار تفاح تباع للطبخ والعصير في الأسواق التجارية .
ملاحظات : تعمر اشجار هذا الصنف كثيراً وهي قوية جداً و كثيرة الانتاج في المواسم الجيدة وثماره لذيذة مطبوخة وتمتاز بعصيرها على جميع الاصناف . يجب الاستفادة من زراعة هذا الصنف في المواقع الدافئة القليلة الارتفاع حيث لا تجود الاصناف الاخرى . يمكن زرعه بدون ري في الاتربة العميقة .

بدء موسم النضج : ٢٥ آب الى ١٥ ايلول. ينضج بعد ١٢٥ - ١٣٠ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة .

قيمتها التجارية : تباع ثماره بأسعار جيدة ، وهي آمنة من جوناثان واستيمن في الاسواق التجارية لكنها لا تتحمل مشاق النقل البعيد .

ملاحظات : ان انتاج اشجارها الغزير المتواصل وثمارها اللذيذة الجذابة تجعلها من أفضل الأصناف الواجب زرعها في المواقع الدافئة حيث لا توجد أكثر الأصناف المتأخرة ؛ كما يجب غرسها في البساتين لاختصاص الأصناف الأخرى .

ونتر بنانا

Winter Banana

اسم الصنف : ونتر بنانا .

اسماء اخرى : ' بنانا .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، وموطنه الاصيلي هولندا .

اوصاف الشجرة : شجرتها متوسطة القوة ، منتشرة ، مفتوحة . انتاجها غزير جداً ، وغالباً منتظم (سنوي) . تزهر في منتصف الموسم . حبيبات اللقاح ذات حيوية قوية ، ثنائية الجنس ، تخصب ذاتها جزئياً ، جيدة لاختصاص الأصناف الأخرى . تنمو في أترية متنوعة . تتطلب مقادير قليلة من البرد لانتهاء استراحتها . تصلح في المواقع الدافئة وتتأثر كثيراً بالبرد وغم مقاومتها للأمراض .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف كبير ، قطرهما من ٧٩ - ٨٩ ملم . شكلها مستدير مخروطي الى مستطيل مخروطي ، منبسطة عند الحوض . العنق متوسط الطول . الفجوة كبيرة ، زوايا اضلاعها حادة ، سطحية عريضة . الكأس ضيقة ، مقفلة أو مفتوحة قليلاً . الحوض صغير ، سطحي ، زوايا اضلاعه منفرجة . القشرة ملساء ، سميكة جلدية ، شمعية ، لماعة ، صفراء فاقعة موشاة بالاحمر الخفيف على الجانب المعرض للشمس فقط . يقسم الثمرة ضلع بارز من الفجوة الى الحوض . النقاط عديدة ، بيضاء ، عميقة . اللب صفراوي فاقع ، صلب ، خشن ، غض ، عصيري ، قليل الحموضة ، مسكي لذيذ . من عيوبها انها حساسة يسهل عطبها وتصاب بعرضي الانحلال الاسفنجي والجوف المائي وهي في البراد .

جودة النوع : جيد الى جيد جداً .

مدة التبريد : متوسطة أقصاها ستة أشهر .

جوناثان

Jonathan

اسم الصنف : جوناثان .

اسماء اخرى : جونارد ، وبلاكجون .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة الصنف اسوبس اسبتزبرك ، وموطنه ولاية نيويورك سنة ١٨٠٠ .

اوصاف الشجرة : شجرتة منتشرة متوسطة الحجم والقوة ، مستديرة ، اغصانها متدلية ، كثيفة ، تقاوم البرد . انتاجها غزير جداً ومنتظم (سنوي) ، لكنها تميل الى الاثمار الدوري أحياناً . تزهر مبكرة في منتصف الموسم . حيوية حبيبات اللقاح قوية جداً ، ثنائية الجنس ، تخصب ذاتها وغيرها وتعتبر من افضل الملقحات ، يفضل زرعها مع الصنف رد دبليسس ، تفضل التربة الحسبة الدافئة المنصرفة . تتطلب مقادير متوسطة من البرد لانها دور استراحتها وموسم نموّ طويلًا ودافئاً . من عيوبها انها ضعيفة النمو وهي عرضة للاصابة بمرض الرمذ في المواقع الرطبة .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف صغير ، قطرهما من ٦٥ - ٧٦ ملم . شكلها مستدير مخروطي الى مستدير بيضاوي . متساوية ومنتظمة الحجم والشكل . العنق طويل . الفجوة دقيقة ، عميقة ، ضيقة ، زوايا اضلاعها حادة . الكأس صغيرة ، مقفلة . الحوض متوسط العرض والعمق . القشرة رقيقة ، جلدية ، ملساء ، لونها الأساسي أصفر ، مغشاة بكاملها بالأحمر القاتم وبمشحة بخطوط غير بارزة من الأحمر القاني . النقاط غير بارزة . اللب اصفر فاتح و احياناً ملطخ بالأحمر ، صلب ، ناعم ، عصيري ، عطري جداً ، لذيد ، حلو قليل الحموضة ، منعش . اذا ابقيت الثمار في البراد فوق طاقتها تظهر عليها اعراض بقعة جوناثان ، والانحلال الاسفنجي ، والجوف المائي .

جودة الصنف : جيد جداً .

مدة التبريد : متوسطة اقصاها اربعة اشهر .

بدء موسم النضج : ١ - ١٠ ايلول . ينضج بعد ١٤٠ - ١٤٥ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة والعصير والطبخ .

قيمه التجارية : يعتبر من الاصناف التجارية الممتازة في اميركا واوروبالجادية لونه ولذته طعمه وحجمه المرغوب ، ولانه يتحمل مشاق النقل البعيد . تتطلبه الاسواق بازدياد لاعتدال اسعاره .

ملاحظات : ثمر اشجاره وهي حديثة . لا يمكن الاستغناء عنه في البساتين لأفضليته بالاخصاب ولقوة حيوية حبيبات اللقاح وتجانسها مع اكثر الاصناف . يفضل المواقع المرتفعة الدافئة . يجب قطف ثماره قبل اكتمال نضجها واخراجها من البراد قبل بدء اصابتها بالاعراض الطبيعية .

كولدن ديليشس

Golden Delicious

اسم الصنف : كولدن ديليشس .

اسماء اخرى : رد كولد .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في ولاية وست فرجينيا سنة ١٨٩٥ وادخل الى المزارع التجارية سنة ١٩١٦ بواسطة مشاتل استارك اخوان .

اوصاف الشجرة : شجرته متوسطة النمو ، تقاوم البرد بعض المقارمة . انتاجها غزير جداً وغالباً منتظم (سنوي) . تلجأ احياناً الى الانتاج الدوري . تزهر متأخرة في منتصف الموسم . حبيبات اللقاح قوية الحيوية جداً ، ثنائية الجنس ، جيدة للاخصاب الحلطي ، لا تخصب ذاتها جيداً . تنمو في اترية مختلفة ولا بأس اذا كانت هذه الأترية طيبة طينية . تحتاج الى مقادير متوسطة من البرد لانها استراحتها . تفضل الارتفاعات المتوسطة من ٨٠٠ - ١٢٠٠ متر . مناعتها ضد الامراض جيدة . ثمر وهي ما تزال حديثة جداً .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف من وسط الى كبير ، قشرها من ٨٢ - ٨٩ ملم . شكلها مستطيل مخروطي . الثمار متساوية الحجم والشكل . العنق طويل ، دقيق ، معقوف . الفجوة عريضة ، عميقة جداً . الكأس كبيرة ، مقفلة . الحوض ضيق ، اخلاعه قائمة ، مثلث . لون القشرة اصفر ذهبي ، وهي رقيقة ملساء . النقاط عديدة ، صغيرة ، بارزة ، وخاصة بالقرب من العنق . اللب زبدي اللون ، صلب ، عصيري ، ناعم ، حلو قليل الحموضة ، عطري ، ذو طعم لذيذ جداً . من عيوبها اصابتها بعرض الانحلال الاسفنجي في البراد .

جودة الصنف : ممتاز .

مدة التبريد : طويلة جداً . اقصاها عشرة اشهر .

بدء موسم النضج : ١٠ - ٣٠ ايلول . ينضج بعد مرور ١٤٠ - ١٤٥ يوماً على الازهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة والعصير .

قيمتها التجارية : تفضله معظم الاسواق التجارية على غيره من الاصناف ولا يزاحم اسعاره سوى الصنف ما كنتوش اذا وجد . سينتشر يوماً مثل الصنف استارك كن في الاسواق العالمية .

ملاحظات : ان قوة نمر اشجار هذا الصنف وغزارة انتاجها المنتظم ومقاومتها للامراض وجودة ثمارها وامكان حفظها في البراد مدة طويلة من شأنها ان تزاحم اجمل الاصناف الحمراء وقد تمتاز عليها في المستقبل . الافضل ان لا تزرع هذه الاشجار في المواقع المنخفضة جداً ولا في المواقع التي يزيد ارتفاعها على ١٣٠٠ متر . كما يجب تخفيف ثمارها للحصول على حجم معتدل . لا يوجد اية صلة وراثية بينها وبين الصنف ردديليشس . تأتي في المرتبة الثامنة من حيث عدد اشجارها في العالم لحداثة زراعتها .

رد ديليشس

Red Delicious

اسم الصنف : رد ديليشس .

اسماء اخرى : استاركن دويل رد ، ريتشا - رد ، شوتويل ديليشس .

وجميعها طفرات من براعه وتختلف عنه باللون فقط وهي لا تعتبر اصنافاً جديدة .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في ولاية ابوا سنة ١٨٨١ .

اوصاف الشجرة : شجرتة كبيرة ، قوية جداً ، عمودية منتشرة ، تقاوم الصقيع والجليد . انتاجها غزير جداً ، غير منتظم (غالباً دوري) ويمكن جعله منتظماً . تزهو متأخرة في وسط الموسم . حبيبات اللقاح ثنائية الجنس ، حيويتها قوية جداً ، لا تخبص ذاتها انما تعتبر من افضل الاصناف للاخصاب المختلط ، يجب ان يزرع والصنف جونانان معاً . تفضل شجرتة الاتربة الحفيفة المنصرفة . تتطلب مقادير متوسطة من البرد لانها دور الاستراحة وموسم نمو طويل ودافئ . يمكن زرعها في جميع المرتفعات حتى العالية جداً حيث لا يمكن زرع الصنف كولدن . تقاوم الامراض ، وهي من الاصناف القليلة التي لا عيب فيها .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف من وسط الى كبير ، قطرها من ٧٠-٨٣ ملم . شكلها مستطيل مخروطي ، مضع ، كامل ومنتظم الحجم والشكل . العنق طويل ، متوسط السماكة ، مستقيم . الفجوة عميقة ، عريضة ، خضراوية . الكأس متوسطة ، تقريباً مقللة ، سبلاتها طويلة . الحوض عميق ، واسع ، اضلاعه قائمة ، مثلث مدبذب بنحوس قمم بارزة . القشرة سميكة جداً ، جلدية ، ملساء ، لونها الأساسي اصفر فاقع مغشى بالأحمر وملطخ بالأحمر القاني . واللون الاحمر في الطفرة استاركن

قام ولا يظهر اللون الاساسي أبداً . النقاط عديدة ، صغيرة ، صفراء . اللب ابيض ، صلب ، ناعم ، غض ، عصيري ، عطري ، حلو خفيف الحموضة ، لذيق . عيبها الوحيد انه قد يظهر عليها عرض الجوف المائي بعد الحفظ مدة طويلة في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً .

مدة التبريد : طويلة أقصاها سبعة اشهر ، تحافظ الثمار على لذتها في البراد .

بدء موسم النضج : ٥ - ٢٠ ايلول . ينضج بعد ١٤٠-١٥٠ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة فقط .

قيمتة التجارية : هو الصنف الاول في الاسواق التجارية العالمية من حيث الكمية والطلب لاعتدال اسعاره وجمال لونه وشكله . لكنه غير مرغوب في انكلترا كثيراً .

ملاحظات : أشجاره اكثر الأصناف انتشاراً وعدداً في العالم وهي تقريباً كاملة الصفات وتنمو في جميع المواقع والاتربة ، انما يتأثر لون ثماره كثيراً في المواقع المنخفضة حيث تشتد اشعة الشمس فلا يتكون فيها اللون الأحمر الجميل . يجب تعهده بطرق صحيحة لكي يشمر بانتظام كل عام .

اسوبس اسبيتزنبرك

Esopus Spitzenberg

اسم الصنف : اسوبس اسبيتزنبرك .

اسماء اخرى : أسوبس .



منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ، وموطنه ولاية نيويورك، عرف فيها قبل

سنة ١٨٠٠ .

اوصاف الشجرة : شجرتة عمودية ، منتشرة ، اغصانها الجانبية دقيقة ، متدلية .
انتاجها وسط وغير منتظم (دوري) . تزهر مبكرة في منتصف الموسم . حبيبات اللقاح
ثنائية الجنس ، حيويتها قوية ، تخصب ذاتها وغيرها . كثيرة التآثر بنوع التربة واتجاه
الموقع وتفضل الاتجاه الشمالي . من عيوبها اصابتها بمرض اللفحة النازية ؛ أشجارها
غير قوية ما لم تزرع في المواقع المناسبة لها، وهي صعبة التقليم .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف من وسط الى كبير، قطرها من ٧٦ - ٨٩
ملم . شكلها من مستطيل الى مخروطي مع تضلع غير بارز . عريضة ومنبسطة عند
الفجوة . ثمارها منتظمة الحجم والشكل . العنق متوسط الطول . الفجوة عميقة ،
واسعة ، حمراء او صفراء . الكأس صغيرة ، مقللة او مفتوحة . الحوض سطحي ،
ضيق ، اضلاعه قائمة . القشرة جلدية ، ملساء ، شمعية ، لونها الأساسي أصفر ذهبي مغشى
بالأحمر البراق ومخطط بمخطوط حمراء قائمة غير بارزة . النقاط من خضراوية الى
صفراء ، كثيرة باتجاه الحوض ، كبيرة ومستطيلة بالقرب من الفجوة . اللب اصفر ،
ناعم ، غض ، عصيري ، عطري ، منعش ، حاد الحلاوة والحموضة . من عيوبها اصابتها
بمرض بقعة جوناثان في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً الى ممتاز .



اسوبس اسبيتزنبرك



مدة التبريد : طويلة اذا لم تصب الثمار بعرض بقعة جوناثان، اقصاها سبعة أشهر .

بدء موسم النضج : ١٠ - ٣٠ ايلول . ينضج بعد ١٤٥ - ١٥٠ يوماً من تاريخ الإزهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة والعصير والطبخ .

قيمه التجارية : يعتبر من افضل اصناف الاسواق التجارية لتحمله مشاق النقل البعيد دون عطب ، وله مستهلكون خصوصيون ، لكن اسعاره مرتفعة جداً لقلّة انتاج أشجاره .

ملاحظات : اذا غرست اشجاره في المواقع والاثربة المناسبة لا يمتاز على ثمارها صنف بالشكل واللون والحجم والطعم . اشجاره لا تتحمل الصقيع لذلك يجب ان لا تزرع في امكنة ترتفع عن ١٢٠٠ متر عن سطح البحر في لبنان . كل من يجه انتاج ثمار مرتفعة الاسعار او بمتازة الطعم والمنظر عليه ان يفرس اشجار هذا الصنف . ادخله المؤلف الى كفرتيه ، لبنان عام ١٩٤٩ من ولاية نيويورك .



نورثرن اسباي

نورثرن اسباي

Northern Spy

اسم الصنف : نورثرن اسباي .

اسماء اخرى : اسباي .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في ولاية نيويورك سنة ١٨٠٠ .

اوصاف الشجرة : شجرتها كبيرة، متوسطة القوة، عمودية، كثيفة، مستديرة، اغصانها دقيقة، متدلية. انتاجها غزير، وغالباً منتظم (سنوي). تزهو متأخرة جداً. حبيبات اللقاح ثنائية الجنس، حيويتها قوية، لا تَحْصَب ذاتها. تفضل التربة المتوسطة المنصرفه لان التربة الثقيلة تنتج ثماراً تكثر المواد الزيتية على خارجها. تتطلب مقادير كثيرة جداً من البرد لانها دور استراحتها، وصيفاً بارداً، وهي تتأثر كثيراً بالموقع. تتأخر كثيراً في بدء الاثمار حتى السنة العاشرة. تقاوم الامراض باستثناء مرض التبقيع.

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف كبير، قطرها من ٧٩ - ٨٩ ملم. شكلها مستطيل مخروطي، منبسط عند الفجوة، مضلع. العنق غليظ. الفجوة كبيرة، واسعة، وعميقة جداً، زوايا اضلاعها حادة. الكأس صغيرة ومقفلتة. الحوض صغير، ضيق، عميق. القشرة رقيقة، ملساء، لامعة، لونها الاساسي اصفر مغطى بكامله بالاحمر الفاتح مرقش بالاحمر القاني ويعلوه غبار شمعي خفيف. النقاط صغيرة بيضاء متفرقة. اللب اصفر، صلب، ناعم جداً، عصيري، عطري، حاد الحلاوة والحموضة، منعش. من عيوبها ان قشرتها رقيقة وحساسة ولذلك يجب الحذر لدى نقل الثمار. تصاب الثمار بعرض النقرة المرة وعرض قمر التفاح في البراد.

جودة النوع : جيد جداً الى ممتاز.

مدة التبريد : طويلة اقصاها سبعة اشهر .

بدء موسم النضج : ٢٠ ايلول - ١٠ تشرين الاول . تنضج ثماره بعد ١٤٥ - ١٥٥ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للبائدة .

قيمه التجارية : ان لذة طعم ثماره وجمال شكلها ولونها جعلته صنفاً تجارياً ممتازاً . تأتي اسعاره في المرتبة الثالثة بعد ما كنتوش وكولدن ، وهو يمتاز على الصنف استاركن .

ملاحظات : لان هذا الصنف يقاوم البرد كثيراً ويتطلب مقادير كبيرة منه ويزهر متأخراً جداً فهو ملائم للمواقع العالية جداً التي لا يقل ارتفاعها عن ١٥٠٠ متر . يقاوم في بعض المواقع حشرة المن القطني .

رينيت دي كندا

Reinette du Canada

اسم الصنف : رينيت دي كندا .

اسماء اخرى : رامبور دي باري .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، موطنه فرنسا .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ، منتشرة الاغصان متينة ، تبدأ بالثمار مبكراً في حياتها . انتاجها غزير ومنتظم . تزهر متأخرة في منتصف الموسم . حبيبات اللقاح عقيمة ، ثلاثية الجنس . تفضل المواقع الجافة المرتفعة والاتربة الحصىة . تتأثر بالامراض في المواقع الرطبة .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف من كبير الى كبير جداً ، شكلها مستدير ، مفلطح مخروطي ، نادراً غير متساو . العنق قصير وغلظ . الفجوة كبيرة ، عميقة ، وصدئة . الكأس كبيرة ، مفتوحة . الحوض عميق ، غير متساو . القشرة سميكة ، خشنة الملمس ، لونها اخضر صفراوي الى اصفر ليموني . النقاط كثيرة ، بارزة ، حمراء ، خشنة . اللب ابيض ، صفراوي ، ناعم ، عصيري ، حلو ، بمسك قليل الحموضة ، لذيد .

جودة الصنف : جيد جداً (بعد النضج الكامل) .

مدة التبريد : طويلة جداً .

بدء موسم النضج : ١٥ - ٣٠ ايلول .

الاستعمال : للطبخ والعصير ويعتبر لهذا الغرض من افخر الاصناف المعروفة .

قيمه التجارية : تتركز قيمته التجارية في الاسواق المحلية والبلاد الراغبة في طبخه او عصره لخص اسعاره ولذة طعم ثماره بعد النضج الكامل .

ملاحظات : تهدرست هذه الاشجار في مساحات واسعة وخاصة في اقليم كسروان ؛ ويرغم انقطاع غرسها الآن فستزداد زراعتها يوماً لاستعمال ثمارها للعصير الطازج .

استيمن واينساب

Stayman Winesap.

اسم الصنف : استيمن واينساب .

اسماء اخرى : استيما - رد ، وبلاكستين .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة الصنف واينساب في ولاية كنساس

سنة ١٨٦٦ .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ، منتشرة مفتوحة . انتاجها غزير جداً ومنتظم . تزهر في وسط الموسم . حبيبات اللقاح ثلاثية الجنس ، عقيمة . تنمو جيداً في أنواع مختلفة من الاتربة وفي جميع المواقع على ان لا يزيد ارتفاعها عن ١٢٠٠ متر في لبنان . تتطلب مقادير متوسطة من البرد لانها دور استراحتها ؛ كما يجب ان يكون موسم النمو طويلاً ودافئاً . تقاوم الامراض ولا عيب فيها .

اوصاف الثمار : حجم الثمار من متوسط الى كبير ، قطرها من ٧٦ - ٨٦ ملم . شكلها مستدير مخروطي ، منبسطة عند الفجوة والجوانب وغالباً غير متساوية . العنق قصير . الفجوة كبيرة ، تضيق فجأة ، عميقة صدئة . الكأس صغيرة ، مقللة . الحوض صغير ، سطحي ، ضيق ، زوايا أضلاعه منفرجة . القشرة ملساء ، سميكة ، جلدية ، لونها الاساسي اصفر مغشاة بالاحمر القاتم ومخططة باللون الاحمر القاني غير البارز . النقاط كبيرة ، رمادية اللون . اللب اصفر ، صلب ، غض جداً ، ناعم ، عصيري ، عطري ، حاد الحلاوة والحموضة ، منعش . من عيوبها انها في بعض الاقاليم تنشق ولا تتلون جيداً وتسقط عند النضج وتصاب بأعراض الانحلال الاسفنجي والبقرة المرة والجوف المائي في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً .

روم بيوتي

Rome Beauty

اسم الصنف : روم بيوتي .

اسماء اخرى : ردروم ، ملكة لبنان (?) .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، وجد في ولاية اوهايو سنة ١٨٤٨ .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ، متوسطة الحجم ، منتشرة ، ثمر وهي حديثة .
انتاجها غزير جداً ومنتظم (سنوي) . تزهر متأخرة جداً . حبيبات اللقاح ثنائية الجنس ، قوية الحيوية ، تصلح للاخصاب الذاتي والخلطي . لا تقاوم البرد الشديد انما تتطلب مقادير كبيرة منه لانها دور استراحتها . وهي تنجح في المرتفعات بين ٨٠٠ - ١١٠٠ متر وتفضل المواقع الجافة المعرضة لاشعة الشمس . معرضة اكثر من سواها للاصابة بمرض الرمذ . ومن عيوبها انها تحمل الكثير من ثمارها على رؤوس الاغصان الدقيقة التي تتضارب حين هبوب الرياح الشديدة . وهي تصاب بجميع انواع المن .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف كبير ، شكلها مستدير الى مستدير مخروطي ، منتظم . العنق دقيق ، متوسط ، معقوف . الفجوة كبيرة ، زوايا اضلاعها منفرجة ، سطحية ، غير صدئة . الكأس صغيرة ، مقفلة او مفتوحة . الحوض صغير ، سطحي ، ضيق . القشرة سميكة ، جلدية ، ملساء ، لونها الاساسي اصفر مغشى بالاحمر الفاتح الذي يصبح احمر قابلاً في الجانب المعرض لأشعة الشمس وعليه خطوط قرمزية . النقاط صفراء ، صغيرة ، عديدة ، بارزة . اللب اصفر ، صلب ، ناعم ، عصيري ، عطري ، خفيف الحلاوة والحموضة . من عيوبها اصابتها بعرض الانحلال الاسفنجي والجوف المائي في البراد .

مدة التبريد : طويلة أقصاها ستة أشهر اذا لم تصب الثمار بعرض طبيعي .

بدء موسم النضج : ٢٠ - ٣٠ أيلول . ينضج بعد ١٦٠ - ١٦٥ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للمائدة .

قيمه التجارية : يعتبر هذا الصنف من الاصناف التجارية الممتازة ويزداد الطلب عليه في الاسواق العالمية . أسعاره ما فوق المتوسطة .

ملاحظات : ان ثمار هذا الصنف لذينة جداً وتحفظ طويلاً في البراد وعبها الوحيد انها تتشقق أحياناً وهي ما تزال على الشجرة وخاصة اذا تكونت في مواقع غير ملائمة ؛ لا تقاوم البرد الشديد والافضل ان لا تزرع على علو يزيد عن ١٢٠٠ متر في لبنان ، كما يجب زرع أصناف ملقحة عديدة معها لانها عقيمة . يجب الحذر عند نقل الثمار لانها حساسة وسريعة العطب .

كنج ديفيد

King David

اسم الصنف : كنج ديفيد .

منشأ الصنف وموطنه : نشأ من بذرة في ولاية اركنساس سنة ١٨٩٣ .

اوصاف الشجرة : شجرته قوية ، سليمة ، ونتاجها غزير ولكن غير منتظم .
تزهّر في منتصف الموسم . حبيبات اللقاح ثنائية الجنس ، حيويتها قوية . تفضل المواقع
الدايفة وتتطلب مقادير بسيطة من البرد لانها دور الاستراحة . تنمو جيداً في اترية
متنوعة . تقاوم الامراض .

اوصاف الثمار : حجم ثماره معتدل ، منتظم ؛ وشكلها مستدير مخروطي . العنق
دقيق لين وطويل . الفجوة متوسطة العمق وعريضة . الكأس صغيرة مقفلة . الحوض
متوسط العمق ، اضلاعه قائمة ، مثلث . القشرة رقيقة ، ملساء ، لونها الاساسي اصفر خضراوي
مغشى بكامله باللون الاحمر القاتم الى الاحمر القرمزي . اللب اصفر ، صلب ، عصيري ،
حاد ، عطري ، ومبهّر . من عيوب الثمار تلف قلبها اذا فات ميعاد قطعها .

جودة الصنف : جيد .

مدة التبريد : متوسطة — طويلة .

بدء موسم النضج : من ١٠ — ٢٠ تشرين الاول .

الاستعمال : للمائدة .

قيمه التجارية : ينتشر في اسواق البلاد الدايفة لجودة انتاجه وجمال لونه .

ملاحظات : يُغرس هذا الصنف في المواقع الدايفة وخاصة في الاتجاهات الجنوبية .
يتأخر نضج ثماره وتحفظ في البراد مدة طويلة ؛ يجب ان تقطف حين اكتمال لونها الاحمر .
يحسن غرس هذا الصنف في منطقة البقاع وامثالها لان ثماره تقاوم الرياح الشديدة وقل
ان تسقط عن الاشجار .

جودة الصنف : جيد .

مدة التبريد : طويلة جداً اقصاها ثمانية اشهر .

بدء موسم النضج : ٢٥ ايلول — ١٠ تشرين الاول . ينضج بعد ١٦٠ — ١٦٥

يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

الاستعمال : للطبخ والمائدة .

قيمه التجارية : يعتبر من افضل الاصناف في الاسواق التجارية لتحمله مشاق
النقل البعيد وامكان حفظه في البراد مدة طويلة ولاعتدال اسعاره . ثماره دون الوسط
طعمياً لذلك يغلب استخدامها للطبخ .

ملاحظات : يجب ان لا يزرع في المواقع الباردة جداً او الرطبة . لا يصاب باذى
من الصقيع المتأخر او سقوط البرد لان اشجاره تزهّر متأخرة . لا تسقط ثماره بسهولة
حتى في اشد الرياح عصفاً ولذلك انب منطقه له هي منطقة البقاع . يجب ان تزرع
اشجاره في كل بستان للاخصاب .

يلونيوتن

Yellow Newton

اسم الصنف : يلونيوتن .

اسماء اخرى : نيوتن بين ، البيرل .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، موطنه ولاية نيويورك سنة ١٧٣٠ (?) .


أوصاف الشجرة : شجرته متوسطة ، مستديرة ، كثيفة عمودية ومنتشرة .
انتاجها غزير ، غير منتظم (دوري) . تزهر متأخرة . حبيبات اللقاح قوية الحيوية ،
ثنائية الجنس ، تخبب ذاتها وغيرها . تتطلب تربة ومواقع خاصة . تكفيها مقادير
متوسطة من البرد لانهااء دور استراحتها ، وتفضل فترة رقاد طويلة في الشتاء وصيفاً
بارداً بعض الشيء . من عيوبها تعرضها لمرض تشقق القشرة والتبقع .

أوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف من وسط الى كبير ، قطرها من ٨٢ -
٨٦ ملم . متساوية ، ومختلفة الأشكال والاحجام . شكلها مستدير مفلطح ذات زوايا .
العنق قصير . الفجوة عميقة ، وعريضة . الكأس صغيرة ، مقفلة غالباً . الحوض مثلث ،
زوايا أضلاعه حادة . القشرة جلدية ، ملساء ، لونها أخضر فاتح عند القطف وأصفر فيما
بعد ، يعلوها غشاء بني فاتح عند الحوض . النقاط غير بارزة وكثيرة عند الكأس . اللب
أصفر فاتح ، صلب ، ناعم ، عصيري ، عطري ، منعش ذو لذة خاصة . من عيوبها اصابتها
بصدأ القشرة في المواقع غير الملائمة وبعرّض اللب البني في البراد .

جودة الصنف : جيد جداً الى ممتاز .

مدة التبريد : طويلة جداً . اقصاها تسعة اشهر .

بدء موسم النضج : ٢٥ ايلول الى ١٠ تشرين الأول . ينضج بعد ١٦٠ - ١٦٥
يوماً من تاريخ الازهار الكامل .



يلو نيوتن

الاستعمال : للمائدة والعصير والتجفيف .

قيمته التجارية : ان جودة الصنف واماكانية حفظه في البراد جعلته في مقدمة الاصناف التجارية في ولاية كاليفورنيا، وهو في مقدمة الاصناف في الاسواق التجارية في الشرق الاقصى .

ملاحظات : ينبغي تجربة زراعته في جميع المواقع لاكتشاف انسبها له . وأفضل المواقع هي الموجودة في الاتجاه الجنوبي المتوسطة الارتفاع . وأفضل التربة هي المتوسطة الى الثقيلة بعض الشيء . أشجاره تتأخر في بدء انتاجها وهي تعمر كثيراً . يعتبر أفضل الأصناف للتجفيف . أدخله المؤلف الى كفر تيه والشوير - لبنان عام ١٩٤٩ من ولاية نيويورك .

الاستعمال : للمائدة .

قيمه التجارية : لا تخلو الاسواق التجارية منه لأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد استاركن لاعتدال حجمه وسعره وتحمل ثماره مشاق النقل البعيد والتبريد الطويل الأمد .

ملاحظات : انه من الاصناف المتأخرة النضج جداً وسيجد له مواقع موافقة في سفوح جبال لبنان الغربية .

واينساب

Winesap

اسم الصنف : واينساب .

منشأ الصنف وموطنه : مجهول المنشأ ، موطنه الاصلي اميركا (لا يعلم اي ولاية بالضبط) .

اوصاف الشجرة : شجرته متوسطة القوة ، مستديرة منتشرة ؛ اغصانها متدلية ، غير كثيفة . انتاجها غزير جداً ومنتظم (غالباً سنوي) . تزهر في وسط الموسم . حبيبات اللقاح ثلاثية الجنس ، عقيمة جداً . تنمو في جميع الأقاليم وتفضل المواقع المتوسطة البرودة ذات الموسم الطويل . تؤثر الأتربة الخفيفة الحصة العميقة الجيدة الانصراف . تقاوم جميع الأمراض باستثناء مرض القشرة الحشنة ولا تقاوم الصقيع الشديد .

اوصاف الثمار : حجم ثمار هذا الصنف متوسط ، شكلها مخروطي وحياناً مستدير ومنتظم . العنق دقيق ، قصير . الفجوة صغيرة ، ضيقة ، عميقة ، زوايا اضلاعها حادة . الكأس كبيرة ، مقللة . الحوض صغير ، سطحي ، ضيق ، مجعد . القشرة جلدية ، ملساء ، لماعة ، لونها الاساسي اصفر مغشى بالأحمر الفاتح وبمشح بالأحمر القاتم وعليها قليل من الغبار الشمعي . النقاط صغيرة ، بيضاء ، متفرقة . اللب اصفر ، وعروقه حمراء وحياناً ، صلب ، خشن ، عصيري ، منعش ، حامض - حلو .

جودة الصنف : جيد الى جيد جداً .

مدة التبريد : طويلة جداً افصاها احد عشر شهراً .

بدء موسم النضج : ١ - ١٥ تشرين الاول . ينضج بعد ١٦٠ - ١٧٠ يوماً من تاريخ الازهار الكامل .

لما لم نجد وصفاً كاملاً شاملاً لكل صنف من الأصناف المذكورة في كتاب او مجلة او نشرة كان من الضروري ان نجعلها من هنا وهناك من مئات النشرات والمجلات العلمية ، كما اعتمادنا ايضاً على المراسلة مع العلماء الاختصاصيين ، وعلى بعض التجارب التي اجريت في الشرق الادنى ولا يتسع المقام لذكر هذه المراجع نظراً لتمدها . لقد دقت جميع المعلومات على ضوء التفاصيل المتوفرة والخبرة العلمية الواضحة .

الباب السادس

تكاثر اشجار التفاح

ان تكثير اشجار التفاح عمل يرتكز على اسس علمية معروفة لا يكتب النجاح للقائم به اذا لم يتعرف اليها ولم يرافق تطورها في المختبرات الزراعية الدائبة على كشف النقاب عن الاسرار المكنونة في طبيعة هذه الاشجار حتى يتاح للمزارع استثمارها على اكمل وجه . لذلك وجب على المشتغلين في تكثير اشجار التفاح ان يكونوا ملتمسين الامام الكافي بطبيعة نموها الحضري ، وإثمارها ، وان يميزوا بين صفات اكثر الاصناف التجارية وملاءمتها للبيئة ، ويدرسوا طبيعة نمو الاصول (النصب البرية) وملاءمة التربة لها ، ودرجة تجانسها مع اصناف التفاح ، لان عملية التكاثر تهدف الى انتاج شجرة من صنف معروف ، قوية النمو ، مطعمة على اصل ملائم ، وخالية من الاصابة بالحشرات والامراض الفتاكة . كما يترتب على اصحاب المشاتل دراسة القوانين والأنظمة التي تفرضها عليهم السلطات الحكومية الساهرة على انشاء مشاتل ، متقنة ومنظمة لحماية مصالح المشتريين من الاهمال والغش . ويقدم البحث التالي احداث المعلومات عن انواع اصول اشجار التفاح واساليب تكثيرها ، وتطعيمها ، وكيفية تعهد المطاعم في المشتل .

كولدن ديليشس مثلاً فقد ينتج منها اشجار ذات ثمار حمراء او خضراء او مخططة ، حلوة الطعم او حامضة ، صغيرة الحجم او كبيرة ، ندر ان تشبه في شكلها الصنف الاصلي .

لماذا اذاً لا نغرس العقل الحضري لتكثير اشجار التفاح مع انها تتصف بالصفات الاصلية التي يتميز بها الصنف ؟ اظهرت التجربة انه يتعدى انبات جذور من عقل التفاح في المنبت . ولو سلمنا جدلاً بوجود طريقة لانبات الجذور وانتاج الاشجار من عقل الاصناف التجارية بالكثرة والسرعة المطلوبتين وبنفقات قليلة فلا نفي بالمراد لان هذه العقل تنتج اشجاراً قد لا تلائم التربة والمناخ حيث يراد غرسها كما اوضحت التجربة غالباً ضعفها . ولذلك اوصي المزارع ان يطعم اشجاره على اصول مجرّبة تلائم مناخ مزرعته وترتبتها .

مصادر اصول التفاح - هنالك مصدران لانتاج اصول للتطعيم وهما البذور والاجزاء الحضرية التفاحية . ومع ان المصدر الاول هو الاكثر شيوعاً لسهولة العمل فيه وانخفاض نفقاته يظل للمصدر الثاني ميزاته الخاصة ، وقد زاد استعماله مؤخراً نتيجة للابحاث العلمية التي سهّلت طرق تكثيره . تستخدم الاصول في اوروبا والشرق الادنى من المصدرين حسب رغبة المزارع ، اما في اميركا فلا تزال اكثرية الاصول تنبت من البذور .

اصول التفاح من البذور

بذور النوع مالس كومبونس - كانت بذور النوع مالس كومبونس الفرنسي المصدر الوحيد في « المشاتل » التجارية لانبات اصول برية ، وهي بحكم صلاحها وقدم استعمالها ما زالت مصدر الاصول في اكثر المشاتل الكبيرة في اوروبا حيث توجد منه احراج كبيرة . ومن سيناته ان اشجاره تظهر تفاوتاً

الفصل الثالث والعشرون

انواع اشجار اصول التفاح

(النصب البرية)

اهمية الاصول - تتكون شجرة التفاح في البستان غالباً من المطعوم وهو الجزء الاعلى حامل الأغصان ، فالأوراق ، والثمار ، ومن الأصل او الجزء المكوّن لاسفل الساق والجذور . ويشغل الاصل دوراً هاماً في حياة شجرة التفاح من حيث قوة نموها الحضري وحجمها وانتاجها وملاءمتها للبيئة ومدى حياتها (راجع الفصل الخامس) . لذلك وجب الامام بطبيعة نموه ومدى تأثيره في المطعوم قبل غرسه في المنبت بغية استعماله في تكثير اشجار التفاح اذ ان الاصول المتنوعة تختلف بعضها عن بعض اختلافاً بيئياً بقوة النمو بقطع النظر عن مصدرها . فاذا طعم الصنف استاركن ديليشس على اصل قوي ينتج منه شجرة كبيرة الحجم متأخرة الانتاج والنضج ، واذا طعم على اصل مقصر تتكوّن منه شجرة صغيرة مبكرة النضج لا تعمر طويلاً .

وقد تتساءل : لم لا يُزرع التفاح بذوراً بدلاً من تطعيمه على الاصول البرية ؟ .. لقد ذكر في الباب السابق ان البذرة المكونة داخل ثمرة التفاح لا تحتوي على الصفات الاصلية للشجرة التي نمت عليها بل تحمل صفات عديدة اكتسبتها على مدى الاجيال نتيجة للتلقيح المختلط . فاذا غرست بذور الصنف

طبيعياً في قوة نموها . ويرجع السبب في ذلك لحظي في جمع البذور اذ يعمد اصحاب المشاتل وتجار البذور الى جمع الثمار من الاحراج فيختلط بها القليل من ثمار الأصناف الأخرى التي لا تشبهها بقوة النمو . ومنها نشأ بعض الاختلاف في قوة الانبات في المشتل ، وتباين في حجم الأشجار بعد غرسها في البستان . هذا بالإضافة الى ان هنالك تفاوتاً طبيعياً في قوة نمو الاصول من بذور مالس كومبونس . فاذا تذكرت ان بذرة التفاح لا تحمل الصفات الأصلية الثابتة من الصنف الذي نمت منه لا تستغرب ان تشاهد تفاوتاً في نمو الاشجار ذات الاصل البذري .

بذور الاصناف التجارية - استمر الاصل الفرنسي مالس كومبونس المصدر الوحيد للبذور في اوروبا واميركا الشمالية مدة طويلة لثبوت ملامته للاقاليم الباردة حيث يرغب المزارع في انتاج اشجار كبيرة الحجم قوية . وقد وضعت الولايات المتحدة الاميركية مؤخراً تشريعاً (٩) يمنع استيراد هذا الاصل من الخارج . لهذا السبب لجأ اصحاب المشاتل في تلك البلاد الى استعمال بذور اصناف التفاح التجارية بعد ان تأكد لهم صلاح بعضها لانتاج الاصول ، هذا بالإضافة الى استعمال بذور النوع مالس كومبونس المنتجة في بلادهم .

وظهر بالاختبار العلمي ان الاصول المستنبطة من بذور اصناف التفاح التجارية تختلف في تجانسها للاصناف الأخرى . فثمة اصل من بذرة صنف معروف قد يكبر اشجار صنف ويقصر اشجار صنف آخر؛ مثلاً على ذلك اذا طعم الصنف يورك امبيريل على اصل من بذرة الصنف ماكتنوش انتج اشجاراً كبيرة وقوية، اما اذا طعم الصنف استين واينساب او استيا -رد على اصل من بذرة الصنف ماكتنوش فينتج اشجاراً قصيرة او صغيرة الحجم (٩) . كما ان الاصول المستنبطة من بذور الصنف نورثون اسباي تقصر حجم بعض الاصناف .

وكذلك ثبت ان بذور اصناف التفاح الثلاثية الجنس ضعيفة الانبات ولا تصلح كأصول، ومنها استين واينساب وبراملي سيدلنج وكرافنشتين واركنسا وكراميس كولدن ورينيت دي كندا واينساب (٣) و (٤) .

اما الاصناف التجارية المستعملة لانتاج الاصول في اميركا فهي ثنائية الجنس ومنها رد ديليشس ، روم بيوتي ، يلونبوتن ، واينساب ، بن ديفيس ، يورك امبيريل ، وونتر بنانا (٣) و (٩) . واجودها الاصناف الثلاثة الاولى لان اشجارها قوية وغالباً ما تكون متساوية النمو في البستان . الا ان سوق اكثر هذه الاصناف تصاب بالمرض الفطري فيتوفشورا ككتورم (*Phytophthora cactorum*) ولذلك يضعف نموها احياناً فيظهر غير متساوٍ . الا ان الاصول المستنبطة من بذور الاصناف التجارية هي اكثر مناعة ضد البرد من الاصل مالس كومبونس وخاصة بذور الصنف ماكتنوش ، انا ينصح بالحذر من استعمالها لانتاج الاصول الا بعد التجربة العلمية المحلية .

لا يمكن الحكم على صلاح بذور اصناف التفاح البلدية لانه لم تجرِ اجاث علمية بصددها .

حجم الاشجار المطعمة على اصول بذرية - يعتقد الكثيرون ان الاصول النامية من بذور تكون دائماً اشجاراً كبيرة الحجم ، وهذا خطأ يجب تصحيحه اذ ان حجم الشجرة المطعمة لا يعود الى نوع مصدر الاصل (بذور او اجزاء حضرية) بل يعود الى طبيعة نمو الاصل الذي طعمت عليه . فيترب اذن على اصحاب المنابت ان يميزوا بين حجم الاشجار الناتجة من البذور المتنوعة . فبذور الصنف البرتي براديس (Paradise) تنتج اصولاً تقصر الاشجار المطعمة عليها ، وبذور الصنف دوسان تنتج اصولاً يكون حجم الاشجار المطعم عليها متوسطاً ، كما ان بذور النوع مالس كومبونس تنتج اصولاً مكبرة . وجدير بالذكر انه

يمكن إيجاد اصول مصدر خضري تعطي النتيجة نفسها كما سيأتي .

اصول التفاح من الاجزاء الخضرية

درج المزارع على استعمال الاجزاء الخضرية لتكثير النباتات فافلح في بعضها وفشل في البعض الآخر كما هي الحال في تكثير اصول التفاح من الاجزاء الخضرية لصعوبة انبات جذور عليها . ومن ميزات تكثير الاصول خضرياً ان لها طبيعة ثابتة ، فالجزء الخضري الذي ينفصل عن الشجرة ينمو نموها دون اختلاف . فاصول التفاح المكثرة من اجزاء خضرية - مثلاً - اذا طعمت باحد الاصناف وغرست في التربة والموقع عينها تنمو جميع الاشجار المطعمة عليها متساوية في الحجم . وهذا ما حدا بالعلماء الى درس امكانية تكثير اصول التفاح بهذه الطريقة . وبرغم ما اصابوا من نجاح فانهم لم يبتدوا بعد الى ما يسهل هذا العمل ويقال نفقاته .

مصادر الاجزاء الخضرية - يستحصل على الاصول الخضرية من مصدرين رئيسيين هما : الفسائل والعقل . فالمصدر الاول اكثر شيوعاً ولكنه كثير النفقات . ويقصد بالفسائل الاغراس او « الاشتال » النامية من براعم في اسفل ساق الشجرة وهذا امر كثير الحدوث في اصناف التفاح البلدية ، وتسمى الفسائل عند العامة فروخاً او نطقاً او كخضاً ، والكميات الموجودة منها محدودة ومصادرنا متنوعة .

اما اذا اجري التكثير بطريقة العقل من الاشجار المطعمة فيمكن الحصول على اشجار جاهزة للغرس دون تطعيم وهذا عمل غير مرغوب فيه لضعف نمو جذور تلك الأصناف ؛ كما ان عملية انتاج الاصول من عقل الاشجار البرية شاقة لان الجذور تنبت على العقل بعد نمو البراعم الخضرية فلا تستطيع النبتة تغذيتها فتموت . وتختلف قوة انبات الجذور من العقل بحسب طبيعة الاصناف ؛ فالصنفان دوسان وبرايسس مثلاً تنبت جذورهما على العقل بسهولة ، واما النوع

مالس كوميونس فلا تنبت جذوره الا بصعوبة . وكذلك تختلف قوة انبات الجذور بحسب موقع العقل من الشجرة وبحسب عمرها . فالعقل التي تؤخذ من اشجار التفاح الحديثة تنبت الجذور على عقلها بسهولة بعكس العقل المأخوذة من الاشجار القديمة ؛ واذا كانت العقل حديثة العهد من اغصان لا تتجاوز السنة الواحدة سهل انبات الجذور منها . كما ان الجذور تنمو بسرعة على اطراف العقل البيضاء الحالية من المادة الخضراء .

اصناف التفاح المستعملة للتكثير الخضري - تختلف اصناف التفاح المستعملة في التكثير الخضري باختلاف البلدان ويصعب حصرها . ورغبة في سهولة التمييز جمعناها في ثلاث مجموعات هي : الاصول التفاحية الاوروبية ، والاصول التفاحية الاميركية ، والاصول التفاحية البلدية .

١ - الاصول التفاحية الاوروبية : يصعب احصاء اصناف الاصول التفاحية الخضرية الاوروبية لاتساع انتشارها في ارجاء تلك القارة ، وهي تختلف من حيث نشأتها وتركيبها وتأثيرها في نمو اشجار التفاح . وقد قام علماء الانكليز لأول مرة بجمع اهم هذه الاصناف في بلادهم وعكفوا على دراسة طبيعتها بدقة متناهية في مختبر ايبست موللنج (East Malting) ولذلك عرفت هذه المجموعة باسم اصول موللنج (١٣) و (١٥) . وقسمها العالم هاتون الى اربعة اقسام بحسب درجة تأثيرها في حجم اشجار التفاح وقوة نموها واعطى لكل صنف منها رقماً بدلاً من الاسم الاصلي لتحاكي الارتباك (راجع الجدول التاسع) .

يلاحظ ان ارقام الاصول قد رتبت ترتيباً نسبياً بالنظر لتأثيرها في حجم الاصناف المطعمة عليها . وقد طعمت اصناف كثيرة من التفاح على هذه الاصول في انكلترا واميركا لاختبار طبيعة نموها ومدى تأثيرها في المطعوم . فاصول القسم الاول قصرت بدون استثناء حجم جميع الاصناف المطعمة عليها ، وتحصر

الجدول التاسع : الاقسام الاربعة لاصول مولنج الخضرية

القسم الاول - الاصناف المقصرة الحجم جداً :

- مولنج رقم (٨) VIII واسمه الاصلي فرنش براديس (French Paradise)
مولنج رقم (٩) IX واسمه الاصلي جون دي ميتز (Jaune de Metz)

القسم الثاني - الاصناف المقصرة الحجم نصف تقصير :

- مولنج رقم (٥) V واسمه الاصلي دوسان اميلوري (Doucin Ameliore)
مولنج رقم (٦) VI واسمه الاصلي نون سوتش براديس (Non-Such Paradise)
مولنج رقم (٣) III بدون اسم - منتشر في اوروبا (Un-named European)
مولنج رقم (٤) IV واسمه الاصلي دوتش دوسان (Dutch Doucin)
مولنج رقم (٧) VII بدون اسم - استعماله محدود (Un-named)
مولنج رقم (١٠) X بدون اسم - دوسان سبات رقم ١ (Un-named Doucin of Spath n°1)
مولنج رقم (٢) II دوسان فرنسي او براديس انكليزي (French Doucin or English Paradise)

القسم الثالث - الاصناف المتوسطة الحجم :

- مولنج رقم (١) I براديس انكليزي عريض الاوراق (Broad leafed English Paradise)
مولنج رقم (١١) XI بدون اسم دوسان اخضر (Un-named, Green Doucin)

القسم الرابع - الاصناف الكبيرة الحجم القوية النمو :

- مولنج رقم (١٢) XII بدون اسم. انكليزي الاصل (Un-named, English Origin)
مولنج رقم (١٣) XIII . دوسان اسود سبات رقم ٢ (Un-named, Black Doucin U 2 of Spath)
مولنج رقم (١٤) XIV . دوسان سبات رقم ٥ (Un-named, Doucin of Spath U-5)
مولنج رقم (١٥) XV . دوسان سبات رقم ٦ (Un-named, Doucin of Spath U 6)
مولنج رقم (١٦) XVI . دوسان سبات رقم ٣ (Un-named, Doucin of Spath U3 or Ketziner's Ideal)

فائدتها فقط في حدائق الزينة او في الاقاليم الحارة القليلة المطر .

اما اصول القسبين الثاني والثالث فلم تعطِ نتيجة ثابتة اذ ان بعضها قصرت حجم بعض الاصناف المطعمة عليها وكبرت غيرها . ويعتبر الاصل مولنج رقم ٢ اجود الاصول نصف المقصرة والمتوسطة الحجم وهو يزرع بدون سقي عند الاقتضاء .

وانتجت اصول القسم الرابع اشجاراً كبيرة الحجم؛ فالصنفان مولنج رقم ١٢ ومولنج رقم ١٦ انتجا اشجاراً اكبر حجماً من الاشجار المطعمة على مالس كوميونس المكثّر خضرياً (١٥) . وطعمت اشجار الصنف ماكتنوش على الاصلين مولنج رقم ١٢ ورقم ١٦ حيث بدا حجمها بعد عشر سنوات اكبر من حجم اشجار ماكتنوش المطعمة على اصول مالس كوميونس المكثرة من بذور، وانتاجها اكثر (٣) . وتصلح هذه الاصول للبلاد الباردة والجبال المرتفعة حيث تتوفر مياه الري . والاصل مولنج رقم ١٣ يجود في تربة رديئة الانصراف ثقيلة (البقاع) .

٢ - الاصول التفاحية الاميركية : اجود هذه الاصول هو الصنف فرجينيا كراب (Virginia Crab) الذي يكثر خضرياً فقط لضعف انبات بذوره ويصلح للزرع في المناطق الباردة جداً؛ ومن ميزاته انه يقاوم المرض الفطري فيتوفثورا ككتورم ولا يصاب بلفحة الشمس (Sun Scald)، ويتجانس جيداً مع الاصناف رد ديليش وكولدن ديليشس وكرافنشتين وروم بيوتي وجوناثان . وقد دل الاختبار انه يكبر حجم بعض الاصناف ويقصر البعض الآخر .

٣ - الاصول التفاحية البلدية : يؤكد ان مصدر هذه الاصول هو النوع مالس دوميسنيكا او الانواع التي نتجت منه بالتجين . وبما انه لم تجر بصدها ابحاث نباتية او زراعية علمية لا يمكن الحكم على صلاحها لتكثير اشجار التفاح .

وهي تعرف باسماء عديدة فمنها الاحثاي والسكراجي والجيني والزيداني والنبطي والمجلس والحشاي؛ وافضلها الاحاي والسكراجي والحشاي. اما الاحاي فمصدره شمال لبنان وثماره حمراء اللون حامضة، اشجاره كبيرة قوية تتجانس مع جميع الاصناف وهي دائماً اقوى من الطعم، وتجود في الاتربة الطينية. اما السكراجي ويقال ان مصدره اللاذقية فثماره خضراء اللون حامضة، ينبت الفسائل بكثرة ويتجانس مع جميع الاصناف وهو نصف مقصر. والحشاي هو الصنف الوحيد الذي اجري عليه بحث علمي (في فلسطين) وهو متوسط الحجم مثل دوسان يصلح للاتربة الكلسية الطينية وينمو بدون ري وقد اظهرت اشجاره تفوقاً يئناً على الاصول الاوروبية المتوسطة وخاصة دوسان، ويصلح في مرتفعات لبنان الجنوبي حيث تكثر التربة الكلسية الثقيلة.

المفاضلة بين الاصول الخضرية والبذرية

لقد جرت اجاث قليلة بهذا الصدد ولذا لا يمكن الجزم في تفضيل اية الطريقتين اذ لكل منهما مييزات يفضل استعمالها في ظروف معينة. ففي انكلترا واوروبا كلتاها شائعة، اما في اميركا فتفضل الاصول البذرية لسهولة تعهدها في المنبت وملامتها لمختلف الاتربة والاقاليم.

يستدل من بحث مصادر الاصول البذرية والخضرية انه لاصحة للاعتقاد بان الاشجار المطعمة على اصول من بذور تكون احجامها اكبر من الاشجار المطعمة على اصول خضرية، لان بالامكان انتاج اشجار مطعمة على اصول بذرية احجامها صغيرة وانتاج اشجار مطعمة على اصول خضرية احجامها كبيرة جداً وذلك لان صفة الحجم والشكل في الشجرة تعود غالباً الى عوامل وراثية في الصنف او النوع. مثلاً على ذلك انه اذا غرست اجزاء خضرية من اصول بذرية المصدر في التربة نفسها تنمو اشجارها بحجم الام التي فصلت عنها.

وقد لاحظ العلماء والمزارعون ان الاشجار من اصول بذرية كثيراً ما تنمو متباينة الاحجام. فقد زرعت في احدى محطات التجارب (١) مئات الاشجار من بذور الصنف مالس كومبونس وتركت بدون تطعيم سبع سنوات، وكان الفارق بين قطر سوق تلك الاشجار في نهاية هذه المدة يتراوح بين ثلاثة سنتيمترات وعشرين سنتيمتراً. اما الاشجار من اصل خضري ومن صنف واحد فتكون احجامها دائماً متساوية واذا حدث تفاوت يكون سببه غالباً التربة (٤).

فالفارق الحقيقي الوحيد بين الاشجار المطعمة على اصول خضرية او اصول بذرية هو ان بالامكان ايجاد اشجار متناسبة الحجم والنمو من الاصول الخضرية وتكرار تلك العملية من شجرة واحدة مرغوب في تكثيرها في حين ان الاشجار المطعمة على اصل بذري لا يمكن ضمان تناسب احجامها دائماً (١)؛ لكن السهولة في انبات الاصول البذرية وتعهدتها وتدني نفقاتها ونتائجها المرضية تضمن لها ان تبقى المصدر الرئيسي للاشجار الكبيرة الحجم الى ان توجد طريقة سهلة وقليلة النفقات لتكثير الاصول الخضرية الملائمة.

ليس ثمة من مبرر علمي للاعتقاد بان هيكل جذور الاصول البذرية اوسع انتشاراً وتعمقاً في التربة من جذور الاصول الخضرية وان هذه الاخيرة تبقى دائماً سطحية وضعيفة. فقد كتب العالم هاتون: «وجدت ان بالامكان ايجاد اصول خضرية اما من العقل او بطريقة الترقيد تكون جذورها عميقة الغور جداً وايجاد اصول من البذور تكون جذورها سطحية» (١). والظاهر ان صفة انتشار الجذور هي جنسية وترجع الى صفات وراثية في الاصل والمطعم. هذا اذا استثنينا طبعاً العوامل الخارجية مثل عمق التربة وصلابتها واستعمال ماء الري وطرق التعهد الاخرى ذات التأثير الكبير في طريقة انتشار الجذور وشكلها وحجمها، هذا مع العلم ان للمطعم تأثيراً كبيراً في كيفية انتشار جذور الاصل.

فالقول اذن ان الاصول البذرية تنتج جذوراً وتديةً تعمق في التربة وتنمو عليها جذور ثانوية متينة هو تعليل لا يستند الى خبرة علمية ولا عملية بدليل ان اصحاب «المشائل» الكبري يزيلون ما لا يقل عن ثمانية سنتيمترات من رأس الجذر الوتدي قبل غرس الشتال في المكان المعد للتطعيم ، وذلك بغية عدم امتداد الجذر الوتدي الى الاسفل ولتسهيل انماء جذور ثانوية عديدة بدلاً منه . ومن سيئات الاصول الخضرية انه ينمو على جذور بعض اصنافها وفي اسفل سوقها فسائل كثيرة وهذه ظاهرة غير مرغوب فيها في البستان .

ولا فارق هنالك في الانتاج بين الاشجار المطعمة على اصول بذرية وبين المطعمة على اصول خضرية لان الانتاج صفة ملازمة لصنف الشجرة وحجمها ، وللمناخ والتربة ، والأبعاد بين الاشجار ، وكيفية التعهد . انما قد يكثر انتاج الاشجار على الاصول المقصرة كما تنضج ثمارها باكراً ، وهذه الصفة لا ترجع الى مصدر الاصول بل الى طبيعتها . وكذلك تعمر الاشجار المطعمة على الاصول المكبوتة مدة اطول على انه لا فارق في التعبير بين الاشجار المطعمة على اصول مصدرها بذري او خضري من النوع نفسه .

الاصول الصالحة للزراعة في لبنان

ان اختلاف المناخ وانواع التربة بين منطقة وأخرى في لبنان وانعدام الابحاث العلمية عن الاصول يهيء صعوبة التوصية باستعمال الاصول في الاقاليم المختلفة . وان ما يجب فهمه هو أن احجام الاشجار يجب ان تتكيف بحسب الاقليم . فالاقاليم الباردة تنجح فيها الاشجار الكبيرة ، وقد اثبت الاصل مالس كومبونس صلاحه فيها ، وخاصة اذا كانت التربة طمية او رملية طينية جيدة الانصراف قليلة الكلس ومروية . ولا ينصح بزراعته في المناطق الجافة الدافئة وحيث يكثر الكلس في التربة . وكذلك يصلح الاصل الحضري موللنج رقم ١٢ في المناطق الباردة واشجاره

كبيرة ومتساوية النمو في البستان ؛ كما يزرع ايضاً الاصل موللنج رقم ١٦ في الاقاليم الشديدة البرد ، واشجاره كبيرة الحجم جداً . اما حيث توجد التربة الثقيلة الرديئة الانصراف او التي ترتفع فيها طبقة المياه الجوفية (مثل البقاع) فتفضل زراعة الاصل موللنج رقم ١٣ الذي برهن عن تحمل كبيات كبيرة من الماء شتاءً دون ان يتأثر نمو اشجاره وانتاجها الكثير . والافضل ان تزرع هذه الاصول في الاماكن التي ترتفع عن سطح البحر ٨٠٠ متر فما فوق . كما ينبغي تجربة الاصل فرجينيا كراب المكثف خضرياً في المواقع الكثيرة الارتفاع .

اما في المناطق الدافئة بعض الدفء فينجح الاصل الحضري موللنج رقم ٢ ويعرف ايضاً باسم دوسان الفرنسي ، والاصل موللنج رقم ١ او براديس الانكليزي ، لان احجام اشجارها متوسطة وقوية البنية وخاصة في الاتربة الخفيفة حيث يقل الكلس ؛ ولا مانع من زراعتها بدون سقي لان جذورها تعمق في التربة ، ولكن يفضل الري . وتفضل الاصول الحشائية في الاماكن التي تكثر في تربتها كمية الكلس ولا وجود لماء الري فيها ، فتزرع اشجاره في هذه الحال على ابعاد ٤ × ٤ امتار او اكثر قليلاً ، وهو أفضل من دوسان الفرنسي بدون ري ولكن يجب تدعيم اشجاره حيث تشتد الرياح الموسمية في السنوات الاولى من الزرع على دعائم خشبية متينة .


ولا نوصي بزراعة الاصول المستتبنة من بذور الاصناف التجارية لعدم ثبوت صلاحها في جميع الاقاليم والاتربة ولانها لا تتجانس مع جميع الاصناف . وكذلك لا نوصي باستعمال الاصول البلدية الا في الاماكن الصالحة بعد الاختبار وهي المناطق المتوسطة الارتفاع او دونها . ولا ننصح ان يستعمل الاصل موللنج رقم ٩ ابدأً لأنه يقصر جميع الاصناف ولا مركز له في زراعة التفاح في لبنان سوى في حدائق الزينة .

ملاحظات عن الاصول

تأثير المطعوم في الاصل وتأثير الاصل في المطعوم : يستدل من الابحاث السابقة ان تأثير الاصل في المطعوم وتأثير المطعوم في الاصل أمران جوهريان يجب الانتباه لهما ولذلك يستحسن مراجعتها بدقة في الفصل الخامس .

ظاهرة عدم التجانس بين الاصل والمطعوم : يحدث أحياناً ان المطعوم لا يلتحم آلياً مع الأصل عند نقطة الاتصال فيضعف او يموت (الشكل رقم ٣٤) . وهذه الظاهرة قليلة الحدوث نسبياً في أشجار التفاح ؛ وأكثر ما تحدث في

الاشجار المطعمة على الاصول المقصرة او المتوسطة الحجم . فالاصناف البلدية وبراديس الفرنسي (مولنج رقم ٩) والاصول من بذور الاصناف التجارية غالباً ما يكثر فيها عدم التجانس ، وقد يعطي الاصل الواحد نتائج متناقضة فيلتحم آلياً مع بعض الاصناف دون غيرها . ولذلك وجب درس جميع الحالات الناشئة عن عدم التجانس بين الاصناف المطعمة والاصول الحضرية المتوسطة والمقصرة قبل الجزم بصلاحتها .



(مجامع)

الشكل رقم ٣٤ - ظاهرة عدم التجانس بين الاصل البري والمطعوم . يحدث الانتفاخ عند موضع الاتصال لعدم تجانس النمو والحط في عملية التطعيم .

وأقل ما تحدث هذه الظاهرة في أشجار التفاح المطعمة على الاصل مالس كومبونس والاصول الحضرية المكبرة

باستثناء فرجينيا كراب .

ان الدلائل على عدم التجانس بين الاصل والمطعوم هي : أولاً عدم انسجام النمو بين الاصل والمطعوم وينتج من ذلك انتفاخ في موقع اتصال الطعم بالاصل ، او قد ينمو ساق المطعوم أسرع من ساق الأصل فيظهر أكبر منه قطراً . ثانياً قد تموت الأشجار فجأة بعد نموها في البستان عدة سنوات لأسباب لا علاقة لها بالامراض والحشرات . ثالثاً يضعف النمو الحضرى تدريجياً وتظهر الاشجار في حالة مريضة . رابعاً تقصير الاشجار الناتج من التطعيم الحاطيء وخاصة بالقلم (المزروف) .

لم يتوصل العلماء بعد لمعرفة الاسباب الحقيقية لعدم التجانس في النمو بين الاصل والمطعوم انما توصل بعضهم الى دلائل قد تؤدي يوماً الى اكتشاف حقيقة أمر هذه الظاهرة . ومنها ان أي خطأ ينتج عن عدم الاتصال الكامل بين الطبقة المولدة في الاصل والطبقة المولدة في الطعم يعرقل صعود العصارة الى الاوراق وهبوط الغذاء الى الجذور . وهذا ينتج غالباً عن خطأ في كيفية اجراء عملية التطعيم ، وخاصة التطعيم بالقلم الذي كثيراً ما يسبب انتفاخات عند نقطة اتصال المطعوم بالاصل . ومن هذه الدلائل أيضاً ان أوراق المطعوم لا تستطيع استخدام نوع العصارة الواردة من الاصل وكميتها ، كما ان جذور الاصل لا تمكن من استهلاك الغذاء المجهز في الاوراق (٧) .

الاصول المقاومة للمن القطني : من سيئات الاصل مالس كومبونس تعرض جذوره للاصابة بجمشيرة المن القطني . وأكثر المزارعين يقدرون صعوبة مقاومتها بالطرق العادية بما أهاب ببعض الباحث ان يعملوا على ايجاد اصول مقاومة لها ولم يتوصل حتى الآن أحد الى نتيجة مرضية . ففي استراليا وجنوب افريقيا اهتمدي الى استعمال الصنف نورثون اسباي كأصل للتكثير ولكن نسبة النجاح

الفصل الرابع والعشرون

اساليب تكثير اصول التفاح واعدادها للتطعيم

ليس القصد هنا وصف التفاصيل المتعلقة بانشاء المنابت (المشائل) وتمهدها، فقد اشبع هذا الموضوع بحثاً ووصفاً. بيد انه من الضروري شرح بعض الاعمال لصعوبة الحصول على تفاصيلها ومنها انبات اصول التفاح من البذور والاجزاء الحضرية وتمهدها اذ ان اكثر اصحاب المشائل في الشرق الأدنى يعتمدون على البلاد الاوروبية للحصول على لزومهم من اصول التفاح .

شروط انشاء المنبت (المشئل) - لانشاء مشتل تفاح ناجح يجب انتخاب الموقع والتربة الملائمين ، وتأمين الاصول الجيدة والكمية الوافرة من الماء والأيدي العاملة المختصة والمعدات الحديثة لتوفير الكثير من نفقات العمل . فيجب ان يلاحظ عند انتخاب الموقع بعده عن البساتين القديمة المهمة وعدم تعرضه للرياح الباردة او الحرارة التي تؤثر في قوة الانبات . وأفضل تربة للاستنبات هي الرملية الطيبة على ان لا يُنشأ المشئل في الاتربة الطينية الثقيلة لصعوبة العمل فيها ، ولا الرملية الخفيفة لكثرة نفقات تمهدها . كما يجب ان يتوفر الماء بكمية لا تقل عن خمسين متراً مكعباً لكل دونم من الأرض (١٠٠٠ متر مربع) في الاسبوع الواحد .

كانت محدودة لانه لا يتجانس مع جميع الاصناف بل يقصّر بعضها ويكبر البعض الآخر . كما ان جذوره تنتشر أفقياً في التربة فتتعرض الاشجار غير المرورية للجفاف وتهوي الى الارض في المواقع المعرضة للرياح الشديدة . هذا مع العلم انه لم ينجح في مقاومة حشرة المن القطني كما كان منتظراً .

أما في اليابان فقد استخدم الصنف رينجو من الجنس مالس برونيفوليا (*Malus prunifolia, var. ringo*) كأصل للاصناف الاوروبية والاميركية ونجح نجاحاً تاماً لمقاومته حشرة المن القطني مقاومة فعالة .

وفي الارجننتين (١) وجد العلماء ان التفاح البيري المعروف عندهم باسم كارا صوسيا (*Cara Sucia*) يقاوم هذه الآفة في حال اللجوء الى التطعيم المزدوج فيطعم صنف كارا صوسيا على أصل سفرجل ثم يطعم على ساق كارا صوسيا الصنف المراد تكثيره ويضمن النجاح لان جذور السفرجل لا تتأثر بالمن القطني غير انه يجب الانتباه الى ان لا تزرع اصول السفرجل في تربة كلسية لعدم ملاءمتها لها . ويظهر ان افضل الطرق لمقاومة هذه الآفة هي المثابرة على مكافحتها بالمواد الكيماوية الحديثة .

كذلك يتطلب إنشاء المشتل وجود العمال الأذكياء المدربين باجور متدنية لأن العمل في المشتل يتعدى طور الحرث والعزق والفرس والتطعيم الى علم بمعرفة طبيعة الاصول المتنوعة وصفات الاصناف المرغوب في تكثيرها وتتبع الأحوال الزراعية في الأسواق . كما انه يتطلب من صاحب المشتل مراعاة القوانين والأنظمة الحكومية وتطبيقها بدقة وارشاد المزارعين الى الحصول على اصناف واصول تلائم بيئتهم الطبيعية .

ويجب تجهيز المشتل بالآلات والمعدات والمواد الحديثة للمساعدة على تسهيل اساليب العمل وتنظيمها وتخفيض النفقات واهمها محراث رفع الأشجار و مواد الربط .

نظام المشتل - يضع صاحب المشتل النشيط الخطط الواجب اتباعها في تسيير اعماله . ومن أهم المبادئ الواجب تبنيها والاعتناء بها الاهتمام بالدورة الزراعية اذ لا يسوّغ تكثير الأشجار في مكان واحد سنة تلو سنة . ولذلك يجب تقسيم المنبت الى ثلاثة أقسام رئيسية يستعمل احدها لانبات الاصول وتكثيرها ، والآخر لتطعيم الاصول ، والثالث تزرع فيه البقول ليجهز في السنة التالية للتكثير .

يجب ان يحتفظ صاحب المشتل بسجل يحتوي على عدد الأشجار من كل صنف ، وتاريخ غرسها او تطعيمها ، وأسماء الاصول المطعمة عليها . كما عليه ان يحتفظ برسم قياسي للمشتل مبيناً فيه جميع الأقسام واسماء الاصول والمطاعم وعدد اسرارها كما هي الحال في المشتل . وكذلك توضع في المنبت يافطات خشبية او معدنية على رأس كل سرب او قسم مكتوب عليها اسم الصنف المطعم واسم الاصل ايضاً . وتهدف جميع هذه الاحتياطات الى عدم ضياع اسماء الأصناف المغروسة او اختلاطها .

تكثير اصول التفاح من البذور

مصدر البذور - لاجل انتاج اصول التفاح تؤخذ غالباً بذور النوع مالس كوميونس الفرنسي ، ويجب التحفظ في استخدام بذور الأصناف التجارية واهمها رد ديليشس وروم بيوتي وواينساب وغيرها وبذور الأصناف المكثرة خضرياً وخاصة البلدية .

اعداد البذور - تجمع بذور التفاح من اقراص الثمالة (التفل) الباقية بعد استخراج عصير الثمار الناضجة بوضع الاقراص قبل مضي اربع وعشرين ساعة على عصرها في براميل مملوءة ماء بارداً وتخلط به جيداً فتسب البذور الثقيلة الجيدة في القعر ثم ترفع وتغسل عدة مرات وتوضع على أطباق من القش او الحشب في مكان ظليل معتدل الحرارة مدة اسبوعين ليتم جفافها ؛ وبعدئذ تجمع وتحفظ في وعاء محكم السد في غرفة معتدلة الحرارة لثلاثين يوماً وتضعف قوة انباتها .

التنضيد - لاتنبت بذور التفاح بسهولة الا اذا نضدت وهي رطبة في مكان بارد درجة حرارته ٣٦ - ٤٠ ف . ويرجع السبب في ذلك الى وجوب اجراء بعض التغييرات الطبيعية والكيمائية داخل البذور لايقاظها من حالة الرقاد (٧) . ولا تصلح البذور للتنضيد ما لم تكن طازجة لم يمض على قطف ثمارها اكثر من ستة اشهر . وفضل موعد لتنضيدها في لبنان هو اول شهر شباط او قبله بقليل .

ثمة طريقتان متبعتان في تنضيد بذور التفاح :

الطريقة الاولى : (١) طهر البذور بمحلول بيكلورور الزئبق قوته واحد بالالف لمدة عشر دقائق ثم اغسلها من المحلول و (ب) انقعها في ماء قراح لمدة ثمان واربعين ساعة على ان يغير الماء كل اثنتي عشرة ساعة . والأفضل ان تبقى

البذور بدون ماء مدة ساعتين بعد كل مرة يبدل فيها الماء . (ج) جهز أطباق التنضيد الخشبية بقياس متر مربع وبارتفاع ١٥ سم وضع ٧ سم من الرمل الصافي المرطب في الطبق ورش البذور عليه بكثافة ثم اضع ٣ سم من الرمل الرطب فوق البذور وضع الأطباق في براد لا تقل حرارته عن ٣٦ درجة ف ولا ترتفع عن ٤١ درجة ف (٢-٥ درجات مئوية) لان ارتفاع الحرارة او انخفاضها عن هذا المعدل قد يسبب قتل الجنين في البذور . (د) تفقد الأطباق من حين الى آخر لتتأكد لك رطوبتها المستمرة اذ ان الجفاف ولو بضع ساعات يلحق اكبر الاضرار بالبذور . (هـ) بانقضاء اربعين يوماً يبدأ نبت البذور ولذلك يجب نقلها الى مكان ملائم للنمو . هناك عدة طرق لتنفيذ هذه العملية، فالأفضل ان تزرع البذور على أطباق تشبه اطباق التنضيد على ابعاد ٤ × ٤ سم ومن ثم تُنقل الى المشتل . والبعض يبقي البذور على أطباق التنضيد الى ان تنبت ويبلغ ارتفاعها ثلاثة سنتيمترات ثم تنقل الى اطباق الزرع . والأفضل ان يحدث النبت في مكان دافئ مثل الشواطئ الساحلية .

الطريقة الثانية : ضع البذور الجافة في كيس من الحام وضع معها مقدار ثلث حجمها من كسر دقيق فحم الحطب على ان لا يزيد حجم المجموع عن نصف حجم الكيس . اغلِ ماءً قراحاً في وعاء واسع حتى ١٦٥ درجة ف (٧٤ درجة مئوية) وغطس الكيس فيه عشر نوانٍ وبعد رفعه ضعه في مكان ما مدة نصف ساعة ليبرد . حينئذ غطس الكيس مرة ثانية في الماء الساخن (درجة ١٦٥ ف) لعشر نوانٍ وارفعه وغطسه فوراً في الماء المثلج وقتاً يسيراً (نصف ساعة) وبعد رفعه ضعه في غرفة التبريد بمعدل ٣٦ درجة ف (٢ مئوية) . يقتضي حفظ الكيس في البراد في حالة رطوبة دائماً وذلك برشه المتواتر وتحريكه وتقليبه من جانب الى آخر يومياً . بعد انقضاء ستة اسابيع تبدأ البذور تنبت

فيجب عندئذ زرعها على الاطباق . احذر في اية حال من جفاف البذور في البراد او جفاف جذور الاشتال عند اعدادها للزرع .

نقل الشتل عن الاطباق : الافضل ان تنقل « الاشتال » الى موقع مرتفع وبارد بعض البرودة لان الحرارة المرتفعة تضر بنسوها الغض . كما يفضل ان تنقل « الاشتال » في الايام الباردة او الرطبة على ان لا يتأخر ذلك عن آخر شهر نيسان ، وان تتبع التعليمات التالية حين النقل :

آ - جهز اثلام الزرع في المشتل على ابعاد ٧٠ - ٩٠ سم بين السرب والآخر واسقيها .

ب - انتخب الاشتال القوية منها عندما يبلغ طول سوقها من ٨ - ١٠ سم او عند ظهور الزوج الثاني من الاوراق الحقيقية . اما الاشتال الضعيفة وذات الجذور المتوية فيجب اتلافها .

ج - اقطع رأس الجذر الوتدي الى مسافة ٨ سم من مركز اتصاله بالشتلة فوق الارض . هذا العمل ضروري لمنع نمو الجذر الوتدي لتتشعب منه الجذور الثانوية افقياً في التربة وتنتشر في اكبر مساحة ممكنة فيها .

د - اغرس الاشتال في الاسراب على بعد ٢٠ سم بين الشتلة والاخرى وعلى عمق ١٠ سم مع الانتباه الى ان الجذر الرئيسي هو في وضع عمودي وغير ملتوي . ولتسهيل هذا العمل استعمل آلة ثاقبة (Dibble) لفتح حفر الزرع .

هـ - ثبتت التربة جيداً على جذور الاشتال واسقيها بكثرة في المرة الاولى وضع ستاراً يظللها من شدة اشعاع الشمس وحرارتها المرتفعة اذا كان ذلك ممكناً .

تكثير اصول التفاح من الاجزاء الخضرية

تمة ثلاث طرق لتكثير الاصول من الاجزاء الخضرية في التفاح هي : التكثير

بالفسائل وبالترقيد وبالتعقيل .

التكثير بالفسائل - ينمو من الجذور او من سوق الكثير من اصناف التفاح البري او البلدي فسائل او اشتال يمكن ازلتها مع قليل من الجذور العرضية النابتة عليها وزرعها في المشتل كأصول للتكثير . واشهر الاصناف المنتجة للفسائل هي : الحشائي والاحابي والسكرجي والمجموعة الاوروبية المعروفة باصول مولنج واصل فرجينيا كراب الاميركي . تزرع الفسائل في قسم المشتل المعد للتطعيم في اسراب تبعد من ٧٠ - ٩٠ سنتيمتراً بين السرب والآخر و ٢٥ سم بين الفرسة والأخرى .

التكثير بالترقيد - الافضل ان تجري عملية الترقيد في المواقع الرطبة الباردة لان انبات الجذور يتطلب رطوبة متساوية في اواخر فصل الصيف واوائل الخريف . ترقد الاصول من مصدر بذري وذلك بزرع الاغراس التي لا يزيد عمرها على سنة واحدة منحنية في التراب على زاوية قدرها ٣٠ درجة في اسراب يبتعد واحدها عن الآخر مسافة مترين وتبتعد الفرسة عن الاخرى مترين ايضاً ؛ وبعد موعد الغرس بسنة كاملة تفتح حفرة الى جانب الفرسة طولها متر وعمقها ٤ سم وتحنى الشجرة باكملها في الحفرة وتغطى بالتراب جيداً وتثبت باسلاك تدق في الارض . وعند ظهور البراعم على سطح الارض تغطى بقليل من التراب ، ويزاد ارتفاع التراب كلما نما الفرع الى ان يصبح ارتفاع التراب ١٥ سم . وهكذا تنبت الجذور على اسفل الفرع اثناء الصيف . وهذه الطريقة تنتج كل شجرة من خمس اغراس الى ست على جانب من القوة .

التكثير بالتعقيل - تنتخب العقل من اصناف الاصول المرغوب تكثيرها بعد تحقق صفاتها الطبيعية وقوة نموها وتجانسها مع الاصناف التي ستطعم عليها

وقوة انبات جذورها وملاءمتها للبيئة التي ستغرس فيها . انتخب العقل من اطراف الاغصان التي انتهت نموها في شهر تشرين الاول على اشجار حديثة السن واقطعها تحت احد البراعم مباشرة وبطول ١٥ سم . اقطع الاوراق عن العقل من اسفل حواملها واجمعها حزمياً تحوي كل منها ٢٥ عقلة تربط بالرافيا . غطس جميع العقل في المواد المنبهة لتشجيع انماء الجذور بسرعة (ب ادناه) كما يجب غرسها في اقليم بارد ورطب وهذا شرط اساسي لنجاح هذه العملية . اما اذا رغبت في اجراء عملية التبييض (آ ادناه) على العقل فابدأ من اول الربيع واقطع العقل في اواخر شهر ايلول .

آ - تبييض العقل : ان تبييض العقل عملية شاقة جداً (٧) . اصنع اكباساً اسطوانية من الورق الاسود الادكن بطول ٢٥ سم وقطرها ١٠ سم . لبس بهذه الاكباس الاغصان الحديثة التي لا يتجاوز طولها ٣ سم ، وبعد بلوغ الاغصان طول ١٥ سم ارفع الاكباس وغلف الاغصان حالاً من اسفلها الى ارتفاع ٨ سم بلقائف سوداء دون ان تضغط عليها . وفي شهر ايلول على الاكثر ازل اللقائف واقطع العقل وغطس اسفلها بالمادة المورمونية .

ب - تغطيس العقل بالمادة المورمونية : هناك طرق عديدة ومواد كيميائية متنوعة تستعمل لتغطيس اسفل العقل قبل الزرع . وقد دل الاختبار على ان الحوامض المتبلورة : اندول اسيتك (Indol Acetic) واندول بيتورك (Indol-Byturic) ونفشيل اسيتك (Naphthyl Acetic) المعروفة بالمواد المورمونية الكيميائية لها مفعول اوكسين الف و اوكسين باء (Auxina & b) والهيتيرو اوكسين (Hetero - auxin) النباتية المصدر دون اي فرق . يمكن تغطيس اسفل العقل بالمحلول الكثيف كما يلي : ذوب غراماً واحداً من المورمون في نصف لتر من الكحول عيار ٩٥٪ واضف اليها نصف لتر من الماء . غطس اسفل العقل

الى ارتفاع ٥ سم فترة لا تتجاوز بضع ثوان . ثم غطس اسفل العقلة بمادة فيتامين ب ١ (Vitamin B1) المعروف باسم ثيامين (Thiamin) المحلول بالماء (بمعدل مليون غرام واحد في لتر ماء) لمدة ٢٤ ساعة . ان عملية التغطيس الاخيرة اختيارية .

ج - غرس العقل : بعد انتهاء عملية تغطيس العقل ازرعها حالاً في التربة دون ان يتأخر ذلك عن شهر تشرين الثاني بالطريقة التالية : جهز احواض زرع العقل بعرض متر وطول مناسب للعمل . ضع رملاً خشناً على ارض الحوض بارتفاع ١٠ سم وضع فوقه تراباً مزوجاً نصفه بالرمل والزبل العضوي المخمر الناعم الى ارتفاع ٧ سم واضف فوقه طبقة من الرمل الحشن واستقر الحوض . احذر ان تجهز كمية كبيرة من الخزم في آن واحد فلا تستطيع زرعها جميعها في الاحواض قبل ان تجف اطرافها . رص التراب جيداً واقفح الحفر بألة صغيرة حادة مستديرة الى عمق ٨ سم في اسراب يبعد احدها عن الآخر مسافة ٥ سم واغرس العقل فيها على ابعاد ٣ سم ورص التراب جيداً واسقيها .

ظلل الاحواض من حرارة الشمس في الحريف اما بالقصب او بغيره . اما في الشتاء فيجب المحافظة على العقل من البرد الشديد بوضع الحصر فوقها اذ ان الجذور لا تتكون اذا انخفضت الحرارة كثيراً . انتبه ان تكون الاحواض في حالة رطوبة دائماً . ان العقل المقروسة في شهر تشرين الثاني يكتمل تكوين جذورها في شهر نيسان ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لنقلها الى مكان آخر حيث تفرس في تربة رملية طينية مسدة بالسباد العضوي المختبر مضافاً اليه ما لا يقل عن ١٥٠ غرام من سباد السوبر فوسفات لكل متر مربع .

اغرس العقل الناجحة في اسراب تبعد ١٢ سم بعضها عن بعض و ٦ سم بين الفرسة والاخرى . وانتبه ان تفرس العقل حال رفعها من الاحواض لان جذورها تكون عرضة للتلف السريع . ثبتت التراب على جذور الاغراس واسقيها حالاً . لا تبقى اكثر من فرع واحد على العقلة . بعد انقضاء سنة كاملة ارفع الاغراس وازرعها في قسم المشتل المعد للتطعيم كما تفرس الفسائل .

الفصل الخامس والعشرون


تطعيم اصول التفاح وتعهد المطاعيم

يقصد من هذا الفصل ابراز الاتجاهات العلمية الحديثة في التطعيم لا وصف كيفية اجراء عملية التطعيم التي يتقنها الكثيرون في البلاد . يستعمل التطعيم غالباً لتكثير الاصناف في المشاتل ، وقد يلجأ المزارع احياناً بواسطته الى تغيير الاصناف غير المرغوبة في البستان، او الى ادخال اصناف مملوكة اليه، او تغيير اصناف لا تلائم الاقليم ، او لتجديد حياة بعض الاشجار المصابة باعراض طبيعية او بالهرم (التطعيم الجسري الشكل رقم ٣٦) .

فعملية التطعيم هي بالفعل الصاق الطبقة المولدة في الصنف بالطبقة المولدة في الاصل وفي كلتا الحالتين تقع هذه الطبقة بين اللحاء (القشرة) والخشب؛ ولضمان نجاح نمو المطعوم يجب ان يكون الاتصال الآلي بين الطبقتين المولدتين اتصالاً تاماً . وبما لا جدل فيه ان الاتصال الناقص الناتج من التطعيم الخاطيء يضعف نمو الشجرة الحضري ويقلل انتاجها ويعجل اجلها في البستان (١) و(٧) .

لماذا يفضل التطعيم بالبرعم - ثمة ثلاثة اسباب رئيسية لتفضيل التطعيم بالبرعم على التطعيم بالقلم : اولاً - جعل التحام الطعم والاصل تاماً ومتيناً آلياً وبذلك يصبح التجانس بينهما طبيعياً اذ ان عدم التجانس يضر بالانسجة ويقصر حجم الشجرة ويعجل اجلها . ففي التطعيم الصحيح الذي يتيح الارتباط الآلي السليم

بين الاصل والطعم تنمو الخلايا من الطعم وتستطيل باتجاه خلايا الاصل وتتشابك بعضها ببعض ؛ كذلك تنمو خلايا الاصل علواً وتتشابك مع خلايا الطعم فينتج من هذا التشابك التحام متين واتصال طبيعي (الشكل رقم ٣٥) . وقد يحدث احياناً اثناء عملية التطعيم ان بعض الخلايا المولدة في القلم ونادراً جداً في



(تشاندلر)

الشكل رقم ٣٥ - مقطع طولي لمطعوم بالبرعم وآخر بالقلم :

التطعيم بالبرعم : تبين الارقام ١ - ٢ - ٣ خط التحام الاصل بالمطعوم ؛ ان التشابك التام بين خلايا الاصل والطعم جعل من الصعب تمييز الخط الفاصل بينهما .

التطعيم بالقلم (المزروف) : بين الرقمان ٤ - ٥ خط التحام الاصل البرعم بالمطعوم كما يظهر بوضوح عدم التشابك التام بين خلايا الاصل والمطعوم .

البرعم لا تلتصق بالخلايا المولدة في الاصل بعد اتمام التطعيم مباشرة فتتو تلك الخلايا منفصلة عن الاصل ويتقدم هذا النمو الانفصالي ويحدث الانتفاخ عند

نقطة الاتصال (الشكل رقم ٣٤) . وكثيراً ما يكون عدم الاتصال هذا مسبباً عن حالة الاصل حين التطعيم او الحطّ في كيفية اجراء التطعيم . كما ان عدم نمو بعض خلايا الطعم قد بسبب نتوءات على الاصل تمنع النمو الطبيعي في انسجة الاصل او ترغم اللحاء على النمو بين الاصل والطعم . ثانياً - كثيراً ما تظهر انتفاخات في موقع التحام الاصل بالطعم والاشجار ما تزال في المشتل فيكون سببها بعض الامراض التي تبيد الاغراس بعد نموها في البستان بثلاث سنوات . وتدخل هذه الامراض الى المطعوم من الجرح الكبير الذي يفتح في الاصل لاجراء عملية التطعيم بالقلم (الشكل رقم ٣٥) ، بينما يصعب دخول هذه الامراض عن طريق التطعيم بالبرعم .

ثالثاً - لقد عدل اكثر اصحاب المشاتل التجارية حديثاً عن التطعيم الشقي والساني ، واستعاضوا عنهما بالتطعيم الحريفي بالبرعم لانه يمتاز عنهما بما ينتج من مطاعيم هي اكبر حجماً واكمل نمواً وذات خشب تام النضج .

مواعيد التطعيم - تطعم اصول التفاح بالبرعم في المشتل في الربيع او الحريف ، ويعرف هذا الاخير بالتطعيم الحريفي الراقد (Dormant Budding) . ويجري التطعيم الشقي والانكليزي والساني والجسري بالقلم في الشتاء عنده تحرك العصارة . وتفضل الاغلبية التطعيم الحريفي بالبرعم لان التطعيم الربيعي بالبرعم لا يعطي المطعوم الوقت الكافي لاتمام نضج خشبه كما ان التطعيم بالقلم قد يسبب اعراضاً ضارة بالاشجار لا يمكن الانتباه اليها الا بعد زرعها في البستان بمدة طويلة . ومن اهم امور التطعيم بالبرعم توقيت جريان العصارة في الاشتال اذ انها تتوقف على قوة النمو ، وتوفر مياه الري ، وارتفاع موقع المشتل ، فجريان العصارة يتأخر في المواقع المرتفعة الباردة عنه في المواقع المنخفضة الدافئة .

انتخاب الاصناف - ان معرفة الصفات الطبيعية التي تتميز بها اصناف

التفاح التجارية ، والعلم بالبيئة التي تلائم كل صنف لامر ضروري لاصحاب المشاتل ولمساعدهم في توجيه المزارعين وايقاظ اذهانهم حرصاً على مصلحة البلاد . وقد وصفنا تسعة عشر صنفاً منها وصفاً موجزاً على امل ان يستفاد من تلك الاوصاف ايضاً في توجيه ادارة المشاتل التجارية التي توجب إيجاد المطاعيم الموافقة لجميع انواع الاتربة والمناخ مطعمة على افضل الاصول .

انتخاب البراعم - يعتقد الكثيرون ان لانتخاب البراعم صلة وثيقة بالنسبة لغوة اشجار التفاح وكثرة انتاجها . وقد استطاع علماء الزراعة ان يثبتوا ان اشجار التفاح لا تنقل صفة الانتاج الخاصة ببعض اغصانها بواسطة البراعم (٤) لان صفة الانتاج ترجع فعلاً الى عوامل عديدة متشابكة منها وراثية تتعلق بصفة انتاج الصنف ومنها خارجية وهي الاكثر تأثيراً مثل ملائمة الصنف للبيئة والاصل ، وملاءمة الاصل للتربة ، وطرق التعهد . الا انه لا يمكن ان تحدث اضرار تذكر اذا انتخبت البراعم من اشجار قوية غزيرة الانتاج ، هذا مع العلم ان انتخاب البراعم سلاح يستعمله العلماء لاكتشاف اصناف جديدة تنمو من اغصان مشرة ظهرت عليها طفرات يرغب في درسها وتكثيرها .

انتخب البراعم من النمو السنوي الجديد واجتهد ان تأخذها من اواسط الشجرة الخارجية او اطرافها السفلى لا كتمال نضجها ؛ لا تقطع القلم في موقع اتصاله مباشرة بالفرع لان براعمه السفلية والطرفية تكون ضعيفة غير كاملة التكوين . انتبه ان لا ينقص قطر القلم عن اربعة مليترات ولا يزيد على اكثر من ثمانية ، فالاقلام الضعيفة غير ملائمة وكذلك القوية جداً . اجمع اقلام كل صنف بمفرده واقطع البراعم الطرفية وحوامل الاوراق من وسطها وضم كل خمسين قلماً في حزمة واربطها وعلق بها يافطة خشبية صغيرة تحمل اسم الصنف . لف الحزم بالقماش المبتل واحفظها في مكان ظليل وبارد حتى موعد التطعيم . وفي ايام

الشتاء يمكن حفظ الاقلام في البراد او الرمل البليل .

اعداد الاصول للتطعيم - يفضل تطعيم الاصول النامية بعد نبتها من البذور بستين في المشتل . يجب ري المشتل قبل التطعيم بأسبوع واحد لتشجيع جريان العصارة النباتية وتسهيل قشر اللحاء . وقبل التطعيم بيوم واحد يجب ازالة فروع الغرسة الى ارتفاع ٢٥ سم عن سطح الارض مع وجوب الحذر من القيام بهذا العمل قبل حلول اوان التطعيم بوقت طويل لئلا يلتصق اللحاء بالخشب ويعرقل عملية التطعيم .

ملاحظات عن التطعيم بالبرعم - اذا طعمت الاصول القوية فقط فقد تنتج اكبر المطاعم في آخر الموسم وتكون في حجمها جميع رفاق عمرها المغروسة في البستان . ولذلك لا يحسن تطعيم الاصول التي يقل قطرها عن سنتيمتر واحد . كذلك ينصح باجراء عملية التطعيم في الجهة الشمالية من الاصل لوقاية البرعم من التعرض المباشر لاشعة الشمس المحرقة على ان يوضع الطعم على ارتفاع ١٥ - ٢٠ سم عن سطح الارض لانه يتضرر بنتيجة تعرضه للحرارة الشديدة الناشئة عن قربه من سطح الارض في الاقاليم الدافئة . وبما انه من الضروري ابقاء ما لا يقل عن خمسة سنتيمترات من الاصل فوق التراب عند غرس المطعم في البستان فهذا التطعيم العالي يساعد على تنفيذ هذه العملية .

يفضل البدء بربط الطعم من اسفل الى اعلى وذلك باستعمال اللقائف الاصطناعية المصنوعة من المطاط بدلاً من الرافيا فهي افضل منها لان ضغطها على الطعم متساوٍ وطبيعي ، وهي تتسع مع نمو الساق المطرد ، ولا ضرورة لازالتها بعد بدء نمو البرعم لانها تتلف وتزول بانقضاء الحاجة اليها .

التطعيم المزدوج

كثيراً ما تصاب سوق بعض اصناف التفاح التجارية بامراض فطرية او طبيعية تضعف نموها وانتاجها ، فاتقاء لهذه المضار لجأ اصحاب المخابز التجارية الى



(بك)

الشكل رقم ٣٦ - التطعيم الجسري : اذا تضرر ساق الشجرة ورغب في تجديد حياتها يلجأ للتطعيم الجسري . ازل القشرة الجافة عن الموضع المتضرر الى الخلايا النامية . احفر مواقع الاقلام في اللحاء (القشرة) وجيز الاقلام بالطول الضروري وابر جانب كل من طرفها كما في الشكل (١) والصقها في مواضعها مستملاً المامير الصغيرة كما في الشكل (٢) . اطل جميع الاقلام بمادة لزجة كما في الشكل (٣) .

مبكر شديد الوطأة . لا تسقى المطاعيم بعد تطعيمها في الحريف اكثر من مرة واحدة لئلا تدفع البراعم الى النمو المتأخر فتتوت في الشتاء .

اعداد المطاعيم للبيع

على صاحب المشتل الراغب في اعداد اشجاره للبيع ان يتنبه الى ما يلي :
اولاً - الا^١ يقلع المطاعيم من المنبت قبل بدء سقوط اوراقها ودخولها في طور الرقاد والاستراحة . كما ان من الجهل ابقاءها في المنبت بدون قلع الى حين الزرع .

ثانياً - ان يجتهد برفع اكبر كمية ممكنة من الجذور مع المطعوم ، فمن الثابت ان لكمية الجذور تأثيراً مباشراً على حالة نمو المطعوم في البستان . ان ازالة الجذور او تخفيفها اما بالقلع الرديء او بالتقليم هو بمثابة عملية تقصير للشجرة . وافضل طريقة لقلع المطاعيم في المشتل التجارية هي جرح حداث حاد ومعقوف على شكل U معد خصيصاً لهذا العمل تحت جذور المطاعيم في الاسراب . وهذه الطريقة لا تضمن اكبر كمية من الجذور فحسب بل هي اقل نفقة واسهل من القلع باليد والمعول .

ثالثاً - ازل الجذور المرضوضة وطهر الجذور بحلول كبريتات النيكوتين بنسبة اثنين بالالف وذلك بوضعها فيه فترة قصيرة .

رابعاً - احرص على ان تكون المطاعيم قوية النمو ، ناضجة الخشب ، ملساء القشرة ، سليمة من الأمراض والجروح ، وان لا تقل المسافة بين مجامع الجذور والطعم عن ٢٥ سم . وتفضل في جميع الحالات المطاعيم المطعمة بالبرعم في الحريف .

خامساً - بعد سقوط الأوراق في آخر الحريف اقتلع المطاعيم من المشتل واطرها في خنادق مجهزة سابقاً بالطول المناسب وبعرض ٥٠ سم وعمق ٣٠

تطعيم الاصل البذري بمطعوم من صنف معروف بمقاومته للمرض فيصبح هذا الأخير ساق الشجرة ويطعم عليه بعدئذ الصنف المطلوب تكثيره على ارتفاع معقول عن التربة . فالصنف كرايمس كولدن يصاب بمرض تعفن الرقبة (Collar Rot) ولذلك يجب ان يطعم على ساق من الصنف دبيلشس . ويجب ان يطعم الصنف كرافنشتين على ساق الصنف روم بيوتي لتلافي عرض العصارة الحامضة (Sour Sap) المزمّن في هذا النوع ؛ ولقد نجحت هذه العملية لكنها اقتضت التكاليف الكثيرة .

تعهد المطاعيم في المشتل - ان الغاية المنشودة من التعهد هي ايجاد مطاعيم قوية النمو سليمة من الامراض والحشرات لا يزيد عمرها عن سنة اعتباراً من تاريخ تطعيمها . وتوصلاً الى هذه الغاية وجب على صاحب المشتل ان يقوم بما يلي :
بعد مرور اثني عشر يوماً او اقل على التطعيم حل الرباط اذا كان من الرافيا وتبين حالة الطعم . فاذا كان التطعيم ربيعياً يجب ازالة اجزاء الشجرة فوق مركز الطعم تدريجياً ، اذ ان ازالة تلك الاجزاء دفعة واحدة تحدث هزة عنيفة في الاصل قد ينتج عنها موت الطعم لعدم تمكنه من تصريف كمية الغذاء التي تدفعها اليه الجذور وخاصة في الاتربة الطينية . اما اذا جرى التطعيم في الحريف فلا يمكن ازالة جميع الفروع الا في اواخر الشتاء التالي قبل بدء اندفاع العصارة بقليل .

وللمحافظة على رطوبة التربة واستفادة المطاعيم منها يجب تنظيفها من الاعشاب بعزقها عدة مرات اثناء الربيع والصيف ، وازالة كل نمو يظهر على الاصل تحت الطعم ، وري المطاعيم من اربع مرات الى خمس اثناء الصيف ؛ ومن الافضل التوقف عن سقي اشجار المنبت في اواخر شهر آب ليتسكن النمو الحضري من النضج قبل حلول فصل الشتاء والا تعرض لضرر بليغ في حالة هبوط صقيع

مراجع الباب السادس

- ١ ف. و. كاردنزوف. س. برادفورد و. ه. و. هووكر - مبادئ انتاج التمار - كتاب - ١٩٣٩ .
- ٢ ي. س. اوختر و. ه. ب. تاب - زراعة اشجار البساتين والاشجار الصغيرة - كتاب - ١٩٣٧ .
- ٣ ج. ه. كورلي و. ف. س. هولت - الطرق الحديثة لانتاج التمار - كتاب - ١٩٤١ .
- ٤ و. ه. تشاندلر - بساتين الاشجار المتساقطة الاوراق - كتاب - ١٩٤٧ .
- ٥ ي. ب. هيدريك - تصنيف التمار - كتاب - ١٩٢٥ .
- ٦ ج. و. ادريانس و. ف. ر. بريسون - تكثير النباتات الشجرية - كتاب سنة ١٩٣٩ .
- ٧ م. ج. كيفس و. ل. م. مكوستن - تكثير النباتات - كتاب سنة ١٩٤٢ .
- ٨ ر. ج. كاردنز - كتاب الجيب للتطعيم - ١٩٤٩ .
- ٩ ل. ه. داي - اصول التفاح والسفرجل والكمثرى في كاليفورنيا. مجلة محطة التجارب الزراعية، جامعة كاليفورنيا رقم ٧٠٠ ايار ١٩٤٧ .
- ١٠ ج. اموس و. ت. ن. هولدين الخ - ابحاث في عدم التجانس بين الاصل والطعم - التقرير السنوي لمحطة الابحاث الزراعية ايست مولنج - انكلترا - ص ٨١ - ٩٩ سنة ١٩٣٥ .
- ١١ ر. ه. روبرتس - التطعيم الشقي والمزدوج في التفاح . مجلة محطة التجارب الزراعية - جامعة وسكونسن رقم ٤٣٢ سنة ١٩٣٦ .
- ١٢ ت. ج. تالبرت - تكثير النباتات بالبذور والمقل والترفيد والفسائل - مجلة محطة التجارب الزراعية - ولاية ميسوري رقم ١٩١ سنة ١٩٣٦ .
- ١٣ ر. ج. هاتون - ابحاث في اصول التفاح - مجلة علم الاشجار مجلد ١٣ ص ٢٩٣ - ٣٥٠ سنة ١٩٣٥ .
- ١٤ ه. ب. تكلي و. ك. د. بريس - كيفية نمو اصول مولنج التفاحية في المشتل - وقائع الجمعية الاميركية للعلوم الشجرية مجلد ٣٦ ص ١١٣ - ١١٥ سنة ١٩٣٩ .
- ١٥ ج. ك. ارجيل - مراجعة الابحاث المتعلقة بعدم التجانس بين الاصول والطعم في الاشجار المثمرة - مجلة المجمع الامبراطوري لانتاج التمار - محطة ايست مولنج للتجارب الزراعية - كنت - انكلترا - الرسالة العلمية رقم ٩ ص ١ - ١١٥ سنة ١٩٣٩ .
- ١٦ ج. ب. فان اسلتن - تصنيف شجرة التفاح - وقائع الجمعية الاميركية للعلوم الشجرية سنة ١٩٣٠ .

سم قريبة بعضها من بعض على زاوية ٣٠ درجة ؛ رص التراب جيداً واسقيها اذا كان التراب جافاً .

سادساً - حافظ درماً على اسم الصنف والاصل بوضع يافطة خشبية على رأس الأسراب الجديدة .

سابعاً - لا تسمح بنقل المطاعم من المشتل الى موقع الزرع بدون ان تحافظ على رطوبة جذورها وذلك بوضع قليل من القش المبتل بين الجذور ولقها بالخيث المرطب وربطها باحكام .

الباب السابع

وقاية اشجار التفاح وثمارها

يصعب تقدير الاضرار الناجمة سنوياً عن فتك الحشرات والامراض الزراعية باشجار التفاح وثمارها ولا شك انها تربو على ملايين الليرات في بلاد الشرق الادنى وحده ، ويمكن مضاعفتها باستمرار اهمال المزارع بها والمسؤولين عنها . وبما لا يجتمل الشك ايضاً ان نفقات التدابير الوقائية الضرورية للمحافظة على سلامة هذا المحصول تساوي جزءاً يسيراً من ثمنه والا لما امكن اتخاذ هذه القاعدة كأساس عالمي لاتقاء شر هجوم الآفات الطبيعية المتواصل ، ولاستسلم الفلاح للباس بسبب خسائره الفادحة .

تنتج اضرار اشجار التفاح وثمارها من فتك الحشرات والامراض والحيوانات والاعراض الغذائية والطبيعية وستبحث جميعها باسهاب في الفصول التالية . ومع ان العلم لم يتوصل بعد الى ايجاد الطرق والادوية الواقية المجدية للقضاء على الآفات الزراعية قضاءً مبرماً فلا بأس ان نشرح اهمها ونشير الى احدث اساليب الوقاية لملافاة الخسائر الناجمة منها لان كثيراً من المسؤولين في فشل الاعمال الوقائية يعود الى جهل المزارع كيفية تنفيذ التعليمات التي يوجهها اليه المسؤولون لحدائة عهده بتعهد اشجار التفاح وثمارها .

- ١٧ ف. و. الن. - مراسلات خاصة مع المؤلف سنة ١٩٤٨ .
١٨ ر. ي. - بينز - مرض فيتوفثورا او مرض الرقبة في ساق التفاح . مجلة الابحاث الزراعية مجلد ٥٩ ص ١٥٩ - ١٨٤ سنة ١٩٣٩ .
١٩ ف. ي. كاردنر - التبييض وسيلة لانبات الجذور على عقل التفاح - وقائع الجمعية الاميركية للعلوم الشجرية مجلد ٣٤ ص ٣٢٣ - ٣٢٩ - سنة ١٩٣٧ .
٢٠ اي. سي. هوط - ابحاث في تنضيد بذور الاشجار المثمرة - مجلة محطة التجارب الزراعية - ولاية مرييلند رقم ٤٢٠ سنة ١٩٣٨ .

الفصل السادس والعشرون

الحشرات الضارة بأشجار التفاح وثمارها

لا نستطيع ان نفي هذا الموضوع حقه هنا لاتساعه وغزارة مواده ولذلك سنقصر البحث على اهم الحشرات التي تعتري التفاح ؛ فعلى الراغب في الحصول على تفاصيل اوسع ان يراجع المؤلفات العديدة التي وضعها رجال الاختصاص في هذا القيل. ان اهم ما يلفت نظر المزارع بالنسبة لهذه الحشرات اربعة امور : كثرتها ، وتخصصها ، وكيفية تكاثرها وتطورها ، وكيفية احداثها الاضرار في اجزاء الشجرة .

عدد الحشرات التي تصيب اشجار التفاح - يصعب تقدير عدد انواع هذه الحشرات بالدقة انما يعتقد انها تربو على خمسة وثمانين صنفاً ولا يقل عدد الموجود منها في لبنان (١) والتي جرى وصفها والتثبت منها عن خمسين صنفاً . ولا يمكن اعتبار هذا العدد كاملاً لانه لم يجز التعرف الى البعض القليل منها ، كما ان هناك اختلافاً بالرأي على وجود البعض الآخر . وتجد في الجدول العاشر قائمة باهم الحشرات التي تعتري اشجار التفاح وثمارها في لبنان .

تخصص الحشرات في عملها - قد تصيب هذه الحشرات جزءاً دون الآخر ، فمنها ما يختص بالساق والاعضان ، ومنها ما يصيب الاوراق ، ومنها ما يتلف

الثمار ، ومنها ما يتطفل على جميع الاجزاء دون تمييز مما يجعل من العسير جداً حصر المكافحة بجزء خاص من الشجرة .

تكاثرها وتطورها - تتطور اكثر الحشرات فيتغير شكلها وحجمها وتركيبها كما تتغير عاداتها وطبائع نموها في اربعة ادوار هي : البيضة وتنفس في الاحوال الطبيعية وتخرج منها اليرقة (الدودة) ويعتبر هذا اخطر ادوار الحشرة فهي التي تلتهم اجزاء الشجرة لتقتات منها ؛ ومتى بلغت هذه اليرقة تدخل دور العذراء فتتمتع عن الاكل وتغلف نفسها بالشرنقة وتتحول في داخلها الى خنفساء او فواشة فتخرج من الشرنقة لتضع البيضة وتعيد سيرتها. ومع ان اكثر هذه الحشرات تستكمل ادوار تطورها في عام واحد او اكثر فان بعضها يتم دورين او ثلاثة ادوار او اكثر في العام الواحد اذا كانت الظروف ملائمة لموها وبذلك يصبح ضررها بالغاً جداً والوقاية منها صعبة كما هي الحال في حشرة دودة ثمار التفاح . ويستطيع بعض هذه الحشرات ان يتكاثر دون ان يمر بجميع هذه الاطوار اي انه يتكاثر عذرياً كما هي الحال في اكثر انواع المن فهي شديدة الفتك ولا تجدي في قمعها مكافحة غير منتظمة اذ لا يمكن حصر المكافحة في موعد معين .

كيفية احداث الاضرار في الاشجار والثمار - يتوقف نوع الضرر الذي تصاب به الاشجار على كيفية تركيب فم الحشرة . فمن الحشرات ما لها فم قارض تأكل بواسطته المادة الخضراء او الاوراق او لب الثمار او الحشب ويتوقف ذلك على نوع الحشرة . ولبعض الحشرات الاخرى فم ماص فيه انبوبة او ما شابه ذلك تمر في داخلها السوائل ، ومنه اشكال متنوعة تستطيع بواسطتها الحشرات امتصاص العصارة الحلوية من قشرة الساق او الاغصان او الثمار او

الازهار . وقد يأتي الضرر في بعض الحشرات الاخرى من طبائع وضعها البيض بما يوحي ضرورة وضع منهاج للوقاية الجماعية .
وقد رأينا ان نصف بعض الحشرات الهامة لتعريف المزارع الى طبائع نحوها وطرق تكاثرها واحداثها الاضرار لتقدير اهمية استخدام الدقة في تنفيذ تفاصيل اعمال الوقاية الجماعية .

المن

(Aphidae)

ان حشرة المن اشهر من ان تُعرف، فهي متعددة الأنواع متباينة الاضرار ، واهمها بالنسبة لشجرة التفاح في الشرق الادنى ثلاثة انواع : ١ - المن الاخضر (*Aphid pomi, de Geer*) و ٢ - المن الوردى (*Anuraphis roseus, Baker*) و ٣ - المن القطني (*Eriosoma lanigera, Hausm.*) . تهاجم هذه الانواع الثلاثة الاوراق والاعصان والبراعم وتمتص عصارتها وتحدث فيها اضراراً فادحة وتضع نحو الشجرة كثيراً .

يقضي النوعان الاول والثاني الشتاء في دور البيضة ، وهي سوداء لامعة يمكن مشاهدتها على الاغصان والفروع بالقرب من البراعم وفي الشقوق على الساق تحت القشرة . وقبل تفتح البراعم في الربيع تنفق البيوض وتخرج منها اناث غير مجنحة لونها اما اخضر او احمر زاه تبعاً لنوع الحشرة ؛ ومن شأن هذه ان تجعد الاوراق وتختبيء داخل التجاعيد وتمتص العصارة وتعطل الاوراق عن القيام بوظائفها . تبدأ هذه الحشرات بعد اسبوع بالتكاثر العذري او البكري دون ان تمر في دور البيضة وتضع الواحدة منها من ثلاث الى اربع حشرات ماثلة لها يوماً في الاحوال الملائمة ، وبعد بلوغ هذه الحشرات الجديدة اسبوعاً من العمر تبدأ بالتكاثر ايضاً ، وهكذا يستمر التناسل على هذا المنوال طيلة ايام

الجدول العاشر - اساء ام الحشرات التي تعذي اشجار التفاح في لبنان (١) و (٥)

الاسم العربي	الاسم اللاتيني	جزء الشجرة المصاب	عدد الاجيال	مدى انتشار الحشرة واضرارها
حمار ساق التفاح	<i>Zeuzera pyrina, L</i>	الساق والاعصان	١	واسع جداً وفادح
المن القطني	<i>Eriosoma lanigera, Hausm.</i>	»	كبيرة	واسع جداً وفادح متوسط
الصرصور العمري	<i>Anacridium aegyptiacum, L.</i>	الجدور	١	محلي قليل الضرر .
حمار الجدور	<i>Capnodis tenebrionis, L.</i>	الاوراق	١	واسع وفادح احياناً
صندل اللوز الحرشفي	<i>Ditobia caeruleocephala, L.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
قارضة الاوراق	<i>Argyroploce variegana, Hub.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
ثاقب الاوراق	<i>Lyonetia clerkeella, L.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
ساتوريا	<i>Saturnia pyri, L.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
برغوث التفاح	<i>Rhamphus puticarius, Hbst.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
الدودة الناصجة	<i>Hyponomeuta malinellus, F.</i>	»	١	واسع جداً وفادح احياناً
دودة اوراق الكرز	<i>Ertocampoides timacina, Konow</i>	الاوراق والاعصان	٢	واسع جداً وفادح احياناً
المن الاخضر	<i>Aphid pomi, de Geer</i>	الاوراق والتار	كبيرة	واسع جداً وفادح احياناً
بق التفاح	<i>Heterocordylus malinus, Reuter.</i>	التار	?	واسع جداً وفادح احياناً
دودة غر التفاح	<i>Cydia pomonella, Stgr.</i>	»	١ + ٣	واسع جداً وفادح احياناً
ذبابه غار البحر المتوسط	<i>Ceratitis capitata, L.</i>	»	١ + ٢	محدود وقليل في التفاح
ريشيت	<i>Rhyachites ruber, Faim</i>	البراعم	١	واسع وفادح احياناً
ثاقب البراعم الزهرية	<i>Anthonomus pomorum, L.</i>	الازهار	١	ضار في بعض المواقع احياناً
ايكوميت	<i>Epicometis squalides, L.</i>	»	١	واسع وفادح احياناً
توتيريس	<i>Tenuithrips inconsequens, Uz.</i>	جميع الاجزاء	١	واسع جداً وفادح احياناً
الكرمس الابيض	<i>Aspidiotus hedarar, Vallot</i>	»	٤	واسع وفادح احياناً
حشرة الزيتون القشرية	<i>Parietaria oleae, Ldgr,</i>	»	٤	محدود وفادح احياناً
قشرة سان جوزي	<i>Aspidiotus perniciosus, Comst.</i>	»	٤	بتسرع احياناً

الربيع والصيف . وهذا هو منشأ صعوبة مكافحة هذه الحشرة السريعة التكاثر المتعددة الاجيال في موسم واحد . فاذا صدف ولم يغطّ العلاج عدداً قليلاً منها مختبئاً في تجاميد الاوراق لعدم الدقة في الرش يتكاثر بعد قليل فيرغم المزارع على اعادة الكرة عليه مراراً وتكراراً لمقاومته . وقد تضع هذه الحشرات في اواخر الصيف بيوضها على اجزاء الشجرة المستترة استعداداً للشتاء .

اما المن القطني فله سيرة تختلف قليلاً عن شريكه ، فأبنا تشاهد خيوطاً شمعية قطنية بيضاء متجمعة على الاغصان يمكن التأكيد ان حشرة المن القطني البنفسجية اللون الصغيرة الحجم تتجمع بوفرة تحته منهكة في امتصاص العصارة من الانسجة الغضة . في العالم اصناف متنوعة من هذه الحشرة تختلف عاداتها وطرق تكاثرها ومعيشتها تبعاً للمناخ والموقع . فمنه الاصناف المتكاثرة دوراً بالبيوض وآخر عذرياً ، وتتمكن الحشرات المجنحة منها من الانتقال بسهولة واللجوء الى اشجار الدرزن (*Ulmus*) في الشتاء ؛ ومنها الاصناف التي تتكاثر عذرياً سنوات عديدة متتالية وهي غير مجنحة وقد تبيض في خريف احدى السنين وتنفق البيوض عن اصناف مجنحة احياناً . اما في الشرق الادنى فان الصنف الموجود قد ينتج حشرات مجنحة من بيوض مرة واحدة في السنة وذلك في الحريف ، انما ما خلا ذلك فهو من الاصناف غير المجنحة التي يمكنها التكاثر اعواماً عديدة بدون اخصاب والعيش طوال ايام حياتها على شجرة التفاح (٣) . واليك سيرة حياتها : تبدأ هذه الحشرات بالمجرة في شهري ايلول وتشرين الثاني من اعالي الشجرة الى جذورها في التربة وخاصة في المواسم الكثيرة البرودة ، ويبقى القليل منها على اعالي الاشجار مختبئاً تحت القشور وفي الشقوق والجروح غير المندملة وذلك في المواقع المنخفضة الدافئة . اما ما يهجر الى التربة فيلجأ الى الجذور حيث يقات من عصارته فينخنها جراحاً ويحدث فيها تورماً

وانتفاخات تشبه الدرن فتعطل الجذور عن القيام بعملها الطبيعي . ولا تتأذى هذه الحشرات من البرد وهي في التربة الا اذا هبطت الحرارة عن ثلاث درجات مئوية تحت الصفر بالقرب من الجذور - وهذا نادر الحدوث - وهي تفضل التربة الثقيلة على التربة الخفيفة لا يوائها (٤) . وباقتراب الربيع في شهر آذار يبدأ بعضها هجرته الموسمية الى اعالي الاشجار حيث تبدأ تقتات بالاغصان الغضة وبذلك تقضي احياناً على الاشجار الحديثة . وتتكاثر في اعالي الشجرة تكاثراً عذرياً في الربيع والصيف ويمكنها ان تلد معدل سبع حشرات في اليوم الواحد متى بلغ عمرها خمسة عشر يوماً . وعلى هذا يمكن ان يظهر اثناء الصيف لا اقل من عشرة اجيال اذا لاءمت الظروف نموها . لكن تكاثرها ينقص غالباً اثناء ايام الصيف الحارة اذا ارتفعت الحرارة اكثر من ٣٧ درجة مئوية ، وتعود الى التكاثر بسرعة في ايلول وتبدأ عندئذ هجرة بعض الصغار الى الجذور . ومن ذلك يتبين انه قد توجد الحشرة في جميع الفصول على اعالي الشجرة وعلى الجذور بنسب متفاوتة تبعاً للاحوال الجوية وهذا بما يضاعف اذاها .

دودة ثمر التفاح

(*Cydia pomonella*, ssp. *putaminana*, Stgr.)

تصيب هذه الحشرة ثمار التفاح بافدح الحسائر في جميع انحاء العالم وخاصة في المناطق الدافئة حيث يتكون منها عدة اجيال . ويمكن التعرف الى الاصابة بوجود ثقب اسود جاف في الثمرة لا يخلو احياناً من بعض نفايات الدودة ، كما توجد هذه الاصابة غالباً حول الحوض في الايام الاولى ، وباشتداد الاصابة يمكن مشاهدة هذه الثقوب في كل مكان من سطح الثمرة . واذا فتح داخلها تشاهد الانفاق الكبيرة التي حفرتها اليرقة .

تبيت هذه الحشرة في فصل الشتاء داخل شرنقة متينة في دور اليرقة ؛ وقد

الخنافس ثاقبة البراعم الزهرية

(*Anthonomus pomorum*, L.)

يندر ان تشاهد هذه الحشرة الا في موسم الازهار وهي تحدث فيها اضراراً لا يستهان بها احياناً اذ قد تثقب البراعم لتقتات بها او تضع فيها بيوضها ، وقد تتلف الاسدية والمتكات فتعطل اخصاب الازهار (الشكل رقم ٣٧) . يتراوح طولها من ٥ - ١١ مليمترآ ولونها رمادي او سنجابي وتتميز من منقارها الطويل الذي بواسطته تثقب البراعم . تقضي الشتاء في دور الحشرة الكاملة مختبئة بين قشور الاشجار والاماكن الجافة اما منفردة او مزدوجة وهي حينئذ غير ضارة . تخرج من مكمنها في اواخر الشتاء في الساعات الدافئة من النهار فتطير من مكان الى آخر وتتعلق بالفروع الصغيرة وتبدأ ثقب البراعم واكل اجزاء الازهار بعد تفتحها (٩) . وبعد الاخصاب تضع الاناث بيضة واحدة كل يوم وذلك اما في البراعم او المتكات او في اسفل التويجات . وبعد خمسة ايام تنقف البيوض وتخرج اليرقات لتقتات باجزاء الزهرة ، ويتراوح حجم اليرقة بين ٨ - ١١ مليمترآ ، وبعد قليل تصنع لها شرنقة سوداء ، وفي غضون ثمانية ايام تصبح فراشة كثيرة الحركة ، وفجأة تختفي في الصيف والحريف والشتاء الى ان تظهر في الربيع مرة اخرى .

حفار ساق التفاح

(*Zeuzera pyrina*, L.)

هناك ثلاثة أنواع خطيرة من حفار الساق تهاجم أشجار التفاح، ولا يوجد منها في الشرق الأدنى سوى هذا النوع الذي يعتبر اقلها خطراً. اينما تشاهد نفايات من النشارة الناعمة مجبولة بسائل أحمر باهت حديثة التكوين ولينة او جافة على

توجد الشرنقة في شقوق القشرة او في التربة تحت الاشجار؛ وتتحول في اواخر الشتاء الى عذراء ومن ثم الى فراشة في اوائل الربيع وغالباً بعد بدء سقوط التويجات بأسبوع واحد . ولا يمضي اكثر من خمسة ايام على الفراشة حتى تبدأ بوضع بيوضها على سطح الاوراق ، والقليل منها على الفروع والثمار . وباستطاعة الفراشة الواحدة ان تبيض معدل اربعين بيضة (٢) . ويختلف موعد ظهور الفراشات كثيراً فلا يمكن حصر مدة بيضها اذ قد يمتد ذلك اسبوعين بعد سقوط التويجات سقوطاً كاملاً. تنقف البيوض بمدة لا تتجاوز عشرة ايام وتخرج منها اليرقات القارضة التي تقتات اما بالاوراق او تسارع الى الثمار الحديثة فتدخلها من الحوض عند التويجات لان الثمار تكون حينئذ مرتفعة الى الاعلى ؛ و احياناً تدخل اليرقات بالقرب من الفجوة ، او حيث تلتقي ثمرتان ، او حيث تلمس الاوراق الثمار كأن اليرقة تبحث عن موقع ظليل . تثقب اليرقة الثمرة الى جوفها ولا تخرج منه قبل مرور ثلاثة اسابيع حين تشاهد خارجه من الثمرة ولونها ابيض يميل الى الاحمر الزاهي ورأسها اسود قائم وطولها يتراوح بين خمسة عشر وعشرين مليمترآ . وتسير هذه اليرقة حالاً الى شق في الشجرة ، او ثقب في التراب لتصنع شرنقتها . وبعد خمسة عشر يوماً قد تخرج ثمانية على شكل فراشة وتبيض بيوض الجيل الثاني . وهكذا قد تعيد سيرتها ثلاثة او اربعة اجيال متتالية في الصيف الواحد في المواقع المنخفضة ، ومن جيلين الى ثلاثة في المواقع المتوسطة الارتفاع ، وجيلين في المواقع المرتفعة جداً . وهذا الامر يجعلها اكثر الحشرات فنكاً بثمار التفاح واصعبها مقاومة (٢) .

الاعضان او الساق او على سطح الأرض بالقرب من الساق يتأكد لك ان حشرة حفار الساق موجودة داخل نفق في الساق او احد الفروع او الاعضان في موضع قريب من النفايات. اذا اخرجت الحشرة تشاهد يرقة متوسطة الحجم لونها اصفر ، جالدا منقط بالاسود ، ورأسها كبير لامع . ان ضررها ينتج من قطع الطبقة المولدة في عدة أماكن فتشل حركة الغذاء وتضعف قوة الاعضان بتجويها فتتكسر لتقل الثمار .

تظهر هذه الحشرة في دور الفراشة مرة كل سنة وذلك في شهر آب او ايلول وتبيض مئات البيوض على الشجرة ، وتنقف البيوض بعد قليل وتخرج منها اليرقات التي تختبئ تحت القشرة أو في الجروح. وفي الربيع (آذار او نيسان) تبدأ بثقب الاعضان او الفروع او الساق افقياً أولاً الى مسافة قصيرة جداً في الخشب ، ثم تتجه في حفرها مسافة سنتيمترين الى أسفل أو خلف وتغير اتجاهها وتعود فتسير الى الاعلى أو إلى الامام في مجراها الطبيعي فتقتات بعصارة الخشب ، وتعيد سيرتها في الحريف . واذا أهمل المزارع أشجاره تتمكن هذه الحشرة من نحرها واضعافها او القضاء عليها .

الحشرات القشرية

هناك أربعة أنواع هامة من الحشرات القشرية التي تعتري أشجار التفاح :

- ١ - حشرة الكرمس الأبيض (*Aspidiotus hederæ, Vallot*) ٢ - حشرة الزيتون القشرية (*Parlatoria oleæ, Lågr*) ٣ - حشرة اوسترافورمس (*Aspidiotus ostryæformis, Curtis*) وتكثر جميعها في لبنان و٤ - حشرة سان جوزي القشرية (*Aspidiotus perniciosus, Comst.*) الفتاكة التي لم يثبت وجودها رسمياً بعد الا ان البعض يعتقد انها دخلت البلاد وهي تعمل في بعض المناطق منها . تعتري هذه الحشرات القشرية جميع أجزاء الشجرة وأحياناً الثمار، وهي



الشكل رقم ٣٧ - الحفشاء ثاقبة البراعم
الزهريّة (الى اليسار) عشرة اضعاف
حجمها الطبيعي .



(الى اليمين) تظهر الحفشاء في موعد انتفاخ البراعم
الزهريّة فتقبها وتضع بيوضها داخلها .



(دلبار)

(الى اليسار) تنقف البيوض عن يرقات
تقتات من اجزاء الزهرة فتتلفها ثم تتحول
الى عذراء ثم تعيد سيرتها كحشرة فتختفي
الى ما قبل موعد الازهار في الموسم التالي .

تمتص الغذاء من الانسجة، فاذا اشنت الاصابة يضعف نمو الاشجار وتنشوء الثمار. وهذه الحشرات اربعة اطوار كاملة؛ وتميز عن سائر الحشرات بان اليرقة تستقر على جزء من الشجرة وتبدأ بافراز مادة شعية صلبة تغطي نفسها بها ويختلف لونها تبعاً للطور الذي يجتازه الحشرة، وهناك تتطور الى عذراء، وفي الدور الرابع يتغير لونها تبعاً لنوع الحشرة.

تميز حشرة سان جوزي القشرية (برنشوزا) بغطاء شمعي مستدير في وسطه نقطة أشبه بالقمع (الشكل رقم ٣٨) ولا يتجاوز حجم القشرة رأس الدبوس الصغير ولونها غالباً رمادي او رمادي ضارب الى البني. فالحشرات التي تنجو من عوادي الشتاء تبدأ بامتصاص العصارة في شهر نيسان، وبعد اخصاب الاناث تستمر في النمو وتلد (لا تبيض) بعد شهر الجليل الاول من الحشرات القشرية الصفراء التي قد يبلغ عددها اربعماية حشرة من الانثى الواحدة؛ ثم بتطورها يتغير لونها الى ابيض فرمادي. وبانتهاء الشهر الاول يمكن اخصاب الحشرات الحديثة وتبدأ بالتكاثر كسابقها. وهكذا فقد توجد اربعة اجيال احياناً في مواسم الربيع والصيف والحريف مما يجعلها اربح حشرة تعتري اشجار التفاح وثمارها. الا انه يجب ان لا يحدث التباس بينها وبين حشرة الكرمس الابيض المشابهة لها والموجودة بوفرة في البلاد. وحيث يشبه بوجود حشرة سان جوزي يجب اعلام المسؤولين والاختصاصيين لاتخاذ التدابير الوقائية المستعجلة.


الحيوانات الضارة باشجار التفاح

تسبب الحيوانات على مختلف انواعها واحجامها اضراراً باشجار التفاح لا يستهان بها وذلك في مواقع واقاليم واتربة خاصة، وهناك نوعان من هذه الحيوانات كثيراً ما يذكران خطأ مع الحشرات لانها قريباً الشبه بها ويعرف احدهما بالديدان الثعبانية والآخر بالعناكب.



(الن)

الشكل رقم ٣٨ - مختم حشرات سان جوزي القشرية تحت هذه القشور الشمعية. لاحظ ان وسط هذه القشور أشبه بشكل القمع وهذا يسهل تمييزها عن غيرها من الحشرات القشرية.



(ادريس)

الشكل رقم ٣٩ - بيوض المنكبوت الاحمر الاوروي مشكوكه كالحُرز في صفوف مترامنة تكاد تحجب جميع اجزاء القشرة. تنف هذه البيوض وتخرج منها آلاف من يرقات العناكب الضارة.

اما الديدان الشعبانية (*Heterodera radiculicola, Greef*) فتقتات من جذور الاشجار وخاصة في الاتربة الثقيلة والرديئة الانصراف وفي المناطق الدافئة مسبية انتفاخها او تعقدها او تدرتها. وهذه الديدان صغيرة لا ترى بالعين المجردة، وهي مستطيلة اشبه بالحيوط الدقيقة وتشابه الحشرات في اطوار نموها انما هي ادنى منها تركيباً . تقضي فصل الشتاء في طور البيضة في التربة ، وفي الربيع تنقف البيوض وتخرج منها الديدان وتدخل الجذور فتقتات من عصارتها وكثيراً ما تعطلها. وبعد اخصاب الاناث بقليل تبدأ بوضع البيوض بمعدل عشر في اليوم الواحد ، وتنقف هذه البيوض بانقضاء بضعة اسابيع ؛ وهكذا يمكن انتاج اجيال متعددة في الصيف الواحد وكثيراً ما يتعدى عددها اثني عشر جيلاً في المواقع المنخفضة الدافئة .

اما العناكب فمتعددة، والنوع الضار باشجار التفاح يعرف باسم العنكبوت الاحمر الاوروبي (*Paratetranychus pilosus, Can & Fanz*) وهو يقضي الشتاء في دور البيضة على سطح الاغصان الاسفل وفي الشقوق او ثنيات الدوابر الشمرية وفي المواقع الحشنة على اللحاء . وبيوضه صغيرة مستديرة حمراء اللون تبدو كالحرز الصغير مشكوة في صفوف متراصة (الشكل رقم ٣٩) . يبدأ نقف البيوض عند بدء نفتح البراعم الزهرية ويكتمل بعد سقوط آخر التويجات . ترحف بعدئذ العناكب الصغيرة الى الاوراق فتثقب بشرتها السفلى وتمتص العصارة . ولا يمر اكثر من اسبوعين حتى تبدأ العناكب الجديدة وضع بيوض الجيل الثاني وتستمر هكذا طوال ١٥ يوماً واطول بيوض يوماً . ويشجع المناخ الدافئ الجاف تكاثرها حتى انه يمكن مشاهدتها في اول حزيران في جميع الاطوار في موقع واحد ؛ وقد يظهر لها ستة اجيال في العام الواحد ولذلك تصبح خطرة جداً اذا لم تتلف بيوضها كلياً وهي راقدة في الشتاء . وكثيراً ما

تتضرر اشجار التفاح وثمارها من العنكبوت البني (*Bryobia praetiosa, Koch*) . ومن الحيوانات الضارة التي تفتك بسوق وجذور اشجار التفاح في المواقع النائية فأر الحقل والارانب البرية والحلند .

يلاحظ عدم ذكر شيء عن التدابير الوقائية وذلك لانه خصص فصل لبحثها لان منها تدابير افرادية ومنها جماعية . ويكفي ما ذكر عن كيفية نمو الحشرات وطرق تطورها وتكاثرها ليدرك القارئ صعوبة مقاومتها وتقدير ضرورة التدقيق في تطبيق اساليب الوقاية وخاصة في اوقات ظهور اليرقات ورشها بالمحاليل والنسب المفروضة بدقة متناهية .

الجدول الحادي عشر - أسماء أهم أمراض اشجار التفاح الموجودة في لبنان

انتشار المرض	جزء الشجرة المصاب	نوع المرض	الاسم اللاتيني	الاسم العربي
واسع جداً	الجدور	فطري	<i>Rosellinia necatrix, Berl.</i>	عفن الجدور (الخالوط)
واسع	الساق والاغصان	»	<i>Nectria galligena, Bres.</i>	مرض القرحة
خفيف	»	»	<i>Phomopsis mali, Roberts</i>	فوموبسيس
خفيف	الاوراق	»	<i>Sphaeropsis malorum, Peck</i>	التبقع الاسمر
خفيف	»	»	<i>Glomarella cingulata, Sp. & von S.</i>	مرض العفن الفطري
واسع جداً في البراد	الثمار	»	<i>Penicillium expansum, Link.</i>	العفن الأزرق
واسع جداً	جميع الأجزاء	»	<i>Podosphaera leucotricha, Salm.</i>	رمد التفاح
»	»	»	<i>Phyllosticta solitaria, E. E.</i>	الطننة الفطرية
متوسط	»	»	<i>Venturia inequalis, Wint.</i>	مرض التبقع
خفيف	»	»	<i>Gymnosporangium libocedri, Dict</i>	مرض الصدا
متوسط	»	بكتيري	<i>Bacterium tumefaciens, Dg.</i>	التدرن التاجي
خفيف	»	»	<i>Bacillus amylovorus, Trev.</i>	اللقمة النارية

الفصل السابع والعشرون

أمراض اشجار التفاح وثمارها

لا يبدو عدد الامراض التي تعترى اشجار التفاح خمسة وعشرين مرضاً جلها موجود في لبنان وقد ذكرت أسماء أهمها في الجدول الحادي عشر. والاشجار المريضة يسهل تمييزها احياناً اذ يتغير لونها اذا اشتد عليها المرض فتظهر اجزاؤها بالوان مختلفة تبعاً لنوع المرض فهي اما بيضاء او رمادية او برتقالية او حمراء او سوداء . كما يميز المرض ايضاً من ثقب الاوراق او ذبولها او جفافها ، او تشقق القشرة على الساق او الاغصان او خروج العصارة منها او من تعفن الثمار او تهرؤها او جفافها .

وسبب الامراض نوعان من النباتات الدقيقة البسيطة التركيب التي لا يمكنها تجهيز غذائها بواسطة الاوراق الخضراء بل تعتمد على اشجار للحصول على قوتها اذ ليس لها سوق او اوراق او اغصان او جذور بالمعنى المألوف . يُعرف النوع الاول بالامراض الطفيلية (بكتيريا) المسببة عن نباتات دقيقة لا تُرى بالعين المجردة مكونة من خلية واحدة فقط ولا تختلف اشكالها والوانها وطرق تكاثرها كثيراً عن الامراض التي تعترى الانسان . وهي تدخل الاشجار من الجروح او ثغرات الأوراق او ثقب القشرة وتتكاثر بالانقسام البسيط فتصبح الخلية خليتين ، فاذا كانت ظروف النمو ملائمة فلا يمكن متابعة سرعة تكاثرها وانتشارها؛ وهي

تنتقل من مكان الى آخر بواسطة الآلات الموبوءة وأجزاء الاشجار المصابة او الطيور او الانسان .

ويعرف النوع الثاني بالامراض الفطرية ، وهي تختلف عن النوع الاول بتركيبها ونموها وطرق تكاثرها ؛ فاكثرها يشبه في تركيبه الجيوب الدقيقة المتشعبة ، وله دوران من الحياة يعرف الاول بالدور الحضري الذي ينمو فيه بارسال خيوطه المعروفة بالمايسيليا (Mycelia) على سطح الجزء المصاب من الشجرة الى داخله لتقتات من عصارته ؛ وتتكون في الدور الثاني الاجزاء التناسلية فتنج البذور غير الملقحة (Spores) التي تتكاثر بواسطتها . وهذا النوع هو اكثر الامراض عدداً واشدها فتكاً باشجار التفاح وثمارها .

رمد التفاح (البياض الدقيقي)

(*Podospaera leucotricha*, Salm)

ينتشر هذا المرض في اكثر اقاليم العالم حيث تُغرس اشجار التفاح ، وقلّ ان يخلو منه اقليم . وتشتد الاصابة به في الاقاليم او المواسم الكثيرة الرطوبة وخاصة حيث تعتدل الحرارة ويتخلل الجو ضباب كثيف تتلوه انقشاعات متقطعة . يصيب هذا المرض الاوراق والفروع الحديثة والازهار وحياناً الثمار . تظهر اصابة الاوراق اولاً على شكل بقع بيضاء او رمادية صغيرة ، وبصفة خاصة على السطح السفلي . وما يلبث ان يكبر حجم هذه البقع الى ان تتصل بعضها ببعض وتكسو جميع الورقة التي سرعان ما تغشى «بالبذور» البيضاء فتطوى . وكثيراً ما يعترى المرض الفروع الحديثة التي يتغير لونها في اواسط الصيف من الابيض الى البني المغشى بالبذور السوداء (A) فيوقف نموها ، او يمنع تكوين البزاعم الزهرية عليها ، او يمتتها . وتبدأ الاصابة على الازهار من بذور المرض التي تبيت في جوار البزاعم الراقدة وتنطلق عند الازهار فينتشر

المرض ويسبب تعطيل الازهار او يمنع اخصابها .

ان هذا المرض خارجي ومفعوله محدود بالخلايا السطحية حيث يرسل خيوطه المزودة باعضاء خاصة لامتصاص العصارة منها . ومع انه يصيب جميع اصناف التفاح في الاقاليم والمواقع الرطبة الا ان الاصناف كرافنشتين ، واسوبس ، وروم بيوتي ، وجوناثان ، واستيمن ، ويلونيوتن تتأثر به اكثر من غيرها . اما الصنفان رد استراخان وواينساب فيبديان مناعة كبيرة ضده .

الطخة الفطرية

(*Phyllosticta solitaria*, E. & E.)

يعتبر هذا المرض الفطري خطراً في الاقاليم الدافئة حيث ترتفع حرارة الجو ورطوبته . وهو يصيب الاوراق والفروع الحديثة والثمار . ويميز من شكل نموه الذي هو اشبه بالنجمة اذ ان الجزء الحضري منه ينمو من نقطة رئيسية متشعباً في جميع الاتجاهات مكوناً نجمة سوداء بارزة لارتفاع البذور السوداء عن سطح الموضع المصاب .

يبعث هذا الفطر في فصل الشتاء تحت القشور او الجروح او في الثمار المصابة في الموسم السابق والتي أهمل التقاطها ، ويبدأ نموه مبكراً في الربيع فيكون البذور في ميعاد سقوط التويجات . وهذا هو الدور الخطر اذ ان هذه البذور تنبت وتتكاثر فنشوه الاوراق والثمار وتلفها . وهو واسع الانتشار في الشرق الادنى وخاصة في لبنان .

مرض التبقع

(*Venturia inequalis*, Wint.)

ان هذا المرض واسع الانتشار جداً في الاقاليم الرطبة حيث تسقط الامطار في فصلي الربيع والصيف وهو يسبب حينئذ اضراراً فادحة . ويختلف انتشاره في لبنان تبعاً للمواسم والاحوال الجوية ؛ ومع انه لا يكون خطراً ، فقد

ينتشر بكثرة في المواسم التي تتأخر فيها الامطار في فصل الربيع (٧) .
يصيب هذا المرض الاوراق والثمار والازهار والفروع الحديثة التكوين
(الشكل رقم ٤٠) . ويتميز بظهوره على الاوراق بقعاً مستديرة بنية او رمادية
اللون في اول الامر ثم تتغير هذه البقع تدريجياً الى لون فاتم جداً . وقد ينتفخ
الجزء المصاب ويجف ويسقط تاركاً على الاوراق فراغات مستديرة ، وباشتداده
تسقط الاوراق وتنخفض مقدرة الاشجار على انتاج الغذاء فتضعف . ولا يختلف
شكل المرض على الثمار سوى انه يسهل تمييزه لانه يكون سطحاً مستديراً ناعماً
مخملياً ؛ واذا اشتدت الاصابة تتشقق القشرة ويصبح لونها أسود يحيط به طوق
أبيض هو أطراف القشرة المصابة . ان هذا المرض لا يسبب عفناً او خمومة
في الثمار . أما اذا أصاب الازهار أو أعناق الثمار غير المخصبة فيمنع اخصابها أو
يسبب سقوطها كما انه يقصر مدة تبريد الثمار البالغة لانه يسبب فقد الماء منها
فسرعان ما تذبل .

ينمو هذا المرض على مرحلتين ، الاولى في الصيف ويكون فيها طفيلياً اي
انه يقات من الاجزاء الحية النامية ، وفي الخريف يسقط مع الاوراق ويدخل
المرحلة الثانية فيقتات من الاجزاء الميتة . وهو ذو مناعة كبيرة ضد الصقيع
ويمكنه بدء نموه حتى اذا تدنت الحرارة الى درجة واحدة مئوية فوق الصفر .
ينتشر بذوره في الربيع قبل الازهار بقليل ، فاذا كانت الاحوال ملائمة لانباتها
نصاب الازهار وأعناقها بأفدح الحسائر وقد تسقط ؛ واذا استمر هطول الامطار
المتأخرة يستمر انتشار المرض ، والا فانه يتوقف الى حين ارتفاع الرطوبة
مرة اخرى .



(دلبار)

الشكل رقم ٤٠ - - مرض التبقع ضار في
المواقع الكثيرة الرطوبة صيفاً . يصيب الثمار
(الى اليمين اعلاه) . فيشقق قشرتها او يشوهها
فتتلف ؛ ويمتري الاوراق (الى اليسار اعلاه)
فيعطلها عن العمل ؛ او يشقق قشرة الفروع
الثمارية الغضة ويتلف براعمها (الى اليسار) فيحول
دون انتاج الثمار .



عفن الجذور (الخالوط)

(*Rosellinia necatrix, Berl.*)

ينتشر هذا المرض على جذور الأشجار الحديثة وخاصة المغروسة عميقاً في التربة الثقيلة الرطبة او حيث تكثر مياه الري الاسبوعي . وأكثر ما يلفت الانتباه اليه في أواخر الشتاء حين تبدأ الأشجار بالنمو فان كثيراً منها يدفع براعمه فتنتفح ثم تذبل فجأة وتجف الاوراق وتسقط . فاذا ازيل التراب بتؤدة عن الساق والجذور ظهرت انها مصابة بعفن أبيض . واذا ازيل اللحاء عن الجذور بدت بنية قائمة أو باهتة ؛ وان للاغصان المتصلة بتلك الجذور للحصول على غذائها لرائحة خميرة تدل على وجود المرض . يدخل هذا المرض عن طريق الجروح وتشقق اللحاء ويتكاثر حيث تكون الرطوبة متواصلة ومرتفعة والتربة رديئة التهوية ودافئة والشتاء قليل البرودة (١٥) .

العفن الازرق

(*Penicillium expansum, Link*)

يكاد هذا النوع من الفطر ينتشر في كل مكان فهو ينتقل بواسطة الهواء ويمكن العثور عليه في البيوت والمخازن والبساتين والصناديق والسيارات والبرادات . وهو يسبب خسارة ٨٠٪ من ثمار التفاح التي تتلف في البراد ويعتبر فيه المرض الخطر الوحيد (الشكل رقم ٤١) .

يمكن تمييزه من الرائحة العفنة المنبعثة من الثمار المصابة التي يتغير لون قشرتها في موضع الاصابة فيصبح بنيّاً باهتاً وطريئاً جداً في بادىء الامر ، وباستفحال الاصابة تنمو البذور بكثرة وتغطي الموضع المصاب وتضفي عليه لوناً أزرق ضارباً الى الخضرة . لا يمكن ان ينتشر هذا المرض او ينمو على الثمار السليمة الخالية من الجروح والحدوش والرضوض والثقوب التي خلقتها الحشرات او

الشقوق المسببة عن الامراض الاخرى لانه لا يستطيع ثقب القشرة السليمة . أما اذا تمكن من الدخول فيرسل خيوطه في جميع الاتجاهات ليتغذى بعصارة الثمار حتى يأتي عليها فتتلف . وبما يساعد على انتشاره ارتفاع الرطوبة والحرارة في غرف التبريد . للمحافظة على الثمار تجنب خدشها أو جرحها وادخلها بسرعة الى البراد واحفظها فيه بدرجة ٣١ ف .



(ادريس)

الشكل رقم ٤١ - العفن الازرق هو المرض الفطري الوحيد الهام في البراد لكنه يسبب أحياناً تلف ٨٠٪ من ثمار التفاح المصابة ويرغم اصحابها على بيعها بأبخس الاسعار .

الامراض الطفيلية

هناك مرضان هامان تسببهما الكائنات الدقيقة الطفيلية (البكتريا) يعرف أحدهما باسم اللفحة النارية (*Bacillus amylovorus, Trev.*) ويصيب الاغصان والفروع الحديثة حتى الازهار والثمار أحياناً . وجميع الاجزاء المصابة تجف ويسود لونها (الشكل رقم ٤٣) . وهذا المرض قليل الانتشار على أشجار التفاح في لبنان . ويعرف المرض الثاني باسم التدرن التاجي (*Bacterium tumefaciens, Dg.*) وهو اكثر من الاول انتشاراً في الشرق الادنى ، ويتميز بظهور درنات متفاوتة الاحجام على الساق تحت التراب او قرب مجمع الجذور وخاصة عند التحام الطعام بالاصل (الشكل رقم ٤٢) . يدخل المرض الى هذه الاجزاء من الجروح ولذلك لا يرغب التطعيم بالقلم . وقد يسبب هذا المرض موت الاشجار فجأة بعد انتقالها من المشتل الى البستان بثلاثة اعوام او قد يقصر حجمها او يضعفها .

الفصل الثامن والعشرون

اساليب الوقاية

يُستدل من الشرح السابق ان هناك اربعة امور هامة لا يمكن المزارع الاغضاء عنها اذا اراد ان يحفظ اشجاره وقماره سليمة من فتك الآفات الزراعية وهي : اولاً - ان انواع الامراض والحشرات التي تُعتري اشجار التفاح عديدة وبعضها يظهر في اكثر من جيل واحد في السنة مما يجعلها دائمة الوجود في البستان ، مستمرة الخطر في جميع فصول السنة . ثانياً - يحتم هذا الامر على المزارع ان يعمل ما بوسعه على منع ظهورها او تكاثرها وذلك لايقاف انتشارها الواسع الذي يسبب اضراراً جسيمة وتكلف مكافحته نفقات باهظة ولذلك عليه ان يعمل بروح المثل القائل « درهم وقاية خير من قنطار علاج » . ثالثاً - يترتب عليه ان ينظم عمله فيبادر الى وقاية اشجاره قبل ظهور الحشرة او المرض بالبحث عن موعد بدء تكاثرها في اوائل فصل الربيع الذي يعتبر عند كل مزارع فطن الموعده الاول الذي منه تبدأ الآفات أعمالها الضارة . رابعاً - يجب ان يتوخى الدقة في عمله بان يرش في المواعيد المعينة وبالمواد الصحيحة والنسب المطلوبة ويعمل على تغطية جميع اجزاء الشجرة بالسائل مستخدماً كذلك ضغطاً قوياً . ان جميع هذه الامور توجي الى المزارع وجوب تنظيم منهاج للرش الجماعي بين فيه الاوقات بالدقة ونوع المواد ونسبها ونوع الآفات الواجب




(باتشر)

الشكل رقم ٤٣ - مرض الفحة النارية (الى اليمين) يحرق قشرة الاغصان فيمطها عن العمل . يجب ازالة الفروع المصابة به في موعد التقليم الشتوي .



(دلبار)

الشكل رقم ٤٢ - منظر مرض التدون التاجي (الى اليسار) بعد استفحاله عند موضع التحام ساق الشجرة بالاصل بالقرب من سطح التراب . كثيراً ما يتسبب دخوله نتيجة للتطعيم الخاطيء (خاصة بالملزولف) .



(هيلد)

الشكل رقم ٤٤ - مرض الفرحة (الى اليسار) يعمري الاغصان والسوق ويبدب جفافها كما يتلف البراعم . تحسن ازالة جميع الاجزاء المصابة في موعد التقليم الشتوي .

مقاومتها، وعليه ان ينفذ هذا المنهاج بكل دقة في جميع فصول السنة . واذ لا يمكن ان يشمل هذا المنهاج الوقاية من جميع الآفات فسندكر بعض اساليب وقائية افرادية يجب اتخاذها للمحافظة على سلامة الاشجار من الآفات التي لا يشملها هذا المنهاج .

هناك خمس طرق تختلف فعاليتها في الوقاية من فتك الآفات :

أولاً - استخدام اصناف التفاح التي تظهر مناعة ضد بعض الآفات : لم تنجح هذه الطريقة حتى الآن لتعدد الآفات ولعدم وجود اصناف لها صفة المناعة (راجع الفصل الثالث والعشرين عن مناعة الصنف نورثون اسباني ضد المن القطني) .

ثانياً - استخدام الاعداء الطبيعية : لجأ بعض العلماء الى مهاجمة بعض الحشرات الضارة بمحشرات تفتكها ونجحوا في بعض الاقاليم بآبادة تلك الحشرات او تخفيف وطأتها . فالحشرة المعروفة باسم افالينوس مالي (*Aphelinus mali*) تهاجم مثلاً حشرة المن القطني اذ تضع بيوضها داخلها فتتقف وتخرج منها يرقات تقتات بحشرة المن فتبيدها . ولكن هذا العدو الطبيعي لا يقوى على البرد ويظهر غالباً متأخراً في فصل الربيع . كما ان حشرة خنفساء سيدي (*Chilocorus bivulnerus*) الصغيرة السوداء ذات النقطتين الحمراء على ظهرها تهاجم حشرة سان جوزي القشرية وتفتكها ، ولكن الاحوال الجوية لا تساعد على التكاثر بوفرة ؛ وقد تبين ايضاً ان عدداً من الامراض الفطرية تأتي على هذه الحشرة . ان جميع هذه الاحتياطات لا تكفي للقضاء على الحشرات والامراض ولذلك لا بد من استخدام المواد الكيماوية لآبادتها .

ثالثاً - النظافة : كثيراً ما تساعد النظافة في البستان على خفض الاضرار الناجمة عن فتك الآفات وخاصة الانواع التي لا يمكن مكافحتها بالاساليب

العادية كالأضرار الطفيلية . يمكن مثلاً تجنب تفاقم اضرار مرض التدرن التاجي بمنع انتشاره وذلك بعدم اللجوء الى التطعيم بالقلم وتطهير البراعم بمحلول كلورور الزئبق بنسبة واحد بالالف او باي مطهر تجاري آخر قبل تطعيم الاصول بالبرعم (الرقعة) . وكذلك تغطس جذور المطاعم بمحلول مطهر يخفف قبل غرسها ، واذا شوهدت التدرنات يجب ازالتها وتطهير موضعها اذا كانت الاصابة بسيطة ، وابداء المطعوم اذا كانت الاصابة شديدة . وفي موعد التقليم يجب ازالة جميع الدواب والفروع والاغصان المصابة بمرض اللقحة النارية وجمعها وحرقها حالاً وتنظيف القشرة المصابة وتطهير جميع الجروح المسببة عن هذا التقليم بالمحلول التالي : ضع ثماني ملاعق كبيرة من بايكلورور الزئبق (او كلورور الزنك) في وعاء بلوري يحتوي على نصف لتر ماء ساخن واطفئ اليه ليترأ ونصف اللتر من الكلسرين التجاري وقليلاً من صبغة التلوين الحمراء (كاردينال رد) . احفظ هذا المحلول في وعاء مقفل وعند الحاجة اليه اطل الجروح به بالفرشاة (انتبه لان هذا المحلول سم قاتل) .

يجب ازالة القشرة المتشققة الجافة في اواخر الشتاء وتطهير موضعها . واحذر من جرح الاشجار او خدشها اثناء الحرث لان ذلك يكون ملجأ ملائماً لاختباء الحشرات ودخول الامراض . طهر جميع الشقوق والجروح حالاً وعبئها بمادة لزجة لمنع دخول الآفات اليها . استخدم اللقائف الواقية المطلوبة لمنع الحشرات من تسلق ساق الاشجار في اواخر الشتاء كالمقطن القطني وپرقات دودة ثمر التفاح كما تبين في الفصل العاشر .

احرث التربة حرثاً عميقاً في الحريف وسطحياً في الربيع لتساعد على اتلاف البيوض واليرقات . كما يجب جمع الثمار المصابة حال سقوطها ودفنها عميقاً (٦٠ سم) في موقع خاص في التربة بعد اضافة الكلس الكاوي اليها . طهر

جميع الآلات والادوات والاوزية الزراعية المستخدمة في حرث الارض وتقليم الاشجار وقطف الثمار وتعبئتها . لا تنسَ ان من واجبات المزارع ان يتعاون مع جاره على مكافحة الآفات لان ذلك يفيد اذ ان جهوده في مقاومتها كثيراً ما تفشل اذا بقي بستان جاره مهملًا واشجاره موبوءة .

رابعاً - الوقاية الافراوية : تهدف الوقاية الافراوية الى اباداة كل حشرة بمفردها لعدم امكان القضاء عليها ضمن منهاج الرش الجماعي . ومن هذه الحشرات حفار الساق والديدان الشعبانية والمن القطني على الجذور وفأر الحقل ومرض عفن الجذور (الخالوط) .

حفار الساق : افضل طريقة لوقاية الساق والفروع من اضراره هي السهر لمنع دخوله الى الحشب ، فيجب التفتيش عنه في اوائل الربيع عندما تحاول يرقاته الدخول الى الحشب فتشاهد حينئذ في مواقع النمو الجديدة . وكذلك يجب التفتيش عن اليرقات في اواخر الربيع مرة ثانية لعل بعضها افلتت في المرة الاولى . فاذا دخلت الحشب فانجم عمل يمكن اجراؤه هو ادخال سلك فولاذي دقيق داخل الثقب لقتلها والتقاطها . وبعد التأكد من قتلها يجب تطهير النفق بحقنه بمادة محلول الكلس والكبريت المركزة مخففة بنسبة عشرة بالمئة ثم يسد باب الثقب بمادة لزجة من الاسفلت الخاص . كما يجب التفتيش عن اليرقات في الحريف بعد سقوط الاوراق لازالة الفروع الصغيرة المصابة وقتل ما قد ينجو من اليرقات في المحاولتين السابقتين . كما يفضل طلي ساق الشجرة في الربيع بمعجون الكلس المائع مضافاً اليه قليل من الملح وزرنيخات الرصاص وكبريتات النحاس .

الديدان الشعبانية : لا يمكن دره اضرارها بسهولة لعدم وجود الدواء الناجع ولصعوبة اضافة المواد الواقية الى التربة ، وافضل ما يمكن عمله اتخاذ

الاجراءات الوقائية بأن يخلط مع السماد العضوي الذي يضاف في الحريف قليل من مادة الـ د. د. ت. او اي مادة اشعاعية اخرى قبل تحميره و اضافته الى التربة . كما يجب منع تجول الحيوانات بين الاشجار دون ان تدوس ارجلها محلولاً مطهراً قبل دخولها . ويمكن ايضاً اضافة المواد الحاملة لاشعاع الكاما (Gamma) للتربة في ثقوب خاصة في التربة الثقيلة الموبوءة . لا تغرس اشجاراً تحمل جذورها هذه الديدان وهي في المشتل سواء كانت بشكل عقد او درن .

دودة ثمر التفاح : يمكن استعمال لفائف خاصة تربط على الفروع والاعضان فتدخلها اليرقات لنسج شرانقها فتطلق هذه اللفائف غازات سامة تقضي على اليرقات وتعرف باسم لفائف دودة ثمر التفاح (طبعاً بالاضافة الى استخدام المواد الكيماوية الواقية) .

المن القطني على الجذور : تساعد اللفائف اللزجة الدبقية الموجودة على الساق على منع هبوط الارتال غير المبنحة الى الجذور في الحريف وتسلقها الى الاعضان في الربيع ، ولذلك ينصح ان لا تحمل بل يجب اضافة المادة الدبقية اليها من حين الى آخر . كما يمكن اباداة هذه الحشرة بمخنتها في التربة وذلك عن طريق فتح حفرة حول الساق في الحريف والتربة جافة ودافئة بعمق خمسة وعشرين سنتيمتراً وعرض عشرة سنتيمترات تنثر فيها بلورات مادة برادايكلور بنزين بمعدل ١٥ غراماً للشجرة التي لا يزيد قطر ساقها على ثمانية سم ومقدار ٣٠ غراماً للاشجار الكبيرة وتطمر الحفرة بالتراب الناعم وترص جيداً . ويمكن ايضاً استخدام مادة بنزين هكسا كلورايد الاشعاعية التي لا رائحة لها بدلاً من هذا الغاز بالطريقة نفسها فتفتك بالحشرات عند تلامسها بها في طريقها من الجذور الى الاعضان في الربيع .

فأر الحقل والارانب البرية والخلد : يمكن وقاية الاشجار من شر هذه

الحيوانات بالتسميم وذلك بوضع القمح المسمم الخاص او اية مادة مسمومة اخرى بالقرب من الاشجار في الخريف بمعدل ٢٥ غراماً لكل شجرة على ان تنثر حول الساق . اما مكافحة الخلد فتكون بوضع هذه السموم في مجاريه تحت الارض . كما يمكن وضع سلك متشابك ذي ثقب صغيرة (ستة مليمترات مربعة) حول ساق الشجرة بارتفاع نصف متر على ان يُدفن طرفه السفلي لا اقل من خمسة سنتيمترات في التراب ؛ وبما ان نفقات هذا العمل باهظة فلا يلجأ اليه الا حيث يشتد الخطر على الاشجار في المواقع الباردة جداً او عندما يغطي الثلج الارض مدة طويلة من الزمن فتلجأ هذه الحيوانات للتغذية بلحاء الاشجار .

عفن الجذور او « الخالوط » : تصعب مقاومة هذا المرض ولذلك يجب ان يتحاشى المزارع القيام بالاعمال التي تشجع على انتشاره فلا يسبب جرح الجذور والساق تحت التراب بالآلات الحادة ، ولا يفرس الاشجار على عمق كبير في التربة ، ولا يسقي الاشجار بحيث تبقى التربة رطبة مدة طويلة دون تهوية ؛ ويحسن الكشف على مجامع الجذور في الخريف ، واذا بدا المرض للعيان تطهر التربة بمحلول الكلس والكبريت المركز بنسبة عشرة بالمئة . كما يجب العمل على تصريف الماء من التربة الثقيلة في الشتاء بفتح اخاديد خاصة لذلك وازدادة مقدار ٢٠٠ كيلوغرام من الكلس الكاوي لكل دونم لانه يساعد على تفتت التربة ويفتحها للتهوية . واذا ظهر المرض في اوائل موسم النمو فالأفضل تقليم الاشجار تقليماً جائراً وفتح التربة حول مجامع الجذور والساق وازدادة قليل من محلول الكلس والكبريت المركز بمعدل عشرة بالمئة .

خامساً - الوقاية الجماعية باستخدام المواد الكيماوية : لولا المواد الكيماوية لما امكن وقاية الاشجار من الآفات بواسطة مناهج الرش الجماعي . فمن هذه المواد ما يسبب التسمم الداخلي فيقتل الحشرات القارضة كدودة ثمر التفاح عن طريق تسمم الجهاز الهضمي ؛ وافضل هذه السموم زرنبيخات الرصاص . ومنها ما يقتل الحشرات الماصة كالمن والحشرات القشرية اذ تحرق المادة الكاوية جلد الحشرة او بيوضها او غطاءها القشري فتبيدها ، وافضل هذه المواد كبريتات النيكوتين ومحلول الكلس والكبريت المركز والزيت القطرانية والمعدنية ، وظهرت مؤخراً في الاسواق التجارية مواد فتاكة تقتل باللمس عن طريق اطلاق اشعة كاما (Gamma Rays) التي تشل الجهاز العصبي .

اما الامراض النباتية فيمكن القضاء عليها او حصرها عن طريق رشها بالمواد الكاوية واشهرها محلول (او مسحوق) الكلس والكبريت المركز والكبريت الميكروني والغروي ومحلول كبريتات النحاس . والجدير بالذكر انه في جميع الحالات يجب ان توجد المادة الكاوية على سطح اجزاء الشجرة قبل بدء انتشار المرض لضمان نجاح مفعولها لانه فلما تنجح مكافحة المرض بعد اتساع نطاقه .

ولاجل الحصول على نتائج مرضية وعلى زيادة فعالية المواد الكيماوية يجب اضافة مواد ناشرة - لاصقة (Spreader - Sticker) الى بعض السموم المستعملة لان انتشار السم بذرات جد دقيقة وكثيفة كالرذاذ لتغطية اكبر مساحة بمكنة امر هام جداً ؛ كما ان من الضرورة التصاق تلك الذرات في الموضع الذي تقع عليه لمدة طويلة . ومن افضل هذه المواد واقلها ضرراً للاشجار مادة كلسين الكلس (Calcium Caseinate) ، ودقيق القمح الابيض الناعم (زيرو) ، ومن هذه المواد في الاسواق مستحضرات تجارية كثيرة تعرف باسماء متنوعة .

وبما ان مناهج الرش الجماعي يوصي باستعمال اكثر من مادة واحدة في بعض ادوار الرش يجب على المزارع ان ينتبه الى تجانس المواد المراد مزجها الى مطابقتها اذ قد (ا) ينتج عن المزج تكوين مواد كاوية او تحريم مواد حارقة تضر باوراق الاشجار وثمارها ، او (ب) قد تتدنى فعالية المواد المزوجة الى

٢٨٨

الفصل التاسع والعشرون

المواد الكيماوية المستعملة في وقاية أشجار التفاح وثمارها

مسحوق زرنبيخات الرصاص - يباع هذا المسحوق في الاسواق التجارية على شكل مسحوق ناعم وهو غالباً ابيض ويركب من عنصري الزرنبيخ والرصاص السامين الخطرين . فمنه المسحوق ذو التفاعل الحامضي ويحتوي على ٣١-٣٣٪ ، والمسحوق ذو التفاعل القاعدي ويحتوي على ٢٢-٢٤٪ ، والمسحوق الوسطي ويحتوي على ٣١٪ من اوكسيد الزرنبيخ . فالمسحوق الحامضي اقوى واسرع فعالية وهو اكثر المساحيق استعمالاً ولذلك درج المسؤولون على تقدير الكميات الواجب استعمالها بالنسبة الى تركيزه . وبما انه يحرق الاوراق ويشوه الثمار وجب اضافة مقدار من الكلس الكاوي يساوي وزن ما اضيف منه . واذا حصل المزارع على المادة القاعدية يجب ان يضيف مقدار ٣٠٪ الى المعدل المطلوب ؛ وينصح في جميع الحالات بالحصول على تعليمات الشركة المختصة . واهم صفات هذا المركب صغر حجم ذراته لانه لا يذوب في الماء بل هو قابل للسوب . ولكي يتأكد لك صغر حجم الذرات احضر عدداً من الاقداح الزجاجية الشفافة وضع في كل منها مقدار ملعقة صغيرة من النوع المراد فحصه واضف اليها مقداراً متساوياً من الماء وهزها بعنف ولاحظ ما يجري ؛ فالانواع الفضلى هي التي تبقى سائجة في الماء زمناً يزيد على ما تتحمل المواد الاخرى ، واما الراسبة بسرعة

درجة قصوى فيبطل مفعولها . فلا تستعمل الصابون مع زرنبيخات الرصاص ذات التفاعل الحامضي لانه ينتج عن ذلك تحرير الزرنبيخ من مادة زرنبيخات الرصاص مما يسبب احتراق الاوراق بعد الرش مباشرة ؛ ويجب تفادي مزج كبريتات النحاس او مشتقاته او المواد النحاسية مع زرنبيخات الرصاص ، كما يمنع مزجها مع محلول الكلس والكبريت او الكبريت الميكروني . ولا يجوز مزج محلول الكلس والكبريت مع الزيوت القطرانية والمعدنية الشتوية والصفية (٦) .

فهي خشنة . تستعمل مادة زرنبيخات الرصاص بمعدل نصف بالمائة اذا كان عيارها ٣٢ ٪ او ما يعادل ١٠٠ غرام لكل عشرين ليتر ماء ، وتعديل هذه النسبة تبعاً للنسبة المثوية التي تشير اليها الشركة المختصة . وهذه المادة هي افضل سم عُرف حتى الآن ضد الحشرات القارضة . ويمكن استعمال مادة فلو سليكات الباريوم في التغطية الاخيرة لانها غير سامة للانسان .

محلول كبريتات النيكوتين المركز : يباع هذا المركب في الاسواق التجارية تحت اسماء متعددة وتركيز مختلف ، وافضله ما كان عياره ٤٠ ٪ ؛ وهو يستخرج من نفايات التبغ ويصنع باضافة المواد الكبريتية اليه . وهو من افضل المواد لابادة الحشرات الماصة ، وتختلف فعاليته ليس بالنسبة لتركيزه فحسب بل بالنسبة للاحوال الجوية ونوع الحشرة . تزداد فعاليته بوجود المواد القلوية في محلول الرش اذ ترتفع نسبة تبخره وقدرته على التسميم . يستعمل بنسبة اثنين في الالف او ثنائي ملاعق شاي كبيرة لكل عشرين ليترأ من الماء اذا كان عياره ٤٠ ٪ .

محلول الكلس والكبريت المركز : يباع هذا المحلول في الاسواق التجارية باسماء مختلفة ، ويضع بطبخ الكلس والكبريت ، ويفضل شراؤه جاهزاً لعدم استطاعة المزارع تقدير نسبة تركيزه ولصعوبة صنعه . لونه عنبري او خيري ، وهو مركز تجارياً بدرجة ٣٢ بومي (Baumé) . يعتبر هذا المحلول افضل مادة للوقاية من الامراض الفطرية ومن افضل المواد لمقاومة الحشرات القشرية . احذر اثناء اعداد محلول الرش ان تضيف اليه الصابون او الزيوت القطرانية او المعدنية . واذا مزج مع زرنبيخات الرصاص يجب ان يضاف اليه مقدار من الكلس يساوي وزن زرنبيخات الرصاص الذي يضاف اخيراً . يُستعمل غالباً في فصل الشتاء بنسبة تتراوح بين ٣ - ٥ ٪ اما بدلاً عن الزيوت المعدنية او بعدها ،

ويمكن استعماله صيفاً في الاحوال الاضطرابية فقط بنسبة ١ ٪ (بالنسبة للشرق الادنى) .

مسحوق الكبريت الميكروني (الممكن ابتلاله) : هو الكبريت العادي نفسه لكن ذراته اصغر حجماً ومن ميزاته انه قابل للاختلاط بالماء بسهولة ، وهو مطهر ومبيد للامراض الفطرية ، ولكنه غير ضار بالاوراق او الثمار ولذلك يمكن استعماله في فصل الصيف حيث لا يجوز استخدام محلول الكلس والكبريت سوى في الاحوال الاضطرابية . ومن افضل انواع الكبريت فتكاً بمرض ومد التفاح النوع المعروف بالكبريت الغروي (Colloidal Sulfur)

المستحضرات النحاسية : هنالك عدد كبير من هذه المستحضرات تباع باسماء مختلفة ولكن العنصر الفعال فيها هو النحاس الذي يُعتبر من افضل العناصر لابادة الامراض النباتية ، لكن استعماله لاشجار التفاح محدود لانه يسبب حرق الاوراق اذا لم يُستخدم بحذر ، ويلجأ لاستعماله فقط حيث لا يمكن الاستفادة من الكبريت الميكروني او الكبريت الغروي او محلول الكلس والكبريت المركز في اباده بعض الامراض . لا يجوز مزجه مع محلول الكلس والكبريت لان هذا الاخير يحرق النحاس فيزداد احتراق الاوراق او الثمار . لا يمكن تعيين النسبة المستعملة لاختلاف تركيز وتركيب مستحضراته التجارية ، ولذلك يجب على المزارع ان يراجع الشركة المختصة .


الزيوت القطرانية والمعدنية : تُستخرج الزيوت القطرانية (Tar Oils) من القطران الحام المنحضر من الفحم الحجري وذلك بالتقطير بين ٢٢٥ - ٤٠٠ درجة مئوية وبالتجميد لازالة مادتي النفثالين والانثراسين ؛ يجب ان لا ترتفع نسبة الحموضة في الزيت على ٥ ٪ . تصنع هذه الزيوت على صورة مستحلب ليسكن مزجها مع الماء بسهولة ، وهي كاوية ولذلك يجب الاحتراس عند استعمالها .

بعد رش الاشجار بالزيت المعدنية او القطرانية يجب الامتناع عن الرش بالمواد الكبريتية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الرش بالزيت .

المواد الاشعاعية - ظهرت ابان الحرب العالمية الثانية مواد تفتك بالحشرات عن طريق اطلاق اشعة كاما (Gamma Rays) الممينة بواسطة اللمس او الاكل فيشل الجهاز العصبي . والمعروف ان مقادير قليلة من المواد المحتوية على هذه الاشعة لا تأثير لها في الفقاريات او الحيوانات الدموية ولكنها تفتك بالاسماك . واهم هذه المواد مستخرج اصطناعي عضوي اسمه العلمي دايكورو - دايفنيل - ترايكورو ايتين وقد اختصره التجار بالاحرف الثلاثة الاولى من كل كلمة وهي: د. د. ت. وهناك مادة اصطناعية عضوية اشد فتكاً منه تعرف باسم بنزين هكسا كلورايد ومنها انواع عديدة في الاسواق تحتوي على ايسومير كاما بنسب تتراوح بين ٢ - ٦ ٪ ، لأغلبها رائحة كريهة ولذلك لا تصلح للرش على الثمار بل تستخدم في قتل الحشرات في التربة فقط ؛ وهناك اصناف جديدة مكررة لا رائحة لها (تستعمل المواد الاشعاعية بالنسب التي توصي بها الشركة المختصة) .

المواد الفوسفورية العضوية - تحتوي جميع هذه المواد على عنصر الفوسفور مستحضر في شكل مادة عضوية اصطناعية شديدة الفتك تعرف بالاسم العلمي برانيترو فيسل - داي اثيل - ثيوفوسفيت (Parantrophanyl - diethyl - thiophosphate) او بالاسم الكيماوي العادي براثيون (Parathion) ويعرف في الاسواق باسماء تجارية متنوعة (ومنه نوع الماني تدخل المادة داي مثيل بدلاً من المادة داي اثيل في تركيبه) . وبالإضافة الى فتكه بالحشرات فتكاً ذريعاً فهو مبيد للعناكب وخطر على الانسان نفسه . وقد أوجد العلماء مادة جديدة من المستحضرات الفوسفورية العضوية لا تقل

تعتبر هذه الزيوت اقوى مبيد لبيوض الحشرات وحشرة المن القطني والحشرات القشرية المختبئة في شقوق الاغصان وقشورها وفي الساق في الشتاء . وهي تباع في الاسواق كزيوت شتوية وصيفية وتستهمل بنسبة ٥ ٪ او ما يعادل ليترأ واحداً لكل عشرين ليتر ماء في الشتاء ، او ٢٠٠ غرام لكل عشرين ليتر ماء صيفاً الا اذا اوصت الشركة المختصة خلاف ذلك . ولا يستعمل الزيت الصيفي الا عند الحاجة القصوى اليه في الصيف لمقاومة العناكب .



(هرت)

الشكل رقم ٤٥ - الزيوت القطرانية كما تبدو بعد رشها على الاشجار في الشتاء . ان اهم سفة لزيوت الرش هي تكوينها ذرات صغيرة الحجم . قارن بين حجم ذرات الزيت القطراني في (١) و (٢) تجد ان ذرات الزيت في (١) اصغر حجماً وأكثر عدداً ولذلك ينتظر ان يكون فعلها اضعاف فعل ذرات الزيت في (٢) .

تستخرج الزيوت المعدنية (Mineral Oils) من الزيت المعدني الخام ، ويطلق عليها ايضاً اسم الزيوت البترولية ، وهي اشد فتكاً بالحشرات القشرية (وخاصة حشرة سان جوزي) من الزيوت القطرانية ، ولذلك ينصح في حالة اشتداد الاصابة بهذه الحشرة ان يمزج قسم من الزيوت المعدنية مع الزيوت القطرانية بنسبة النصف او تستخدم الزيوت المعدنية وحدها بالنسبة التي توصي بها الشركة المختصة .

الجدول الثاني عشر - الاسماء التجارية للمواد الكيماوية

المستعملة في وقاية اشجار التفاح (١٠)

الاسم الكيماوي	شركة الادوية الزراعية (فؤاد نجار)	شركة الادوية الزراعية (ريشار عبد الثور)	شركة دي بون دي ثامور (ف.ا.ا. كتابة)	شركة داو (الشركة البانية للزراعة والكيماويات)	شركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية	شركة الصناعات الكيماوية (سعاد اخوان)
زرنبيخات الرصاص	زرنبيخات الرصاص	زرنبيخات الرصاص	زرنبيخات الرصاص	زرنبيخات الرصاص	ارسيبت	زرنبيخات الرصاص
علول الكلس والكبيريت	سلفول	دراي ايم سلفر	دراي ايم سلفر	داو دراي ايم سلفر	سلفينيت	سلفوكال
كبريتات البيكوتين	بلاكو	نياتوكس	بلاك ليف فوري	-	نيكوتين سلفيت	سادول
المتنضرات النحاسية	روح الجزائر	سي.او.سي.اس	كوبرو آكومبوند	كوبرو	برنوكس	فوكيوفر كوبرو
الكبيريت الميكروني	كبيريت ميكروني	نياتوكرا سلفر	سلفرون ميكروني	داو ميكسلفر	اسبرول	سوفروكال
الزيوت الفطرية والمدنية	كلاربول ستول	دي آن سي نياتوكرا ايلشن	زيت شتوي وصيفي معدني	داو دورمنت اسبري	اوكسيد ٢	كلاربول تكس فوك
المواد الاشعاعية	ديورا وليدين	كامل، د.د.ت.	ديتاه ٧-لاكون ١٧٨٠	كلمتوكس مكساداو	اكرسيد د.ب.	اكرتوكس مكزافور
المواد الفوسفورية المضوية	ديول	فوسكيل	٣٠٠ ن.ب.١	داو براثيون وينتايب	فوسفونو	فوسفبول
مستنضرات متنوعة	بور، توكسان	بستوكس رقم ٣	فورمات، زلات، برزات	-	-	فاونون، ت.ي.ب.

فتكاً بالحشرات عن البراثيون ولكنها مثة مرة أقل خطراً على الانسان والحيوان واسمها ملاثون (Malathon). يجب ان لا تخلط مادة براثيون مع مواد الرش القلوية كالكلس وذلك للمحافظة على فعاليتها. واذا كان لا بد من استعمالها مع هذه المواد فالأفضل ان ترش حالاً. لا يمكن تقدير نسبة استعمال مادة براثيون لاختلاف تركيزها تجارياً، فالأفضل مراجعة الشركة المختصة.

احذر من الاهمال اثناء استعمال هذه المادة الخطرة القتالة لان سبها زعاف. يجب حفظها في اوعية محكمة السد داخل غرف مغلقة وان لا تلمس جلد الانسان مطلقاً. ولذلك يفضل ارتداء لباس خاص عند الرش بالإضافة الى قفازات (كفوف) ونظارات خاصة. واذا حدث اي لمس وجب غسل الجزء اللامس بالماء والصابون حالاً، والأفضل ان يستحم العامل بعد الرش مباشرة. لا تأكل ولا تدخن ولا تعمل ولا تستنشق عند الرش لثلاثين يوماً. لا تأكل ولا تتبع اي ثمار رشت بهذه المادة الا بعد مرور زمن لا يقل عن ثلاثين يوماً على آخر رشة.

وهناك مادة فوسفورية عضوية اصطناعية اخرى تعرف علمياً بالاسم تترامثيل - بيروفوسفيت (Tetra - Ethyl - Pyrophosphate) وهي لا تقل خطراً عن مادة براثيون وقد اعطيت الاسم المختصر: ت.ي.ب. وتستخدم هذه المادة ضد الحشرات عامة والمن خاصة، وهي تستوجب الحذر الشديد اثناء الاستعمال.

لتلافي الارتباك بين اسماء المواد الكيماوية العلية المستعملة في وقاية اشجار التفاح وثمارها من فتك الآفات الزراعية وبين مرادفات التجارية المتنوعة خصصنا جدولاً يبين الاسم العلمي الاصيل والاسم التجاري الذي استخدمته الشركة المعنية (الجدول الثاني عشر).

الفصل الثلاثون

اعداد المحاليل الكيماوية الواقية

ومنهاد الرش الجماعي

لاجل اعداد محلول الرش في الاوقات المناسبة وبالطرق العلمية يترتب على المزارع مراعاة الامور التالية :

اولاً - يجب ان يتعرف الى نوع الحشرة او المرض الذي سيستعمل المحلول لابطائه والى كل من المواعيد التي يعد محلول الرش فيها اذ لا ضرورة لاعداد او استخدام بعض المحاليل بدون سبب .

ثانياً - اختر الدواء الذي يقضي على تلك الحشرة او ذلك المرض واحرص على ان يلائم استعمال ذلك الدواء الاحوال الجوية آنذاك . مثلاً لا يجوز استعمال الزيوت الشتوية في الصيف ولو كانت مخففة ، كما لا يستحسن استعمال محلول الكلس والكبريت المركز في اواسط فصل الصيف لانه قد يسبب احتراق الاوراق وتشويه الثمار اذا كان الجو جافاً جداً والقيظ شديداً والنسبة مغلوطه . كذلك لا يجوز استعمال المواد الاشعاعية او الفوسفورية العضوية اذا كان الشر سيستهلك قبل انقضاء ثلاثين يوماً على رشه .

ثالثاً - اشتر المواد الكيماوية اللازمة من الاسواق ولا تحاول تركيب بعضها توفيراً للعمل ولصعوبة معرفة تركيزها . والافضل ان تشتري المواد المغلفة

في اوعية محتومة تفادياً للشك مهما كانت الكلفة . اشتر كمية وافرة من جميع المواد اللازمة تكفي لموسم واحد على اقل تقدير لانه لا يجوز تأخير مواعيد الرش عدة ايام لنقصان بعض المواد الضرورية او لاختفائها من الاسواق ، هذا بالاضافة الى ان شراء المواد بالجملة يوفر مبالغ كبيرة على المزارع .

رابعاً - حاول ان تحصل من الشركة المختصة على نسبة تركيز المحلول او المسحوق والكمية الواجب استعمالها في الرش بالنسبة لكل فصل من السنة ولكل نوع من الآفات . لا تنس ان تجهز مقاييس للسوائل واخرى للمساحيق عليها اشارات او كتابة تدل على عدد اللترات او الكيلوغرامات او السنتيمترات المكعبة او الغرامات . واذ يختلف حجم المساحيق والمحاليل المركزة احياناً بالنسبة لوزنها وجب التنبيه الى الالتباس ، فالكيلوغرام من محلول الكلس والكبريت المركز - مثلاً - هو اقل من لتر سائل حجماً اذا كان عياره ٣٢ يومي . استوضح الشركة المختصة عن هذه التفاصيل بالنسبة لكل مادة كيماوية تشتريها منها لان الرش بالنسب المغلوطه قد يحرق الاوراق ويشوه الثمار او لا يكفي لابطاء الآفة فيضيع الموسم بكامله .

خامساً - انتبه الى تجانس المحاليل وكيفية مزجها واسبقية وضعها في محلول الرش لان هذه الامور اهمية كبيرة في نجاح اعمال الوقاية وسلامة الاشجار والثمار . ولاجل تحقق تجانس المحاليل راجع «استخدام المواد الكيماوية» ؛ احذر من خلط جميع المواد دفعة واحدة بل اضفها للماء واحدة واحدة منتبهاً الى اسبقية الوضع .

اذا رغبت مثلاً في خلط محلول الكلس والكبريت المركز مع مادة زرينخات الرصاص تنبه الى وضع الكمية اللازمة من محلول الكلس والكبريت بالماء اولاً وامزجها جيداً ثم اضف المادة الناشرة - اللاصقة فالكلس المحروق وامزجها جميعها

الجدول الثالث عشر - منهاج الرش الجماعي لوقاية اشجار التفاح من الآفات في لبنان

النسبة لكل		المادة المستعملة وتركيزها		نوع الحشرة او المرض		موعد الرش	
ليتر ماء	غرام	الزيتوب الشتوية القطرانية او المدنية +	داي فابتو فينول	الحشرات القشرية ، يسوس الحشرات ، العناكب ، المن على انواعه .	الرش الراقط (الشتوي) : قبل بدء التمييزه ١١ شباط وه آذار تمساً لظروف الجوية وارتفاع المربع	ليتر ماء	غرام
١٠٠	٤٠٠٠	محلول الكلس والكبريت ٣٢ بومي .	محلول الكلس والكبريت ٣٢ بومي .	رمد التفاح ، التبغ ، المن على انواعه ، ثاقبة البراعم الزهرية ، العناكب ، دودة غمر التفاح .	٢٠	١٠٠	٢٥٠٠
٢٠	١٠٠٠	محلول كبريتات النيكوتين المركز ٤٠٪ / ٤٠	محلول الكلس والكبريت ٣٢ بومي	دودة غمر التفاح ، رمد التفاح ، التبغ ، المن الاخضر .	٢٠	١٠٠	٢٥٠٠
١٠٠	٥٠٠	مادة فاشرة - لاصقة	مادة فاشرة - لاصقة		٢٠	١٠٠	٥٠٠
١٠٠	٥٠٠	زدينجات الرصاص ٣٢٪	زدينجات الرصاص ٣٢٪		٢٠	١٠٠	٥٠٠
١٠٠	٥٠٠	محلول الكلس والكبريت المركز ٣٢ بومي	محلول الكلس والكبريت المركز ٣٢ بومي		٢٠	١٠٠	٥٠٠
١٠٠	٥٠٠	كلس كلوي	كلس كلوي		٢٠	١٠٠	٥٠٠
٥	٢٥	مادة فاشرة - لاصقة	مادة فاشرة - لاصقة		٢٠	١٠٠	٥٠٠

١٠	٥٠	براثيون	براثيون	دودة غمر التفاح ، العناكب والمن القططي .	٤ - التغطية الاولى ٨ ايام تقريباً بعد الرش التوجيات
١٠٠	٥٠٠	زدينجات الرصاص ٣٢٪	زدينجات الرصاص ٣٢٪	دودة غمر التفاح ، الرمد ، التبغ .	٥ - التغطية الثانية ١٥ يوماً من تاريخ التغطية الاولى
١٠٠	٤٠٠	مسوق النحاس « راجع الشركة »	براثيون	دودة غمر التفاح ، المن القططي ، العناكب .	٦ - التغطية الثالثة ٢١ - ١٥ يوماً من تاريخ التغطية الثانية
١٠٠	٥٠٠	كلس كلوي	زدينجات الرصاص ٣٢٪	دودة غمر التفاح ، الرمد ، التبغ ، مرض سفيريوبسيس .	٧ - التغطية الرابعة ٢١ - ١٥ يوماً من تاريخ التغطية الثالثة (غير ضرورية للاصناف الصيفية المبكرة)
٥	٢٥	مادة فاشرة - لاصقة	براثيون	دودة غمر التفاح ، المن القططي .	٨ - التغطية الخامسة ٢١ - ١٥ يوماً من تاريخ التغطية الرابعة (غير ضرورية للاصناف الصيفية المتأخرة)
١٠	٥٠		براثيون	دودة غمر التفاح ، الرمد ، التبغ .	٩ - التغطية السادسة والسابعة (?) ٢١ - ١٥ يوماً بعد التغطية الخامسة (توقف عن الرش ٢٠ يوماً قبل ططف الثمار)
١٠٠	٥٠٠	زدينجات الرصاص ٣٢٪	زدينجات الرصاص ٣٢٪		
١٠٠	٥٠٠	كبريت ميكروني او غروي	كبريت ميكروني او غروي		
١٠٠	٥٠٠	كلس كلوي	كلس كلوي		
٥	٢٥	مادة فاشرة - لاصقة	مادة فاشرة - لاصقة		

جيداً ؛ وقبل البدء بالرش بوقت قليل اضع مسحوق زرنبيخات الرصاص واخلطه جيداً ورش حالاً . هذه الطريقة يتلافى المزارع تكوين رواسب خضراء ضاربة الى السمرة تخفف من فعل المحلول كثيراً وتجعل من الصعب رشه . لا تستخدم هذا المحلول بعد انقضاء ساعات قلائل على تجهيزه . اذا اضيف الكبريت الميكروني الى محلول يحتوي زرنبيخات الرصاص فالأفضل وضع الكبريت في الماء أولاً ثم تضاف كمية الكلس المقررة فالمادة الناشرة - اللاصقة وتخلط جميعها جيداً ثم تضاف مادة زرنبيخات الرصاص قبل الرش بقليل ويحرك الخليط جيداً . لا تستخدم هذا المحلول بعد انقضاء خمس ساعات على تجهيزه .

ملاحظات عن منهج الرش الجماعي

ان هذا المنهج يشل الوقاية من اضرار أكثر الحشرات والأمراض التي تعتري اغصان اشجار التفاح وأوراقها وقمارها في لبنان، ويمكن تطبيقه بنجاح في جميع المناطق والأقاليم في الشرق الأدنى بقليل من التغيير اذا اقتضى الأمر ليطباق أحوالاً خاصة تستدعي التغيير . اما اذا كان لديك منهج للرش يعطيك نتيجة مرضية فلا ضرورة لاتباع اي منهج آخر لأن الهام في الأمر ان يكون لديك منهج مرضٍ وافي التفاصيل . واليك بعض الملاحظات عن هذا المنهج :
اولاً - ان بعض انواع زرنبيخات الرصاص التجارية لا تحتاج الى مواد ناشرة - لاصقة لانها مدموجة فيها (راجع الشركة المختصة) .

ثانياً - يمكن الاستعاضة عن مادة براتيون بمادة د. د. ت. الاشعاعية ولكن من الصعب في هذه الحال القضاء على حشرة المن القطني كما ان هذه المادة تشجع انتشار العناكب بكثرة (الجرب او الاكاروس) . لذلك لا ينصح باستخدام مادة الد. د. ت. في هذا المنهج لأن هذه الحشرة تشكل خطراً على اشجار التفاح ؛ كما لا ينصح باستعمال المواد الاشعاعية ذات الرائحة الكريهة . الا

انه يمكن مداومة الرش بزرنبيخات الرصاص والكبريت الميكروني او الغروي بدلاً من مادة براتيون مع اضافة كبريتات النيكوتين .

ثالثاً - يستعمل الكبريت الميكروني او الغروي صيفاً لأنه اسلم عاقبة واكثر فعالية من محلول الكلس والكبريت المركز وخاصة ضد مرض رمد التفاح .

رابعاً - استعمل مسحوق النحاس او ايتاً من مشتقاته في التغطية الرابعة بنسبة خفيفة وخاصة على اشجار الصنف كولدن ديلبشس للقضاء على بعض الأمراض التي لا يفتك بها الكبريت الميكروني ولا محلول الكلس والكبريت .

خامساً - لا يجوز بتاتاً استعمال مادة البراتيون بعد التغطية الخامسة .

سادساً - لا ضرورة لرش التغطية الرابعة على الأصناف الصيفية المبكرة، ولا التغطية الخامسة على الاصناف الصيفية المتأخرة، كما يجب استبدال مادة البراتيون في هذه التغطية برش مادة زرنبيخات الرصاص على الأصناف الصيفية المتأخرة .


سابعاً - يجب رش اشجار التفاح بمادة البراتيون بعد قطف الثمار في اواخر شهر ايلول لآبادة الحشرات التي تستعد للاشتاء .

ثامناً - ان جميع المقاييس المدرجة صحيحة فقط حتى درجة التركيز الميئة، فيترب على المزارع ان يستعمل الكميات التي تقدّرها الشركة المختصة ببيع المادة تبعاً لدرجة تركيزها .

انتخاب مضخات الرش

على المزارع ان يأخذ بعين الاعتبار الامور التالية للحصول على مضخة صالحة للرش :
اولاً - عدد الأشجار وحجمها وعمرها لأن هذا الأمر يحدد حجم المضخة .

وتستخدم في البساتين الكبيرة جداً مضخات مركزية غير متنقلة تسيّر المحاليل بواسطتها داخل انابيب رش خاصة الى أشجار البستان ، وهذه افضل واسهل واسرع وسائل الرش لكن تكاليف تركيبها كثيرة جداً ولا حاجة لها الا اذا زاد عدد اشجار البستان على عشرة آلاف شجرة تفاح مشرة أو حيث يزيد عدد الأشجار على خمسة آلاف ولا تساعد طبيعة الارض على استخدام مضخات كبيرة نقالة .



(هاردي)

الشكل رقم ٤٦ - مضخة رش صغيرة الحجم يمكن لشخص واحد نقلها من مكان الى آخر بسهولة بجهاز بمحرك قوته حصان واحد يمكنه رفع الضغط الى ٢٠٠ ليبرة في البوصة، وهي ممددة بخزان سته ١٠٠ ليتر ماء (٢٥ غالوناً اميركياً) وفي داخله فراش ضروري لتحريك مواد الرش .

الرش بالمحاليل الكيماوية الواقية

بعد اتمام جميع تجهيزات الرش على المزارع ان يتم بأمرين آخرين لاقام

ثانياً - المدة التي يجب ان ينتهي خلالها الرش لأنه يجب اتمام الرش بمدة لا تتجاوز بضعة ايام لئلا يفوت الموعد ويستفحل الضرر .

ثالثاً - تقدير كمية الماء اللازمة وبعدها مصدرها عن موقع الرش لأن نقل الماء يستغرق نصف وقت العامل .


رابعاً - طبيعة الأرض المعروسة فيها الاشجار لأنها تريد العمل الشاق تبعاً .

خامساً - حجم المضخة وقوة الضغط فيها ، فالمضخة الكبيرة تسهل العمل ، والضغط القوي يساعد على الرش بدقة وبقوة ضرورية لاختراق انسجة بعض الحشرات او الدخول في شقوق الشجرة وثقوبها وبين ثنايا قشورها .

يشترط ان تكون مضخة الرش جيدة الصنع من معدن لا تأكله السوائل الكيماوية وان تكون قطعها موفورة سهلة الاستبدال . وثمة انواع لا تخصي من مضخات الرش تناسب حاجة كل مزارع . يكفي البستان الصغير مضخة تحمل على الظهر سعتها خمسة عشر ليترأ تبلغ قوة الضغط فيها مئة ليبرة في البوصة المربعة . وافضل من هذه مضخة سعتها من ٥٠ - ٦٥ ليترأ تسيّر على دولابين يشتغل عليها عاملان أحدهما يضغط الهواء والآخر يرش ، وقد يبلغ الضغط فيها ١٢٥ ليبرة . ولأجل رش البساتين المتوسطة الحجم يجب اقتناء مضخة آلية تشتغل بواسطة محرك يسيّر بالبتروول وهي افضل من المضخات الصغيرة لأنها سهلة النقل ويمكن بواسطتها المحافظة على ضغط لا يقل عن مئتي ليبرة في البوصة الواحدة وهذا أمر شديد الخطورة بالنسبة لزيادة فعالية مواد الرش ، كما يوجد في اكثرها فراش محرك داخل براميل الرش يساعد على خلط المواد التي لا تتحلل في الماء كزرنبيخات الرصاص فتحول دون رسوبها اثناء الرش . ان هذا النوع من المضخات يساعد على الدقة والاسراع في الرش فلا يفوت المحدد (الشكل رقم ٤٦) .

مهمة الرش على افضل وجه وهما : التوقيت والدقة .

التوقيت : لأغلب الحشرات والأمراض مواعيد خاصة تظهر فيها وتختفي بعدها سنة تلو الاخرى بدون شذوذ . كذلك تبدو الآفات في بعض أطوارها اسهل مكافحة واكثر تعرضاً للمحالييل الكيماوية ، فيجب ان لا تمر هذه الفترة السانحة دون انتهازها لآبادة الآفات التي تفتك بالأشجار والثمار . فان دودة ثمر التفاح وهي في دور اليرقة في الجيل الاول من الموسم مثلاً تفضل ان تقتات وهي داخل حوض الثمرة فتدخل اليه والكأس مفتوحة . لكن الكأس تبقى مفتوحة مدة قصيرة فقط بعد سقوط التويجات ثم تقفل وتبقى اليرقة داخلها ، فيجب اذن اىصال السم الى اليرقة قبل ان تقفل الكأس . فاذا لم ترش الاشجار في



(هاردي)

الشكل رقم ٤٧ - مضخة رش متوسطة الحجم يمكن لشخصين نقلها من مكان الى آخر بجهد بمحرك تروته حصانان يمكن بواسطته رفع الضغط الى ٣٠٠ ليبرة في البوصة ، و١٦ معدة بجزان سنه ٢٠٠ لتر ماء (٥٠ غالوناً اميركياً) ، في داخله فراش ضروري لتحريك مواد الرش .

الوقت المناسب والكأس مفتوحة ضاعت اثن فرصة لآبادة يرقات الجيل الأول التي تدخل الى جوف الثمرة عن طريق الكأس المفتوحة وبذلك تتعاظم الحسارة اذ ان القضاء المبوم على يرقات هذا الجيل هو السر في نجاح منهاج الرش الجماعي . وقد لا يمكن القضاء على حشرة المن القطني بالاعتماد على منهاج الرش الجماعي الذي يسيّر حسب مواعيد مقررّة لان المزارع قد يخطئ في تغطية بضع حشرات منها سرعان ما تتكاثر في اسبوع واحد وتنزل الضرر بأشجاره . لهذا وجب احياناً اعادة رش الاشجار مرة اخرى بالمواد المبيدة لهذه الحشرة بعد خمسة ايام من تاريخ آخر رشه .

وهناك امثلة عديدة تدل على انه يصعب ايضاً القضاء على الأمراض في بعض اطوارها لصعوبة اختراق المواد الكيماوية الى داخلها .

الدقة في الرش : ان نجاح الرش بوجب ان يكون التقييم الشنوي صحيحاً فيتمكن العامل من اىصال مواد الرش الى جميع اجزاء الشجرة بالتساوي ، فمن الصعب اىصال مواد الرش بشدة وتساوي الى الاشجار الكثيفة الكثيرة الارتفاع البعيدة الاطراف والى الثمار المتلامسة . مما يزيد فعالية مواد الرش ويسد احكامها الى الاهداف قوة الضغط الشديد داخل المضخة ، فقوة الضغط تسمح باختراق انسجة بعض الحشرات وتنتشر المواد المبيدة في الثقوب والشقوق . ويعتبر الضغط ما بين ٢٥٠ - ٣٠٠ ليبرا في البوصة ضرورياً لنجاح اعمال الوقاية .

لا تبخل بالمقادير المخصصة لكل شجرة لان ذلك يكلف كثيراً اذ قد بوجب اعادة اعداد المحاليل مرة اخرى . ولكن يجذر الرش بكمية زائدة كثيراً لثلا تتوارى الاوراق فتضعف مقدرتها على انتاج الغذاء فتتضرر الثمار ؛ ويغلب ان يكون ضرر الرش الكثير ابلغ من الضرر الناتج من الحشرات

والامراض وذلك لجهل المزارع كيفية تجهيز المحاليل والرش بها .

كيفية الرش : لا ترش مبكراً في الصباح واوراق الاشجار يبيلها الندى لان ذلك يخفف من قوة المحلول ويساعد على انزلاقه عن سطح الاوراق . يجب ايضاً ان تتلافى الرش في الساعات التي تكثر فيها الرياح . واذا كان لا بد من الرش اثناء الرياح فصبوب فوهة المرش الى زاوية قائمة مع الريح . لا ترش الاشجار وهي في حالة عطش والتربة جافة، ولذلك يفضل ان تسقى الاشجار قبل موعد الرش بقليل لا بعده؛ ولا ترش ظهراً في ايام القيظ وايام الرياح الحسينية .

لا تنس ان الضغط المرتفع جداً (فوق ١٥٠ ليبرة) ضروري لمضاعفة فعالية المواد السامة والكاوية، لذلك يغلب ان تضع فعالية المواد ليس لردائها كما يعتقد المزارع بل لان الضغط المستعمل ابان الرش كان ضعيفاً وانتشار المواد على اجزاء الشجرة كان محدوداً .

رش اولاً داخل الشجرة مبتدئاً من اطرافها السفلى الى اعلاها ثم رش الاطراف العليا فالسفلى من الخارج . واذا تيسر وجود سربين فيمكن رش نصف الشجرة من الخارج في السرب الأول ونصف الشجرة المقابلة في السرب المجاور ثم رش ما تبقى من الشجرتين بعد الانتقال الى الاسراب المجاورة . يجب ان يتأكد لك ان المحلول غطى كل جزء من الشجرة بقدر وافر وانه اخترق الى الشقوق والجروح بشدة واصاب البيوض او الحشرات المختبئة .

الفصل الحادي والثلاثون

الاعراض الغذائية في اشجار التفاح وثمارها

عزيزت فيما مضى بعض اعراض اشجار التفاح وثمارها الناتجة من نقصان بعض انواع الغذاء في الاتربة الى اصابها بالامراض . وبعد البحث المستفيض تبين بطلان هذا المعتقد وثبت ان كثيراً من الأعراض يرجع الى نقصان مقادير زهيد جداً من العناصر التي كان يعتبر وجودها ساماً وضاراً بحالة النمو . ويرجع نقصان العناصر الغذائية في الاتربة الى امرين : اولاً عدم وجودها فيها من ذي قبل او نضوبها منها لامتناسها بواسطة الجذور لاستخدامها في انتاج الثمار . وثانياً قد توجد الاغذية في التربة بحالة غير جاهزة فلا يمكن ان تمتصها الجذور . وليست كيفية امتناسها بالامر السهل كما يتبادر لذهن المزارع وذلك لوجودها في التربة على حالتين : (ا) في حالة مركبة او غير محلولة وهي ما لا يستفاد منها مباشرة وتعتبر مجتمدة فلا تمتصها النباتات الا اذا تحللت . ويرجع السبب في تجدها الى حالة تفاعل التربة ، فالاتربة القاعدية وخاصة التي ترتفع فيها نسبة الكلس تلتقط ايوناتها الموجبة ما فيها من العناصر الغذائية قبل ان تستطيع النباتات الاستفادة منها ؛ ويزداد مقدار ما يتحلل من هذه العناصر بازدياد نسبة الحموضة في التربة . (ب) قد توجد العناصر الغذائية في محلول التربة بما يجعلها سهلة الضياع في الماء المنصرف قبل ان تستفيد منه الجذور .

يستدل بما تقدم شرحه انه يصعب التعرف الى نقصان اي عنصر من العناصر الغذائية بالطرق الكيماوية لان القرائن الدالة على نقصان عنصر في نوع من التربة ليست نفسها التي تدل على النقص في نوع آخر في النبات عينه، وهذا يجعل من الضروري درس كل نوع من التربة بمفرده والتعرف الى القرائن الدالة على نقصان العناصر الغذائية كل بمفرده . وافضل طريقة عملية للتأكد من نقصان المواد الغذائية هي ملاحظة نمو الاشجار عن كسب وتمييز الاعراض الطارئة على النمو الحضري والثمار والمبادرة الى معالجتها . وفيما يلي وصف موجز لبعض الاعراض الغذائية الناتجة من نقصان بعض العناصر .

قوائن نقص العناصر الغذائية

قبل البدء في وصف الاعراض الغذائية لا بد من كلمة تحذير . انه في كثير من الحالات تنقص من التربة مقادير محسوسة من الاغذية الضرورية كالآزوت والفوسفور والبوتاس ، فيمكن ملافاة اضرارها بسهولة وذلك باضافة الاسدة العضوية او الكيماوية كغذاء ضروري للنمو ، انا قد تنقص بعض العناصر من التربة كالبورون والزنك مثلاً وهي تكاد لا تُقدَّر بالتحليل الكيماوي فتسبب اعراضاً اشبه بالامراض الفطرية او غيرها فتضاف هذه العناصر كدواء واقٍ وليس كغذاء، وعليه ستبحث قرائن نقصان الاغذية الضرورية اولاً ويلها بحث قرائن نقص العناصر الوقائية .

الآزوت (النيتروجين) - بسبب نقصانه اعراضاً خارجية تظهر للعيان بسهولة اذ يصبح النمو ضعيفاً جداً ويقف مبكراً قبل اوانه في اواسط الصيف، وتصفّر الاوراق في الربيع، واذا سقطت مبكرة عن الاشجار المغروسة في التربة العميقة الغور يُعتبر سقوطها ناتجاً من نقصان هذا العنصر ؛ وقد تسقط الازهار

والثمار . ويعتبر نضج الثمار المبكر جداً على غير انتظار بالنسبة للصنف دليلاً قاطعاً على نقصان الآزوت .

الفوسفور - من دلائل نقصانه ان يتحول لون الاوراق الى اخضر ادكن غير لامع في الربيع واول الصيف والى نحاسي في آخره ، ويتغير لون العروق الرئيسية في الاوراق الى بنفسجي وتسقط قبل اوانها . ويسبب فقدانه انخفاضاً ملموساً في الانتاج ، وتفقد الثمار لمعانها ويزول روائها كما يبدو اللب غير صلب بني اللون تظهر عليه علامات عرض الانحلال الداخلي (راجع الفصل الثاني والثلاثين) .

البوتاس - يسبب فقدانه لا سيما في التربة الكلسية فترة نمو حضري قصيرة جداً فتَهزل فروع الاشجار وتصفّر الاوراق في البدء ثم تظهر علامات الاحتراق على اطرافها ، وفي العروق الرئيسية تبدو بقع احتراق في اواسط الاوراق في الصيف وتموت احياناً الفروع الحديثة في آخر الصيف .

الكلس - من اعراض نقصانه تغير لون الاوراق النامية على الاطراف العليا الحديثة التكوين من اخضر الى اصفر في حين تحتفظ الاوراق السفلى بخضرتها ويقصر النمو ويخشب . يضعف نمو الجذور وانتشارها وتقل مقدرتها على امتصاص الماء .

وملافاة هذه الاعراض الغذائية يجب تسميد التربة كما جاء في الفصل الحادي عشر . وفيما يلي اوصاف الاعراض الناتجة من نقصان العناصر الوقائية :

البورون - بسبب فقدان هذا العنصر من التربة العراض الفليني (Cork & Drouth Spot) في الثمار، وقد اخطأ بعض العلماء في نسبته اولاً الى الامراض الطفيلية ثم الى الاعراض الطبيعية الناتجة من ارتفاع الحرارة ونقصان الماء . وتتميز الثمار المصابة بهذا العرض بوجود بقع بنية اللون فلينية المظهر في لبها بالقرب من جوفها ، كما ان اللب يبدو مطاطاً او طريئاً اذا صُفط عليه .

وقد يظهر هذا العرض بالقرب من سطح الثمرة فتبدو اولاً خشنة الملمس مجمدة تكثر فيها النقر المنخفضة ثم يظهر عليها الجفاف وتتشقق (الشكل رقم ٥٠).
يعتقد البعض ان فقدان البورون هو السبب الرئيسي « للموت الرجعي » (Die-Back) في الفروع الحديثة. تظهر بوادر هذا العرض في آخر الصيف عندما تبدأ الفروع الحديثة بتكوين اوراق صغيرة صفراء اللون وقد تنقلب نحاسية، ويتغير لون عروق الاوراق من اخضر الى احمر، وتبدو الحروق واضحة على رأس الورقة . وكذلك يجف الحشب تحت البراعم الجانبية فتسقط شيئاً فشيئاً باستثناء اوراق رأس الفرع التي تشكل باقة ، وسرعان ما تموت الفروع تدريجياً من اعلى الى اسفل (الشكل رقم ٤٨) .

وقد اظهرت الاصناف تفاوتاً في اصابتها بهذين العرضين ، واكثر الاصناف التي تصاب بها هي ماكتوش ويلو نيوتن وبن ديفيز وجوناثان وروم بيوتي. ويكثر هذان العرضان في الاتربة الكلسية والاتربة القليلة الغور وحيث يصعب انتشار الجذور .


طرق الوقاية : هناك ثلاث طرق لتلافي نقصان هذا العنصر ، اولاً : يضاف الى الاتربة غير الكلسية بمعدل ربع كيلوغرام للشجرة الواحدة الكبيرة الحجم مرة كل سنتين في الحريف او اواخر الشتاء . تُنثر هذه المادة على التربة تحت جميع اجزاء الشجرة على بعد متر من ساقها ويعزق التراب .

ثانياً : اذا كانت التربة كلسية فالأفضل رش الاشجار بالبورون مرتين، الاولى بعد سقوط التويجات اي في موعد الرسة الاولى بعد الازهار، والثانية متأخرة عنها ثلاثة اسابيع . ترش مادة البوراكس بمعدل ربع كيلوغرام لكل مئة لتر من الماء . والأفضل الرش بها مع محلول الكلس والكبريت المخفف او الكلس المطفي لتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالاوراق من الحامض . والطريقة الثالثة



الشكل رقم ٤٨ - شجرة تفاح حديثة ظهرت عليها أعراض سوء التغذية. لقد تموت الأغصان العليا من اوراقها في اواسط موسم النمو، وقد يكون هذا « الموت الرجعي » نتيجة لنقصان عنصر البورون (?).

(برك وموريس)



الشكل رقم ٤٩ - اغصان مصابة بأعراض سوء التغذية ، وقد ظهرت القشرة جافة ومنقورة ومشققة ، تفشاها نقط بيضاء عديدة.

(برك وموريس)



(برك وموريس)

الشكل رقم ٥٠ - العرض الفليني في ثمار التفاح الناتج من نقصان عنصر البورون؛ يبدو غالباً على شكل بقع فلينية بالقرب من جوف الثمرة ويصبح لها مطاطاً؛ وأحياناً يظهر العَرَض على سطح الثمرة على شكل نقر منخفضة عديدة .



(مجاعص)

الشكل رقم ٥١ - عَرَض « روزيت » في الاوراق الناتج من نقصان عنصر الزنك في التراب. تنمو على رؤوس أغصان الاشجار أوراق جلدية الملمس لا أعناق لها متجمعة في باقات صغيرة « روزيت » .

لاضافة هذا العنصر هي حقن الاشجار تحت الضغط الشديد بمحلول خفيف جداً من حامض البوريك . انما يجذر وضع مسحوق البوريك المركز في ثقب ثقوب تفتح في ساق الشجرة لانه سام جداً .

الزنك - اكثر ما يظهر نقصان هذا العنصر في الاتربة القاعدية ، وفضل دليل على نقصانه ظهور اوراق صغيرة ضيقة لا يزيد طولها على خمسة وعشرين مليمترأ وهي جلدية لا أعناق لها متجمعة على رؤوس الفروع على شكل باقة ورد او روزيت (Rosette) وذلك في بدء النمو في الربيع، وينمو تحتها على الفروع نفسها اوراق خضراء سليمة لها أعناق (الشكل رقم ٥١) . فاذا استمر هذا العرض ثلاث سنوات متتالية تبدأ الاشجار بالجفاف تدريجياً من اعلاها ويقبل فيها تكوين البراعم الزهرية وعقد الثمار ويصغر حجمها .

طرق الوقاية : ترش الاشجار قبل موعد انتفاخ البراعم في الشتاء في الايام الغائمة الباردة بمادة كبريتات الزنك (Zinc Sulfate) بنسبة اثنين ونصف بالمئة او نصف كيلوغرام في عشرين ليتر ماء . واذا كانت اصابة الاشجار شديدة يعاد الرش ثلاث سنوات متتالية . كما يمكن نثر كبريتات الزنك على التربة تحت الاشجار في الشتاء بمعدل ربع كيلوغرام للشجرة الكبيرة الحجم مرة كل ثلاث سنوات . والطريقة الاولى هي الافضل .

الحديد - ان هذا العنصر ضروري لانتاج المادة الخضراء في الاوراق ولا ينقص الا في الاتربة الكلسية المفتقرة اليه . ومن دلائل نقصانه زوال اللون الاخضر في الاوراق وظهور اللون الاصفر الذهبي عليها . ولذلك وجبت اضافته للتربة في شكل مسحوق سترات الحديد بنسبة مئة غرام لكل سنتيمتر واحد من قطر الشجرة . ينثر في حفرة واسعة تحت الشجرة ويظمر .

المنغنيز - من بوادر نقصانه ان تبدو الاوراق مرقشة باللون الاصفر وتبقى

العروق خضراء . لاجل الوقاية من ظهور العرض الحاصل من هذا النقص رش الاشجار بمحلول كبريتات المنغنيز بمعدل واحد بالمئة مضافاً اليه واحد بالمئة من الكلس .

الفصل الثاني والثلاثون

الاعراض الطبيعية في اشجار التفاح وثمارها

من الاغلاط الشائعة سابقاً الاعتقاد ان اكثر الظواهر غير الطبيعية البادية على الثمار ابان حفظها في البراد متأتية عن الاصابة بالامراض النباتية؛ لقد زال هذا الاعتقاد الخاطيء بعد ان تبين ان معظم الاصابات التي تظهر على الثمار بعد حفظها في البراد تنتج من اعراض طبيعية لا صلة لها بالامراض النباتية او بنقصان الغذاء وذلك باستثناء المرض الفطري المعروف بالعفن الازرق .

اسباب الاعراض الطبيعية الرئيسية

تنتاب هذه الاعراض الاشجار والثمار مع ان الاسباب الحقيقية الداخلية ما تزال مجهولة وقد تكون ناجمة عن اختلاف في تركيب الاصناف طبيعياً وكيمياوياً؛ فلا حاجة للشك بان للمناخ وطرق تعهد الثمار وهي على الاشجار وبعد حفظها في البراد اثرآ فعالاً في ارتفاع نسبة انتشار الاعراض وانخفاضها ، وإليك بعض هذه العوامل :

اولاً - انخفاض درجة الحرارة المفاجيء في الشتاء : ان تدني درجة الحرارة المفاجيء الشديد يتلف الاجزاء الحضرية كالبراعم والاعصان والسوق، وقد سبق ذكر تأثير هذا الانخفاض المفاجيء في الاجزاء التي لم تستكمل نضوج خشبها في الحريف؛ واهم اصابة من هذا النوع هي « لفحة الشمس الشتوية » وسيأتي بحثها .

النحاس - من دلائل نقصانه ان تظهر على رؤوس الاوراق حروق بنية قد تمتد الى باقي الاطراف في حالة اشتداد العرض وقد تسقط الاوراق . يتقى ذلك بنثر مقدار ربع كيلوغرام من كبريتات النحاس على التربة تحت الاشجار او بوضعها في التربة في ثقوب موزعة كما جاء في تسبيد الاشجار .

المغنيسيوم - هذا العنصر ضروري أيضاً لانتاج المادة الخضراء في الاوراق، وقد ينقص اذا ازدادت كمية البوتاس في التربة. بسبب نقصانه توقف نمو الطبقة المولدة في اوائل الصيف ويظهر الاصفرار على الاوراق وتصبح هذه مرقشة اللون بنية وقد تسقط . يتقى ذلك باضافة مادة كبريتات المغنيسيوم بمعدل ربع كيلوغرام للشجرة كما جاء في التسبيد عند بواذر ظهور العرض .

تجب الملاحظة ان اضافة هذه العناصر الواقية اما عن طريق نثرها او رشها يعمل بها فقط بعد التثبت من فقدانها في التربة وحاجة الاشجار اليها لان جميعها سام وضار بالنمو اذا زاد عن المعدل الذي اشرنا اليه .

ثانياً - انخفاض درجة الحرارة في الصيف : ان انخفاض درجة الحرارة في الصيف دون معدل ٥ ، ١٥ درجة مئوية اثناء تكوين الثمار ونضجها يسبب اصابة بعض اصناف ثمار التفاح وهي في البراد بعرض اللب البني وعرض الجوف البني .

ثالثاً - ارتفاع درجة الحرارة في الصيف : يسبب ارتفاع درجة الحرارة اثناء تكوين ونضج الثمار وخاصة في شهري تموز وآب عن معدل ٢٠ درجة مئوية او ارتفاعها فوق ٢٦ درجة مئوية لمدة قصيرة اصابة الثمار بعرض الجوف المائي .

رابعاً - انخفاض درجة الحرارة اثناء تبريد الثمار يسبب اصابها بعرض الجوف البني وعرض الانحلال الاسفنجي .

خامساً - ارتفاع درجة الحرارة اثناء تبريد الثمار يسبب اصابها بعرض الانحلال الداخلي ويقصر اجلها كثيراً .

سادساً - ارتفاع نسبة غاز ثاني اوكسيد الكربون والغازات الضارة الاخرى او انخفاض نسبة الاوكسجين في غرف التبريد يسبب انتشار عرضي قمر التفاح والقلب البني .

سابعاً - التعهد المغلوط وخاصة كثرة السقي وتقديم موعد قطف الثمار كثيراً أو تأخيره يسبب بعض الاعراض الطبيعية واهمها عرض النقرة المرة والجوف المائي .

ثامناً - هناك عوامل مجهولة تسبب عرض بقعة جوناتان .

اسباب الاعراض الطبيعية الثانوية

ثبت ان الاسباب الثانوية التالية تساعد على انتشار الاعراض الطبيعية في الثمار ويظهر تأثيرها بعد حفظها في البراد :

اولاً - درجة النضج : ان عدم بلوغ الثمار درجة النضج الكافية وخاصة

بقاء لونها في خضرتها يساعد على انتشار اعراض قمر التفاح، والانحلال الداخلي ، والجوف البني . وكذلك اذا فات النضج درجاته الاولى ولم تقطف الثمار تصاب بعرض بقعة جوناتان ويقصر اجل حفظها في البراد كثيراً .

ثانياً - الثمار الكبيرة الحجم : ان الثمار الكبيرة الحجم من اي صنف هي اكثر من الاحجام الصغيرة تعرضاً للاصابة بالاعراض الطبيعية مثل الجوف المائي، واللب البني ، وبقعة جوناتان ، والجوف البني ، والانحلال الداخلي .

ثالثاً - انتهاء مدة التبريد الطبيعية للصنف : اذا فات موعد تبريد ثمار الصنف فقد تعثرها اعراض طبيعية عديدة لدخولها الحبة الاخيرة من حياتها واقتراب انحلالها وتلاشيها .

رابعاً - صفات الصنف الطبيعية : تمثل هذه الصفات دوراً هاماً في اصابة الثمار بالاعراض الطبيعية فلا تصاب بعض الاصناف باعراض معروفة كما تعثر بعض الاعراض الصنف وتوابعه فقط، الا انه يندر خلو اي صنف منها . وقد ذكرت الاعراض التي تصيب بعض الاصناف حين وصفها في الفصل الثاني والعشرين .

اوصاف الاعراض وطرق الوقاية

لفحة الشمس (Sun Scald) - كثيراً ما تشاهد سوق اشجار التفاح مصابة بجفاف قشرتها وتشققها بالقرب من سطح الارض . ان ذلك عائد الى مصادفة خلو الجو من الغيوم وجفاف الهواء ووقوف حرته في عصارى بعض ايام الشتاء القارسة، وهو امر يزيل جميع موانع وصول اشعة الشمس المحرقة مباشرة الى جزء الساق المعرضة لها فتمتنص القشرة القائمة اللون والانسجة التي تليها الشيء الكثير من تلك الحرارة بينما تبقى الاجزاء المجاورة لها من الساق باردة جداً .

فاذا هبطت الحرارة فجأة بعد غروب شمس ذلك اليوم تنخفض بسرعة حرارة الجزء المعرض الى مستوى حرارة الهواء البارد المحيط به وحرارة الاجزاء المجاورة التي لم تصلها تلك الاشعة . وهذا التباين المفاجيء في درجة الحرارة يقتل الخلايا المعرضة ويجفف الساق في ذلك الموضع (الشكل رقم ٥٢). وقد

تصاب الثمار المعرضة لاشعة الشمس بضربة الشمس المشابهة باعراضها كلفحة الشمس مثلاً فيتلف الجانب المصاب . والافضل في كلا الحالتين تغطية الجزء المعرض ، فالساق تغطي بالكاس وتربى أغصانها منخفضة ، أما الثمار فتحجب بأوراق الاشجار او تغطي بالقش .

قمر التفاح (١٦) (Apple Scald) -

يعتبر هذا العرض اهم اسباب تلف ثمار التفاح في البراد اذا استثنى مرض العفن الازرق . فكثيراً ما تشاهد الثمار بعد اخراجها من البراد بوضع ساعات مشوهة اللون اذ يغشي القشرة لون بني فاتح تبدو على



(تشاندر)

اثره الثمار كأنها مرضوضة . يبدأ هذا العرض الشكل رقم ٥٢ - لفحة الشمس الشتوية عرض في البراد على صورة لطخات مستطيلة او طيبي سبه التباين في درجات الحرارة (راجع بقع صغيرة على سطح القشرة لا تلبث ان لفحة الشمس) .


تصل بعضها ببعض بعد انتشار العرض الى ان تغشي جميع القشرة ، واذا استفحل العرض يتغير لون اللب تحت القشرة مسافة نصف سنتيمتر فلا تصلح للبيع (الشكل رقم ٥٣) . ويرجع السبب المباشر في انتشاره

الى كثرة تجمع بعض الغازات الناتجة من تنفس الثمار في غرف البراد مثل غاز اسيت الديهايد وغاز ثاني اوكسيد الكربون . وما يساعد على انتشاره التعهد المغلوط كالافراط في الري والقطف الخاطيء والتعبئة الرديئة والتبريد غير المنتظم . ولذلك لا يمكن القول ان اصنافاً معروفة تصاب بهذا العرض دون غيرها ، لكن اصناف رد ديليشس وكولدن ديليشس وجوناثان وكنج ديفيد وماكتوش تعتبر شديدة المقاومة له ؛ والاصناف واينساب واستين وروم بيوتي معرضة للاصابة به . وللوقاية من اضراره يجب قطف الثمار بعد بلوغها اول درجة في النضج على ان يكون لونها الاساسي اصفر لا اخضر لان اللون الاخضر شديد التأثير بهذا العرض . كما يجب ان تغلف الثمار بالاوراق الرقيقة المشبعة بالزيت المعدنية الخاصة ، وتدخل الى البراد في اقصر فترة بعد قطفها وتوضع في غرف لا ترتفع حرارتها عن ٣١ - ٣٢ درجة ف على ان لا تتجاوز مدة تبريدها المعدل الطبيعي للصف .

الانحلال الداخلي (Mealy Breakdown) - هو عرض يظهر داخل الثمار بعد تبريدها مدة تتجاوز معدل طاقة صفها . فبدلاً من ان يكون اللب صلباً عصرياً يصير طريئاً كالعجين ثم يصبح جافاً بني اللون . يبدأ الانحلال من داخل الثمرة ويسير تدريجياً الى خارجها باستثناء بعض الاصناف مثل جوناثان . وعند بلوغ الاصابة اشدها تتشقق القشرة ويتغير لونها الى بني (الشكل رقم ٥٤) . واكثر ما تصاب بهذا العرض الثمار الكبيرة الحجم والصفان جوناثان وماكتوش وما تبقى من الاصناف تصاب به بدرجات متفاوتة . يتقى هذا العرض بقطف الثمار عند بلوغها اول درجة في النضج اي قبل اكتمال لونها على ان تستثنى من التعبئة جميع الثمار الكبيرة الحجم ، وان تنقل الثمار حال قطفها الى براد درجة حرارته ٣١ ف ، وان تسوق قبل البدء بالانحلال الذي يختلف ظهوره تبعاً لطبيعة الصف .



الانحلال الاسفنجي (Soggy Breakdown) - يشبه هذا العرض سابقه في بدئه فقط الا ان اللب ينحل ويبقى ليناً او اسفنجياً وطريئاً ويتغير لون الجزء المصاب الى بني، وكثيراً ما يشتد العرض فينحل قلب الثمرة او جانبها الداخلي جميعه كل الانحلال دون ان يظهر للعرض اي دلائل خارج الثمرة (الشكل رقم ٥٥) . ويصير اللب خمري الطعم في اجزائه المصابة وغير المصابة قبل ان تظهر دلائل هذا العرض ومنه حالة (Soft Scald) تصاب فيها القشرة بالاضافة الى اللب فيتغير لونها الى بني تدريجياً، وينمو هذا العرض على القشرة مصوراً اشكالاً غريبة عليها تشبه الجزر والحلجان واكثرها كبيرة سطحها قليل الانخفاض. وتختلف نسبة الاصابة بهذا العرض من موسم الى آخر ويعود السبب الى حفظ الثمار في براد منخفض الحرارة حتى ٣١ - ٣٤ درجة ف . واكثر ما تصاب به الاصناف جونانان، وروم بيوتي، وونتر بنانا وأحياناً كولدن ديليشس؛ واشد الاصناف مقاومة لهذا العرض هي واينساب، واستيمن، وورد ديليشس، وماكتنوش . وتجب الوقاية منه بقطف الثمار البالغة فقط وادخالها الى البراد حالاً وحفظها فيه على معدل ٣٦ درجة ف، وهذا هو الامر الاهم .

التقرة المرة (Bitter Pit or Stippen) - هو عرض ذو اهمية كبرى في المواقع المرورية . وهو عبارة عن بقع مستديرة تظهر منخفضة في سطح القشرة بقطر يتراوح بين ثلاثة مليمترات وست وعمق في داخل اللب لا يختلف عن ذلك؛ اما اللون فيكون غالباً بنياً باهتاً لكنه يختلف من احمر قاتم في الاصناف الحمراء الى اخضر قاتم في الاصناف الصفراء، وباشتداد العرض تصح جميعها بنية اللون مرّة المذاق . يميز هذا العرض عن بقعة جونانان بانخفاض البقع في القشرة بينما تبقى البقع في عرض جونانان ملساء وسطحية (الشكل رقم ٥٦) . وقد يصيب هذا العرض اللب احياناً دون ان ينفذ الى القشرة ويكون كرات



(كارليك)

الشكل رقم ٥٣ - قمر التفاح : أهم عرض طبيعي يعترى ثمار التفاح في البراد .



(بلاج وماني وبيكيت)

الشكل رقم ٥٥ - الانحلال الاسفنجي : عرض طبيعي سيه حفظ الاصناف المعرضة للاصابة به على ٣١ - ٣٢ درجة ف في البراد بدلاً من ٣٦ درجة ف . وغالباً ما تبدو الثمار سليمة من الخارج .


(بلاج وماني وبيكيت)

الشكل رقم ٥٤ - الانحلال الداخلي : عرض طبيعي يتلف ثمار التفاح في الداخل اما اذا اشتد كثيراً فينشق سطحها .


صغيرة ، بنية ، جافة ، فلينية لا تعمق في اللب اكثر من خمسة عشر مليمتراً . اسباب هذا العَرَض مجهولة وكذلك طرق الوقاية منه . ويقدر البعض انه ينتج من شذوذ في التغذية والري . فالاتربة الخفيفة ، وعدم انتظام الري بين الكثرة والقلة والتقديم والتأخير ، والانتاج الخفيف ، والحرارة غير المتساوية ابان النضج ، كلها عوامل تساعد في تكوينه وانتشاره . وضرر هذا العرض محدود - لحسن الحظ - في بعض الاقاليم ولا تصاب به بشدة سوى اصناف تجارية قليلة مثل نورثون اسباني ، واستيمن ، وكرافنشتين ، وكوكس اورنج ، اما الاصناف الاخرى فتتأثر به قليلاً . ويتقى هذا العرض بان لا تسقى الاشجار بكثرة وخاصة قبل قطف الثمار ، وبالمحافظة على خصب التربة ، وتقليم الاشجار تقليباً خفيفاً ، ولا يسمح بانتاج الثمار الكبيرة الحجم ، كما يجب قطفها في موعدها الصحيح . يستدل من ذلك ان الوقاية من هذا العرض عائدة الى حسن تعهد الاشجار في البستان .

الجوف المائي (Water Core) - يشاهد هذا العرض في لب الثمار وخاصة بالقرب من وسطها على صورة بقع مائية اللون صلبة متحجرة قليلة اللعان شفافة (الشكل رقم ٥٧) ؛ واذا اشتدت الاصابة فقط يظهر العرض على سطح الثمار في الاتجاه المعرض لأشعة الشمس ، وذلك قبل ادخالها البراد لأن كثيراً من تأثيره السيء يزول بعد التبريد بفترة طويلة اذا كانت الاصابة غير شديدة . يصيب هذا العرض بعض الاصناف في جميع الاقاليم وخاصة الجافة منها حيث ترتفع الحرارة وتشتد وتطول فترات اشعاع الشمس وتعصف الرياح الحارة . اما اسباب تكوينه فلا تزال مجهولة لكن يعتقد البعض ان الحرارة المرتفعة جداً ، والاشعاع الشديد المتواصل يغيران حالة المادة الحيوية (البروتوبلازم) بحيث يمكنها ان تنفذ من جدران الخلايا فتتمكن العصارة الخلوية ان تملأ الفراغات


الشكل رقم ٥٦ - النقرة المرة : (الى اليسار) عَرَض طبيعي قد ترجع أسبابه الى تعهد الاشجار المغلوط كالثذوذ في التغذية والري ؛ يميز عن بقعة جواناتان بانخفاض النقر في القشرة .




(بلاج وماني ويبكيت)



الشكل رقم ٥٧ - الجوف المائي : عَرَض طبيعي يعتقد انه مسبب من الحرارة المرتفعة ابان نضج الثمار .



(بلاج وماني ويبكيت)



(بلاج وماني ويبكيت)

الشكل ٥٨ - بقعة جواناتان : عَرَض طبيعي منه نوعان : النوع العام كما يبدو في الصورة العليا ، والنوع الثاني يتكون حول النقاط الكثيرة في القشرة كما في الصورة السفلى .

في بادىء الامر مع العلم انه يمكن حفظها بمعدل ٣٦ درجة ف فيما بعد .

اللب البني (Internal Browning) - عرض يشبه الانحلال الاسفنجي ويختلف عنه بانه يتشعب من وسط الثمرة بخطوط مستطيلة بنية اللون ، وكيانه صلب وليس ليناً ويصبح طعم الثمار المصابة به خمرياً لتكوين الكحول ، كما ان لمادة اسيت الدهايد تأثيراً في ذلك . لا يظهر على سطح الثمار ؛ وسببه انخفاض درجة الحرارة كثيراً في الصيف ابان تكوين الثمار ونضجها . وهو يصيب ثمار الصنف يلونيوتن فقط في اقاليم معروفة بانخفاض درجة حرارتها صيفاً . يتقى هذا العرض بان لا تحفظ الثمار الكبيرة الحجم ولا تخفض الحرارة في غرف التبريد من ٣٦ درجة ف لان انخفاض الحرارة في البراد الى ٣٢ درجة ف لمدة طويلة يساعد على انتشاره بين الثمار .

الجوف البني (Core Flush) - ينحصر هذا العرض في جوف الثمرة بالقرب من البذور، وقل ان ينتشر الى اللب المجاور الا اذا استفحل امره ؛ ويميز بلون الجوف البني ، وهو مسبب من انخفاض درجة الحرارة اثناء موسم النمو ، ويظهر للعيان على الثمار المحفوظة في براد درجة حرارته ٣٢ ف؛ وهو يصيب الصنف ماكنتوش . اما الوقاية ففي حفظ الثمار في البراد على معدل ٣٦ درجة ف .

ضرر التجلد (Freezing Injury) - اذا انخفضت الحرارة في البراد عن ٢٩ درجة ف تجمدت الثمار ، فاذا طال امدها وتكوّن الجليد داخل خلاياها تنفجر وتصبح غير صالحة للتبريد . ويمكن تمييز الثمار المتجلدة عن الانحلال بكونها لينة ، وطعمها مختمر ، ويستدل على الضرر من تحول لون الانسجة الحيطية من الابيض الى البني . يحتفظ اللب بلونه والثمار في البراد لكنها تنحل

بين الخلايا وخاصة اذا توفر الماء بمقدار كبير قبل النضج بقليل ، واذا تأخر قطف الثمار الى حين اكتمال نضجها على الاشجار . واكثر الاصناف عرضة لهذه الاصابة هي رد ديليشس ، وكنج ديفيد ، وجوناثان ، وروم بيوتي ، واستمين ، وونتر بنانا ، وواينساب ، واهياناً كرافنشتين . ومع ان هذا العرض لا يشوه الثمار فهو يخفض مدة تبريدها ، واذا اشتد تصبح عرضة للاصابة بعرض الانحلال الداخلي . وهذا العرض كسابقه تعود الوقاية منه الى حسن تعهد الاشجار في البستان ، فلا تقلم الاشجار بشدة ، واجتهد ان تحافظ على كثافة الاوراق لسكي لا تتعرض الثمار طويلاً لأشعة الشمس ، ولا تسمح بتكوين الثمار الكبيرة الحجم ، ولا تكثر من السقاية ، واقطف الثمار قبل ان يكتمل نضجها بقليل من الزمن .

بقعة جوناثان (Jonathan Spot) - يعترى هذا العرض القشرة فقط فتظهر عليها بقع مستديرة سطحية يختلف قطرها من مليمتين الى عشرة مليمترات وغالباً ما تحيط هذه البقع نقاط القشرة الطبيعية وخاصة باتجاه الفجوة وحيث اللون الاحمر زاه ، وقد تتصل البقع بعضها ببعض باشتداد العرض فتصبح كبيرة الحجم سوداء مشوبة بزرق ثم يتحول هذا اللون الى بني قائم بعد اخراج الثمار من البراد (الشكل رقم ٥٨) . يندر ان يتعمق العرض في اللب كما ان سطحه امس غير منخفض . ان سببه مجهول ويؤكده البعض انه وراثي وقد ينتج من تأثر الصباغ الاحمر «ايدان» بالتفاعل الكيماوي ولذلك فهو اكثر ما يصيب الثمار الحمراء ، وهو محصور بالصنف جوناثان والاصناف المتصلة اليه بالقربي مثل اسوبس ، وكنج ديفيد ، وفيما ندر يصيب كرافنشتين ، ويلونيوتن . وتكون الوقاية منه بقطف ثمار الصنف جوناثان قبل نضجها واكتمال لونها على ان تدخل البراد حالاً لان هذا هو اهم عامل في منع انتشاره ، كما يجب حفظ الثمار في البراد بمعدل ٣٢ درجة ف

مراجع الباب السابع

- ١ عبد المنعم تلحوق - الحشرات التي تفتري اشجار التفاح والكمثرى في لبنان - نشرة مؤسسة الشرق الادنى الاميركية سنة ١٩٤٨ .
- ٢ حكومة فلسطين (سابقاً) - تاريخ حياة دودة ثمر الفصيلة التفاحية في فلسطين - النشرة الزراعية الشهرية تشرين الاول ١٩٣٩ .
- ٣ حكومة فلسطين (سابقاً) - المن القطني - النشرة الزراعية الشهرية . تشرين الثاني سنة ١٩٣٩ .
- ٤ و. ج. شون وج. و. اندرهل - تاريخ حياة وهجرة المن القطني - محطة التجارب الزراعية في ولاية فرجينيا ، النشرة العلمية رقم ٥٧ سنة ١٩٣٥ .
- ٥ عادل ابو النصر - قائمة باسماء الحشرات الضارة في الزراعة في لبنان - بيروت سنة ١٩٥١ .
- ٦ ا. ف. ماسون - رش وتغيير وتبخير النباتات - كتاب ١٩٣٦ .
- ٧ ف. د. هيلد - مقدمة للامراض النباتية - كتاب سنة ١٩٤٣ .
- ٨ د. ه. روز وس. بروكس - و. د. ف. فيشر وس. و. براتي - امراض الثمار والخضار - جزء التفاح والكمثرى والسفرجل - دائرة الزراعة العامة الاميركية - نشرات متنوعة رقم ١٦٨ سنة ١٩٣٣ .
- ٩ ا. بلاشوسكي ول. مزليل - الحشرات الضارة بالمزروعات - كتاب - ١٩٣٥ .
- ١٠ جُهّز هذا الجدول بمعرفة ومواقفة الشركات المعنية التي تفضلت وقدمت هذه المعلومات .
- ١١ نشرة ارشادية - منهاج رش اشجار التفاح في واد ولياميت في ولاية اوريكون - النشرة الارشادية رقم ٥٠٨ سنة ١٩٤٨ .
- ١٢ ر. ه. هارت - الزيوت المقطرة كمواد للرش على الاشجار الرائدة - مجلة محطة التجارب الزراعية في فرجينيا رقم ٢٩٣ سنة ١٩٣٣ .
- ١٣ ه. س. مانس و ب. و. بورتمان - توصيات للرش في ولاية ايداهو - مجلة محطة التجارب الزراعية في ايداهو رقم ٢٧٩ سنة ١٩٥٠ .
- ١٤ ه. ه. بلاج وت. ج. ماني و ب. س. بيكيت - اعراض التفاح في البراد - مجلة محطة التجارب الزراعية في ولاية ايوا رقم ٣٢٩ سنة ١٩٣٥ .
- ١٥ ج. و. م. ارنود - بحث في الامراض النباتية . السلسلة الاولى المجلد الاول سنة ١٩٣١ .
- ١٦ قمر التفاح - (من قمر) بانت ادمته من بشرته، وقبل هو شيء يصيبه من القمير كالا حترق فبدخل الماء بين الادمة والبشرة . قمرت الثمار بمعنى تلفت قشرتها وتغير لونها .

حال اخراجها منه ويصبح لها مائماً بني اللون لا يصلح للاكل .
فالافضل وضع الثمار المتجلدة في غرف التبريد الاولى على معدل ٤٠
درجة ف فترة قبل اخراجها اذا كان ضررها طفيفاً فلا تتأثر من سرعة تغيير
الحرارة فيزداد ضررها .

فهرس الاشكال والصور الملونة

الصفحة	رقم الشكل	الموضوع
٢٤	١	مقطع طولي لزهرة تفاح كاملة الاعضاء التناسلية .
٢٥	٢	مقطع طولي لزهرة تفاح في حال الاخصاب .
٣٥	٣	بيانات لنظام توزيع الملحقات في بساين التفاح .
٤٩	٤	تأثير نوع الاتربة في انتشار جذور اشجار التفاح .
٥٠	٥	تأثير كيفية تمهد التربة على انتشار جذور اشجار التفاح .
٦٤	٦	كيفية تعيين مواقع الاشجار في البستان .
٦٥	٧	مشهد جميل لمصد رياح كثيف كوته اشجار السرو الهرمي .
٦٦	٨	مشهد لبناني رائع لموقع اعد لغرس اشجار التفاح .
٦٨	٩	بيان بالطريقة الصحيحة لبناء جدار المصطبة .
٧١	١٠	كيفية غرس اشجار التفاح .
٧٦	١١	اشجار تفاح عمرها عامان مفروسة بأسراب متناسقة .
٨٩	١٢	التربة المكسوة شتاء .
٩٤	١٣	بناء السدود لحفظ الماء للري .
١٠٤	١٤	كيفية قطع الاغصان الكبير .
١٠٥	١٥	النشر الحاطي .
١٠٦	١٦	النشر الصحيح .
١٠٧	١٧	هيكل قدحي .
١٠٨	١٨	هيكل شبه الملك .
١١١	١٩	شجرة كولدن دبليشس في عامها الخامس قبل التقليم .
١١٢	٢٠	الشجرة عينها في الرقم ١٩ بعد اتمام عملية التقليم .
١١٤	٢٠ ب	الفرق في التركيب بين زاوية غصن مفتوحة واخرى ضيقة .
١٢٠	٢١	تخفيف الثار .

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التسمية الإدارية

٣١٢	٢٢ -	اهمية اخصاب البذور في اكتمال شكل الثمار الطبيعي
٣١٢	٢٣ -	بعض اشكال ثمار التفاح
٣١٥	٢٤ -	مقطع عرضي لثمرة تفاح كاملة التكوين
٣١٥	٢٥ -	احدث نموذج لسلم قطف مئين صنع من المعدن الخفيف
٣٢٠	٢٦ -	ثمرا تفاح مشوهتان بسبب بقاء آثار مادتي الزرنيخ وحامض الكورور على القشرة
٣٢٢	٢٧ -	آلة غسل بالفرشاة لتنظيف ثمار التفاح من مواد الرش السامة
٣٢٢	٢٨ -	آلة تحديد حجم ثمار التفاح داخل مشغل اعد لتوضيب الفاكهة
٣٢٢	٢٩ -	مشهد عام داخل مشغل تام التجهيز معد لتوضيب الفاكهة
٣٢٥	٣٠ -	كيفية تغليف ثمار التفاح بالورق المشبع بالزيوت المعدنية المكررة
٣٢٥	٣١ -	الطرق الثلاث في تعبئة ثمار التفاح في الصناديق
٣٢٥	٣٢ -	عاملة توضيب الثمار في وضع صحيح
	٣٣ -	صناديق تفاح معبأة حسب الاصول في طريقها الى الخارج
	٣٤ -	ظاهرة عدم التجانس بين الاصل البري والمطوم
	٣٥ -	مقطع طولي لمطوم بالبرعم واخر بالقلم
	٣٦ -	التطعيم الجسري
	٣٧ -	الخفصاء ثاقبة البراعم الزهرية
	٣٨ -	حشرات سان جوزي القشرية
	٣٩ -	بيوض المنكبوت الاحمر الاوروني
	٤٠ -	مرض التبقع ضار في المواقع الكثيرة الرطوبة صيفاً
	٤١ -	العفن الازرق
	٤٢ -	مرض التدرن التاجي (بكتيري)
	٤٣ -	مرض اللفحة التارية (بكتيري)
	٤٤ -	مرض القرحة « فطري »
	٤٥ -	الزيوت القطرانية كما تبدو بعد رشها على الاشجار في الشتاء
	٤٦ -	مضخة رش صغيرة الحجم يمكن لشخص واحد نقلها من مكان الى آخر بسهولة
	٤٧ -	مضخة رش متوسطة الحجم يمكن لشخصين نقلها من مكان الى آخر

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التسمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

الصور الملونة

الصفحة	السنة	اسم المصور (ة)	الصف
١٩٢	١٩١٠	Elsie E. Lower ألسي. ي. لور	كر اقتشين
١٩٤	١٩٣٦	Mary D. Arnold ماري د. ارنولد	ماكتوش
٢٠٨	?	?	اسوبس اسبزنبرك
٢١٠	١٩١٨	R. E. Steadman ر. ي. استدمن	نورثون اسباي
٢١٨	١٩١٤	E. I. Schutt ي. ا. شوط	يلونبوت

قدم الصور الملونة العالم ج. ر. ماكنس مدير قسم الابحاث النباتية في مختبر بلتزيل الزراعي (ولاية ماريلند) التابع لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة الاميركية ، وجميعها من رسم فنانين اميركيين .